32000R0654

L 79/26 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 30.3.2000

# NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 654/2000

## ze dne 29. března 2000,

## kterým se povolují nové doplňkové látky, nová užití doplňkových látek a nové přípravky z doplňkových látek v krmivech

**(Text s významem pro EHP)**

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech ([1]), naposledy pozměněnou nařízením Komise (ES) č. 2690/1999 ([2]), a zejména na článek 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků mohou být povoleny nové doplňkové látky nebo nová užití doplňkových látek.

(2) Směrnice Rady 93/113/ES ze dne 14. prosince 1993 o způsobu užití enzymů, mikroorganismů a přípravků z nich ve výživě zvířat a o jejich uvádění na trh ([3]), naposledy pozměněná směrnicí 97/40/ES ([4]), odchylně od směrnice 70/524/EHS zmocnila členské státy dočasně povolit používání enzymů, mikroorganismů a přípravků z nich a jejich uvádění na trh.

(3) Byly předloženy nové údaje za účelem nahrazení povolených přípravků z enzymů novými přípravky ze stejných enzymů.

(4) Nové doplňkové látky nebo nová užití doplňkových látek mohou být dočasně povolena, pokud při povoleném obsahu v krmivech nemají nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat nebo na životní prostředí, ani nepoškozují spotřebitele tím, že by měnily vlastnosti živočišného produktu, pokud jejich přítomnost v krmivech může být kontrolována a pokud lze s ohledem na dostupné výsledky důvodně předpokládat, že mají příznivý vliv na vlastnosti krmiv, do kterých jsou přidávány nebo na živočišnou produkci.

(5) Na používání doplňkových látek pracovníky a na manipulaci s nimi se vztahují v plném rozsahu směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ([5]) a navazující samostatné směrnice, zejména směrnice Rady 90/679/EHS ze dne 26. listopadu 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci ([6]), naposledy pozměněná směrnicí Komise 75/65/ES ([7]).

(6) Po přezkoumání dokumentací předložených členskými státy v souladu s článkem 3 směrnice 93/113/ES se ukazuje, že určitý počet přípravků náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů může být dočasně povolen.

(7) Stanovisko Vědeckého výboru pro výživu zvířat, pokud jde o bezpečnost těchto přípravků z enzymů ([8]) a mikroorganismů ([9]), bylo příznivé.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Přípravky náležející do skupiny „enzymů“, které jsou vyjmenované v příloze I tohoto nařízení, se povolují podle směrnice 70/524/EHS jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

*Článek 2*

Údaje ve sloupci „Chemický vzorec, popis“, které se týkají složení enzymů povolených pod čísly „7“ a „8“, se mění v souladu s přílohou I.

*Článek 3*

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismů“, které jsou vyjmenované v příloze II tohoto nařízení, se povolují podle směrnice 70/524/EHS jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

([1]) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 33.
([3]) Úř. věst. L 334, 31.12.1993, s. 17.
([4]) Úř. věst. L 180, 9.7.1997, s. 21.
([5]) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
([6]) Úř. věst. L 374, 31.12.1990, s. 1.
([7]) Úř. věst. L 335, 6.12.1997, s. 17.
([8]) Zpráva Vědeckého výboru pro výživu zvířat o užití některých enzymů jako doplňkových látek v krmivech, přijatá dne 4. června 1998, aktualizovaná dne 21. října 1999.
([9]) Zpráva Vědeckého výboru pro výživu zvířat o užití některých mikroorganismů jako doplňkových látek v krmivech, přijatá dne 26. září 1997, aktualizovaná dne 22. října 1999.

*Článek 4*

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2000.

*Za Komisi*
David BYRNE
*člen Komise*

*PŘÍLOHA I*

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| 4 | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza<br>EC 3.2.1.6 | Přípravek z endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) s minimem aktivity pro:<br>potahovanou formu:<br>50 FBG (1)/g<br>kapalnou formu:<br>120 FBG/ml | Výkrm kuřat | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>10 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>100 FBG | 1. V návodech pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>20 FBG.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahujících více než 60 % kukuřice. | 30. 11. 2000 |
| 7 | Endo-1,4-beta-xylanáza<br>EC 3.2.1.8<br>Endo-1,4-beta-glukanáza<br>EC 3.2.1.4 | Přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných *Aspergillus niger* (CBS 600.94) s minimem aktivity pro:<br>potahovanou formu:<br>36 000 FXU (2)/g<br>15 000 BGU (3)/g<br>kapalnou formu:<br>36 000 FXU/g<br>15 000 BGU/g | Výkrm kuřat | – | Endo-1,4-beta-xylanáza:<br>3 600 FXU<br><br>Endo – 1,4-beta-glukanáza:<br>1 500 BGU | Endo-1,4-beta-xylanáza:<br>12 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glukanáza:<br>5 000 BGU | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>3 600–6 000 FXU<br>endo-1,4-beta-glukanáza:<br>1 500–2 500 BGU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 35 % ječmene a 20 % pšenice. | 30. 11. 2000 |

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| | | | Selata | měsíce | Endo-1,4- beta-xylanáza: 6 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 BGU | – | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>6 000 FXU<br>endo-1,4-beta-glukanáza:<br>2 500 BGU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % ječmene. | 30. 11. 2000 |
| | | | Výkrm krůt | – | Endo-1,4- beta-xylanáza: 6 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 BGU | Endo-1,4- beta-xylanáza: 12 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glukanáza: 5 000 BGU | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>6 000-12 000 FXU<br>endo-1,4-beta-glukanáza:<br>2 500–5 000 BGU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % pšenice. | 30. 11. 2000 |

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| | | | Nosnice | – | Endo-1,4- beta-xylanáza: 12 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glukanáza: 5 000 BGU | – | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>12 000 FXU<br>endo-1,4-beta-glukanáza:<br>5 000 BGU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 20 % pšenice, 10 % ječmene a 20 % slunečnice. | 30. 11. 2000 |
| 8 | Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4<br>Endo-1,4- beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek z endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Aspergillus niger* (CBS 600.94) s minimem aktivity pro:<br>potahovanou formu:<br>10 000 BGU ([3])/g<br>4 000 FXU ([2])/g<br>kapalnou formu:<br>20 000 BGU/g<br>8 000 FXU/g | Výkrm kuřat | – | Endo-1,4-beta-glukanáza 3 000 BGU<br><br>Endo-1,4- beta-xylanáza: 1 200 FXU | Endo-1,4-beta-glukanáza 10 000 BGU<br><br>Endo-1,4- beta-xylanáza: | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-glukanáza:<br>3 000–10 000 BGU<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>1 200–4 000 FXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 60 % ječmene. | 30. 11. 2000 |

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| | | | Selata | 4 měsíce | Endo-1,4-beta-glukanáza 3 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 200 FXU | Endo-1,4-beta-glukanáza 5 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 000 FXU | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-glukanáza<br>3 000-5 000 BGU<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>1 200–2 000 FXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % ječmene. | 30. 11. 2000 |
| | | | Nosnice | – | Endo-1,4-beta-glukanáza 5 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 000 FXU | –<br><br>– | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-glukanáza:<br>5 000 BGU<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>2 000 FXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 60 % ječmene. | 30. 11. 2000 |

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| 9 | Endo-1,4-beta-xylanáza<br>EC 3.2.1.8 | Přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Aspergillus niger* (CBS 270.95) s minimem aktivity pro:<br>pevnou formu:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>28 000 EXU (4)/g<br>kapalnou formu:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>14 000 EXU/ml | Nosnice | – | Endo-1,4-beta-xylanáza:<br>2 400 EXU | – | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>2 400-7 400 EXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % žita. | 30. 11. 2000 |
| | | | Výkrm krůt | – | Endo-1,4-beta-xylanáza:<br>2 400 EXU | – | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>2 400-5 600 EXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % žita. | 30. 11. 2000 |

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| 13 | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-xylanáza<br>EC 3.2.1.8 | Přípravek z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) s minimem aktivity pro:<br>práškovou formu:<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>8 000 BGU ([5])/g<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>11 000 EXU ([4])/g<br>granulovanou formu:<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>6 000 BGU/g<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>8 250 EXU/g<br>kapalnou formu:<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>2 000 BGU/ml<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>2 750 EXU/ml | Nosnice | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>600 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xylanáza:<br>800 EXU | –<br><br>– | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>600 BGU<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>800 EXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % pšenice a 30 % ječmene. | 30. 11. 2000 |
| | | | Výkrm krůt | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>600 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xylanáza:<br>800 EXU | –<br><br>– | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>600 BGU<br>endo-1,4-beta-xylanáza:<br>800 EXU.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % žita. | 30. 11. 2000 |

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva | | | |
| 48 | Alfa-amyláza<br>EC 3.2.1.1<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanáza<br>EC 3.2.1.6 | Přípravek z alfa-amylázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaných *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) s minimem aktivity pro:<br>potahovanou formu:<br>alfa-amyláza:<br>200 KNU (6)/g<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>350 FBG (1)/g<br>kapalnou formu<br>alfa-amyláza:<br>130 KNU/ml<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>225 FBG/ml | Výkrm kuřat | – | Alfa-amyláza:<br>10 KNU<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>17 FBG | Alfa- amyláza:<br>40 KNU<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>70 FBG | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>alfa-amyláza:<br>20 KNU<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>35 FBG.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % ječmene. | 30. 11. 2000 |
| | | | Výkrm krůt | – | Alfa-amyláza:<br>40 KNU<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>70 FBG | Alfa-amyláza:<br>80 KNU<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>140 FBG | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:<br>alfa-amyláza: 40 KNU<br>endo-1,3(4)-beta-glukanáza:<br>70 FBG.<br>3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % ječmene. | 30.11.2000 |

(1) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.
(2) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy za minutu z azurin-xylanu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(3) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy za minutu z azurinem síťovaného beta-glukanu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(4) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z arabinoxylanu pšenice při pH 3,5 a teplotě 55 °C.
(5) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 3,5 a teplotě 40 °C.
(6) 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 672 mikromolů redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z rozpustného škrobu při pH 5,6 a teplotě 37 °C.

*PŘÍLOHA II*

| Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maxim. stáří | CFU na kg kompletního krmiva | | Jiná ustanovení | Doba povolení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. obsah | Max. obsah | | |
| 11 | *Enterococcus faecium* DSM 5464 | Přípravek z *Enterococcus faecium* obsahující minimálně: | Výkrm kuřat | – | $0{,}5 \times 10^9$ | $1 \times 10^9$ | 1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.<br>2. Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium, diklazuril, halofuginon, monensin sodný, meticlorpindol, metylbenzochát, nikarbazin. | 30. 11. 2000 |
| | | | Telata | čtyři měsíce | $0{,}5 \times 10^9$ | $1 \times 10^9$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. | 30. 11. 2000 |
| 17 | *Lactobacillus casei* NCIMB 30096<br>*Enterococcus faecium* NCIMB 30098 | Směs *Lactobacillus casei* a *Enterococcus faecium* obsahující minimálně:<br>*Lactobacillus casei*<br>$2 \times 10^9$ CFU/g doplňkové látky<br>a<br>*Enterococcus faecium*<br>$6 \times 10^9$ CFU/g doplňkové látky | Telata | šest měsíců | *Lactobacillus casei*<br>$0{,}5 \times 10^9$<br>*Enterococcus faecium*<br>$1{,}5 \times 10^9$ | *Lactobacillus casei*<br>$1 \times 10^9$<br>*Enterococcus faecium*<br>$3 \times 10^9$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. | 30. 11. 2000 |
| 18 | *Enterococcus faecium* CECT 4515 | Přípravek z *Enterococcus faecium* obsahující minimálně:<br>$1 \times 10^{10}$ CFU/g doplňkové látky | Selata | čtyři měsíce | $1 \times 10^9$ | $1 \times 10^9$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. | 30. 11. 2000 |
| | | | Telata | šest měsíců | $1 \times 10^9$ | $1 \times 10^9$ | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. | 30. 11. 2000 |