32000R0654

L 79/26 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 2000.3.30.

A BIZOTTSÁG 654/2000/EK RENDELETE

(2000. március 29.)

új takarmány-adalékanyagok, takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak és új adalékanyag-készítmények engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2690/1999/EK bizottsági rendelettel ([1]) módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A 70/524/EGK irányelv szerint új adalékanyagok, illetve adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezése a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével lehetséges.

(2) A 70/524/EGK irányelvtől eltérve, a legutóbb a 97/40/EK irányelvvel ([3]) módosított, a takarmányban található enzimek, mikroorganizmusok és ezek készítményeinek felhasználásáról és forgalmazásáról szóló, 1993. december 14-i 93/113/EK tanácsi irányelv ([4]) felhatalmazta a tagállamokat az enzimek, mikroorganizmusok és készítményeik felhasználásának és forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére.

(3) Új adatokat terjesztettek elő az engedélyezett enzimkészítmények felváltására ugyanazon enzimek új készítményeivel.

(4) Ideiglenes engedély adható ki új adalékanyagokra, illetve adalékanyagok új alkalmazásaira, ha azok a takarmányokban megengedett szint mellett nem befolyásolják kedvezőtlenül az emberi vagy állati egészséget, illetve a környezetet, és az állati termékek jellemzőinek megváltoztatásával nem okoznak kárt a fogyasztónak, ha jelenlétük a takarmányokban ellenőrizhető, és a rendelkezésre álló eredmények alapján indokoltan feltételezhető, hogy ilyen takarmányokhoz keverve kedvező hatást gyakorolnak e takarmányok jellemzőire vagy az állattenyésztésre.

(5) A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv ([5]) és annak egyedi irányelvei – különösen a legutóbb a 75/65/EK bizottsági irányelvvel ([6]) módosított, a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1990. november 26-i 90/679/EGK tanácsi irányelv ([7]) – teljes mértékben alkalmazandók azokra a munkavállalókra, akik a takarmány-adalékanyagokat használják és kezelik.

(6) A tagállamok részéről a 93/113/EK irányelv 3. cikke alapján benyújtott dokumentációk vizsgálata alapján az enzimek és mikroorganizmusok csoportjához tartozó egyes készítmények ideiglenesen engedélyezhetők.

(7) A takarmányozási tudományos bizottság kedvező véleményt adott ezen enzim- ([8]) és mikroorganizmus-készítmények ([9]) ártalmatlanságára vonatkozóan.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Enzimek” csoportjába tartozó, e rendelet I. mellékletében felsorolt készítmények a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően és az említett mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezhetők takarmány-adalékanyagként.

2. cikk

A „7.” és „8.” szám alatt engedélyezett enzimek összetételének jellemzői az I. mellékletben „Kémiai képlet, leírás” cím alatt meghatározottak szerint módosulnak.

3. cikk

A „Mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, e rendelet II. mellékletében felsorolt készítmények, a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően és az említett mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezhetők takarmány-adalékanyagokként.

([1]) HL L 326., 1999.12.18., 33. o.
([2]) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.
([3]) HL L 180., 1997.7.9., 21. o.
([4]) HL L 334., 1993.12.31., 17. o.
([5]) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
([6]) HL L 335., 1997.12.6., 17. o.
([7]) HL L 374., 1990.12.31., 1. o.
([8]) A takarmányozási tudományos bizottság jelentése egyes enzimek takarmány-adalékanyagként történő használatáról, elfogadva 1998. június 4-én, frissítve 1999. október 21-én.
([9]) A takarmányozási tudományos bizottság jelentése egyes mikroorganizmusok takarmány-adalékanyagként történő használatáról, elfogadva 1997. szeptember 26-án, frissítve 1999. október 22-én.

4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. március 29-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
4.	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6	Az *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: bevont alakban: 50 FBG [1]/g folyékony alakban: 120 FBG/ml	Brojlercsirke	–	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz 10 FBG	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 FBG	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 20 FBG. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban) gazdag, pl. 60 %-nál magasabb kukoricatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.
7.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4	Az *Aspergillus niger* (CBS 600.94) által termelt endo-1,4 béta-xilanázból és endo-1,4-béta-glükanázból készült készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: bevont alakban: 36 000 FXU [2]/g 15 000 BGU [3]/g folyékony alakban: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Brojlercsirke	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 3 600 FXU Endo-1,4-béta-glükanáz: 1 500 BGU	Endo-1,4-béta-xilanáz: 12 000 FXU Endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-xilanáz: 3 600–6 000 FXU, endo-1,4-béta-glükanáz: 1 500–2 500 BGU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 35 %-nál magasabb árpa- és 20 %-nál magasabb búzatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
			Malacok	négy hónap	Endo-1,4-béta-xilanáz: 6 000 FXU Endo-1,4-béta-glükanáz: 2 500 BGU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-xilanáz: 6 000 FXU endo-1,4-béta-glükanáz: 2 500 BGU 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag összetett takarmányokban való használatra, pl. 30 %-nál magasabb búza- és 30 %-nál magasabb árpatartalommal.	2000.11.30.
			Hízópulyka	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 6 000 FXU Endo-1,4-béta-glükanáz: 2 500 BGU	Endo-1,4-béta-xilanáz: 12 000 FXU Endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-xilanáz: 6 000–12 000 FXU, endo-1,4-béta-glükanáz: 2 500–5 000 BGU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 40 %-nál magasabb búzatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
			Tojótyúkok	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 12 000 FXU Endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-xilanáz: 12 000 FXU, endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 20 %-nál magasabb búza-, 10 %-nál magasabb árpa- és 20 %-nál magasabb napraforgó-tartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.
8.	Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4 Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8	Az *Aspergillus niger* (CBS 600.94) által termelt endo-1,4-béta-glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból készült készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: bevont alakban: 10 000 BGU ([3])/g 4 000 FXU ([2])/g folyékony alakban: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Brojlercsirke	–	Endo-1,4-béta-glükanáz: 3 000 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 1 200 FXU	Endo-1,4-béta-glükanáz: 10 000 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 4 000 FXU	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-glükanáz: 3 000–10 000 BGU, endo-1,4-béta-xilanáz: 1 200–4 000 FXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 60 %-nál magasabb árpatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
			Malacok	négy hónap	Endo-1,4-béta-glükanáz: 3 000 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 1 200 FXU	Endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 2 000 FXU	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-glükanáz: 3 000–5 000 BGU, endo-1,4-béta-xilanáz: 1 200–2 000 FXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 30 %-nál magasabb árpatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.
			Tojótyúkok	–	Endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 2 000 FXU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-glükanáz: 5 000 BGU, endo-1,4-béta-xilanáz: 2 000 FXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 60 %-nál magasabb árpatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
9.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8	Az *Aspergillus niger* (CBS 270.95) által termelt endo-1,4-béta-xilanázból készült készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: szilárd alakban: endo-1,4-béta-xilanáz: 28 000 EXU [4]/g folyékony alakban: endo-1,4-béta-xilanáz: 14 000 EXU/ml	Tojótyúkok	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 2 400 EXU	–	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-xilanáz: 2 400–7 400 EXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag, pl. 30 %-nál magasabb búza- és 30 %-nál magasabb rozstartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.
			Hízópulyka	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 2 400 EXU	–	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-xilanáz: 2 400–5 600 EXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag, pl. 30 %-nál magasabb búza- és 30 %-nál magasabb rozstartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
13.	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8	A *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból készült készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: por alakban: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 8 000 BGU ([5])/g endo-1,4-béta-xilanáz: 11 000 EXU ([4])/g granulátum alakban: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 6 000 BGU/g endo-1,4-béta-xilanáz: 8 250 EXU/g folyékony alakban: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 2 000 BGU/ml endo-1,4-béta-xilanáz: 2 750 EXU/ml	Tojótyúkok	–	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 600 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 800 FXU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 600 BGU, endo-1,4-béta-xilanáz: 800 EXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 40 %-nál magasabb búza- és 30 %-nál magasabb árpatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.
			Hízópulyka	—	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 600 BGU Endo-1,4-béta-xilanáz: 800 EXU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 600 BGU, endo-1,4-béta-xilanáz: 800 EXU. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 30 %-nál magasabb búza- és 30 %-nál magasabb rozstartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
48.	Alfa-amiláz EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6	A *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) által termelt alfa-amilázból és endo-1,3(4)-béta-glükanázból készült készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: bevont alakban: alfa-amiláz: 200 KNU [6]/g endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 350 FBG [1]/g folyékony alakban: alfa-amiláz: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 225 FBG/ml	Brojlercsirke	–	Alfa-amiláz: 10 KNU Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 17 FBG	Alfa-amiláz: 40 KNU Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 70 FBG	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: alfa-amiláz: 20 KNU, endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 35 FBG. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 40 %-nál magasabb árpatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.
			Hízópulyka	–	Alfa-amiláz: 40 KNU Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 70 FBG	Alfa-amiláz: 80 KNU Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 140 FBG	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag egy kg teljes értékű takarmányban: alfa-amiláz: 40 KNU, endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 70 FBG. 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 40 %-nál magasabb árpatartalmú összetett takarmányokban való használatra.	2000.11.30.

([1]) Egy FBG az az enzimmennyiség, amely 5,0 pH-érték mellett 30 °C-on az árpa-béta-glükánból percenként 1 mikromól (glükóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([2]) Egy FXU az az enzimmennyiség, amely 5,0 pH-érték mellett 40 °C-on az azurinnal térhálósított xilánból percenként 0,15 mikromól xilózt szabadít fel.
([3]) Egy BGU az az enzimmennyiség, amely 5,0 pH-érték mellett 40 °C-on az azurinnal térhálósított béta-glükánból percenként 0,15 mikromól glükózt szabadít fel.
([4]) Egy EXU az az enzimmennyiség, amely 3,5 pH-érték mellett 55 °C-on búza-arabinoxilánból percenként 1 mikromól (xilóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([5]) Egy BGU az az enzimmennyiség, amely 3,5 pH-érték mellett 40 °C-on az árpa-béta-glükánból percenként 0,278 mikromól (glükóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([6]) Egy KNU az az enzimmennyiség, amely 5,6 pH-érték mellett 37 °C-on az oldható keményítőből percenként 672 mikromól (glükóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.

II. MELLÉKLET

Szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	CFU/kg a teljes értékű takarmányban		Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom		
11.	*Enterococcus faecium* DSM 5464	*Enterococcus faecium*-készítmény legalább 5×10^{10} CFU/adalékanyag-gramm-tartalommal	Brojlercsirke	–	$0{,}5 \times 10^9$	1×10^9	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. A következő engedélyezett kokcidiosztatikumokat tartalmazó összetett takarmányban való használatra: amprólium, diklazuril, halofuginon, monenzin-nátrium, metilklórpindol, metilbenzokvat, nikarbazin.	2000.11.30.
			Borjak	négy hónap	$0{,}5 \times 10^9$	1×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2000.11.30.
17.	*Lactobacillus casei* NCIMB 30096 *Enterococcus faecium* NCIMB 30098	*Lactobacillus casei* és *Enterococcus faecium* keveréke legalább: *Lactobacillus casei:* 20×10^9 CFU/g és: *Enterococcus faecium:* 6×10^9 CFU/adalékanyag-gramm-tartalommal	Borjak	hat hónap	*Lactobacillus casei:* $0{,}5 \times 10^9$ *Enterococcus faecium:* $1{,}5 \times 10^9$	*Lactobacillus casei:* 1×10^9 *Enterococcus faecium:* 3×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2000.11.30.
18.	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Enterococcus faecium*-készítmény legalább 1×10^{10} CFU/adalékanyag-gramm-tartalommal	Malacok	négy hónap	1×10^9	1×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2000.11.30.
			Borjak	hat hónap	1×10^9	1×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2000.11.30.