32000R0654

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 654/2000

(2000. gada 29. marts)

par atļauju izmantot dzīvnieku barībā jaunas piedevas, izmantot piedevas jaunā veidā un izmantot jaunus preparātus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2690/1999 ([1]), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvā 70/524/EEK paredzēts, ka, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, atļauj izmantot jaunas piedevas vai izmantot piedevas jaunā veidā.

(2) Padomes 1993. gada 14. decembra Direktīvā 93/113/EK par fermentu, mikroorganismu un to preparātu tirdzniecību un izmantošanu dzīvnieku uzturā ([2]), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/40/EK ([3]), atkāpjoties no Direktīvas 70/524/EEK, paredzēts, ka dalībvalstis drīkst pagaidām atļaut fermentu, mikroorganismu un to preparātu izmantošanu un tirdzniecību.

(3) Ir sniegti jauni dati, lai atļautus fermentu preparātus aizstātu ar jauniem to pašu fermentu preparātiem.

(4) Tiek dotas pagaidu atļaujas izmantot jaunas piedevas vai izmantot piedevas jaunā veidā, ja atļautajā līmenī pievienotas dzīvnieku barībai tās, mainot dzīvnieku izcelsmes produktu īpašības, nekaitē ne cilvēka vai dzīvnieku veselībai, ne videi, ja tās nekaitē patērētājiem un ja šo piedevu klātbūtni dzīvnieku barībā var kontrolēt, un var pieņemt, ka, ņemot vērā pieejamos rezultātus, tās labvēlīgi ietekmē dzīvnieku barības vai dzīvnieku izcelsmes produktu īpašības tad, ja tās pievieno šādai dzīvnieku barībai.

(5) Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvā 89/391/EEK ([4]) par tādu pasākumu ieviešanu, kas veicina darbinieku drošības un veselības uzlabošanu darbavietās, un ar to saistītās atsevišķās direktīvās, jo īpaši Padomes 1990. gada 26. novembra Direktīvā 90/679/EEK par darbinieku aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar bioloģisko aģentu iedarbību darbavietās, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 75/65/EK ([5]), ir pilnībā piemērojami attiecībā uz piedevu izmantojumu un darbībām, ko darbinieki veic ar izmantošanai dzīvnieku barībā paredzētām piedevām.

(6) Pārbaudot dokumentāciju, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Direktīvas 93/113/EK 3. pantu, konstatēts, ka pagaidām var atļaut izmantot dažus fermentu grupas un mikroorganismu grupas preparātus.

(7) Dzīvnieku uztura zinātniskā komiteja sniegusi labvēlīgu atzinumu par šo fermentu ([6]) un mikroorganismu ([7]) preparātu nekaitīgumu.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos "fermentu" grupas preparātus saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauj izmantot kā piedevas dzīvnieku uzturā ar nosacījumiem, kas paredzēti minētajā pielikumā.

2. pants

Dati par to atļauto fermentu sastāvu, kas minēti ar 7. un 8. numuru, ir mainīti, kā norādīts I pielikuma ailē "Ķīmiskā formula, apraksts".

3. pants

Šīs regulas II pielikumā uzskaitītos "mikroorganismu" grupas preparātus saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauj izmantot kā piedevas dzīvnieku uzturā ar nosacījumiem, kas paredzēti minētajā pielikumā.

([1]) OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
([2]) OV L 326, 18.12.1999., 33. lpp.
([3]) OV L 334, 31.12.1993., 17. lpp.
([4]) OV L 180, 9.7.1997., 21. lpp.
([5]) OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
([6]) OV L 374, 31.12.1990., 1. lpp.
([7]) OV L 335, 6.12.1997., 17. lpp.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 29. martā

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
David BYRNE

I PIELIKUMS

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
4	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EK 3.2.1.6	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: ar pārklājumu: 50 FBG (1)/g šķidrā veidā: 120 FBG/ml	Cāļi nobarošanai	-	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 10 FBG	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 20FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 60 % kukurūzas	30.11.2000.
7	Endo-1,4-beta-ksilanāze EK 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glikanāze EK 3.2.1.4	Ar *Aspergillus niger* (CBS 600.94) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: ar pārklājumu: 36 000 FXU (2)/g 15 000 BGU (3)/g šķidrā veidā: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Cāļi nobarošanai	-	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 3 600 FXU Endo-1,4-beta-glikanāze: 1 500 BGU	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 3 600-6 000 FXU endo-1,4-beta-glikanāze: 1 500-2 500 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 35 % miežu un 20 % kviešu	30.11.2000.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
			Sivēni	Četri mēneši	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 6 000 FXU Endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 BGU	- -	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 6 000 FXU endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu un 30 % miežu	30.11.2000.
			Tītari nobarošanai	-	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 6 000 FXU Endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 BGU	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 6 000-12 000 FXU endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 – 5 000 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % kviešu	30.11.2000.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
			Dējējvistas	-	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 12 000 FXU Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU	- –	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 12 000 FXU endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 20 % kviešu, 10 % miežu un 20 % saulespuķu sēklu	30.11.2000.
8	Endo-1,4-beta-glikanāze: EK 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksilanāze: EK 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger* (CBS 600.94) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: ar pārklājumu: 10 000 BGU ([3])/g 4 000 FXU ([2])/g šķidrā veidā: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Cāļi nobarošanai	-	Endo-1,4-beta-glikanāze: 3 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 200 FXU	Endo-1,4-beta-glikanāze: 10 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 3 000 – 10 000 BGU endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 200 – 4 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 60 % miežu	30.11.2000.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
			Sivēni	Četri mēneši	Endo-1,4-beta-glikanāze: 3 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 200 FXU	Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 000 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 3 000 – 5 000 BGU endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 200 – 2 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % miežu	30.11.2000.
			Dējējvistas	-	Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 000 FXU	– -	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 BGU endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 60 % miežu	30.11.2000.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
9	Endo-1,4-beta-ksilanāze EK 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger* (CBS 270.95) endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: cietā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze: 28 000 EXU (4)/g šķidrā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze: 14 000 EXU/ml	Dējējvistas	-	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 400 EXU	-	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 2400 – 7400 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu un 30 % rudzu	30.11.2000.
			Tītari nobarošanai	-	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 400 EXU	-	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 400 – 5 600 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu un 30 % rudzu	30.11.2000.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
13	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: EK 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze: EK 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: pulverī: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 8000 BGU [5]/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 11 000 EXU [4]/g granulās: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 6 000 BGU/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 8 250 EXU/g šķidrā veidā: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 000 BGU/ml endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 750 EXU/ml	Dējējvistas	-	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 600 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 800 FXU	– -	1 . Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 600 BGU endo-1,4-beta-ksilanāze: 800 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % kviešu un vairāk nekā 30 % miežu	30.11.2000.
			Tītari nobarošanai	-	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 600 BGU Endo-1,4-beta-ksilanāze: 800 EXU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 600 BGU endo-1,4-beta-ksilanāze: 800 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu un vairāk nekā 30 % rudzu	30.11.2000.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kilogramu kompleksās barības			
48	Alfa-amilāze EK 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: EK 3.2.1.6	Ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūtas alfa-amilāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: ar pārklājumu: alfa-amilāze: 200 KNU ([6])/g endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 350 FBG ([1])/g šķidrā veidā: alfa-amilāze: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 225 FBG/ml	Cāļi nobarošanai	-	Alfa-amilāze: 10 KNU Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 17 FBG	Alfa-amilāze: 40 KNU Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 70 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: alfa-amilāze: 20 KNU endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 35 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % miežu	30.11.2000.
			Tītari nobarošanai	-	Alfa-amilāze: 40 KNU Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 70 FBG	Alfa-amilāze: 80 KNU Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 140 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: alfa-amilāze: 40 KNU endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 70 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi, (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % miežu	30.11.2000.

([1]) Viens FBG ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo vienu mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
([2]) Viens FXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no ksilāna, kurš sašūts ar azurīnu, atbrīvo 0,15 mikromolus ksilozes.
([3]) Viens BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no beta-glikāna, kurš sašūts ar azurīnu, atbrīvo 0,15 mikromolus glikozes.
([4]) Viens EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no kviešu arabinoksilāna atbrīvo vienu mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
([5]) Viens BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 40 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,278 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
([6]) Viens KNU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,6 un temperatūra 37 °C, minūtē no šķīstošas cietes atbrīvo 672 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

II PIELIKUMS

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	KVV/kg kompleksās barības		Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Minimālais saturs	Maksimālais saturs		
11	Enterococcus faecium DSM 5464	*Enterococcus faecium* 5 × 10 KVV/g piedevas	Cāļi nobarošanai	-	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju, diklazurilu, halofuginonu, monenzīnnātriju, metilklorpindolu, metilbenzokvātu, nikarbazīnu	30.11.2000.
			Teļi	Četri mēneši	$0,5 \times 10^{10}$	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.11.2000.
17	Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus faecium NCIMB 30098	*Lactobacillus casei* un *Enterococcus faecium* maisījums, kas satur vismaz: Lactobacillus casei 20×10^9 KVV/g un Enterococcus faecium 6×10^9 KVV/g piedevas	Teļi	Seši mēneši	Lactobacillus casei $0,5 \times 10^9$ Enterococcus faecium $1,5 \times 10^9$	Lactobacillus casei 1×10^9 Enterococcus faecium 3×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.11.2000.
18	Enterococcus faecium CECT 4515	Enterococcus faecium *preparāts, kas satur vismaz:* 1×10^{10} *KVV/g piedevas*	Sivēni	Četri mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.11.2000.
			Teļi	Seši mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.11.2000.