**Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.**

►B

# KOMISSION ASETUS (EY) N:o 600/2005,

## annettu 18 päivänä huhtikuuta 2005,

## kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehun lisäaineena, rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä ja tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(EUVL L 99, 19.4.2005, s. 5)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

| | | virallinen lehti | | |
|---|---|---|---|---|
| | | N:o | sivu | päivämäärä |
| ►M1 | Komission asetus (EY) N:o 2028/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 | L 414 | 26 | 30.12.2006 |
| ►M2 | Komission asetus (EY) N:o 496/2007, annettu 4 päivänä toukokuuta 2007 | L 117 | 9 | 5.5.2007 |
| ►M3 | Komission asetus (EY) N:o 202/2009, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2009 | L 71 | 8 | 17.3.2009 |
| ►M4 | Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 516/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011 | L 138 | 43 | 26.5.2011 |
| ►M5 | Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 118/2012, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012 | L 38 | 36 | 11.2.2012 |
| ►M6 | Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 334/2012, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2012 | L 108 | 6 | 20.4.2012 |
| ►M7 | Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1014/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013 | L 281 | 1 | 23.10.2013 |
| ►M8 | Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/447, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2017 | L 69 | 18 | 15.3.2017 |

▼B

**KOMISSION ASETUS (EY) N:o 600/2005,**

**annettu 18 päivänä huhtikuuta 2005,**

**kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehun lisäaineena, rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä ja tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

*1 artikla*

Hyväksytään liitteen I mukaisesti kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa kymmeneksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

*2 artikla*

Hyväksytään liitteen II mukaisesti mikro-organismien ryhmään kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa neljäksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

*3 artikla*

Hyväksytään liitteen III mukaisesti mikro-organismien ryhmään kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

*4 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M2

*LIITE I*

| Lisäaineen rekisterinumero | Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön nimi ja rekisterinumero | Lisäaine (kauppanimi) | Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus | Eläinlaji tai -ryhmä | Enimmäisikä | Vähimmäispitoisuus | Enimmäispitoisuus | Muut määräykset | Hyväksynnän voimassaolo päättyy | Jäämien enimmäismäärä asianomaisessa eläinperäisessä elintarvikkeessa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mg tehoainetta/kg täysrehua | | | | |
| **Kokkiodiostaatit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet** | | | | | | | | | | |
| ”E 766 | ►**M7** Zoetis Belgium SA ◄ | Salinomysiininatrium 120 g/kg (Salinomax 120G) | **Lisäaineen koostumus**:<br>Salinomysiininatrium 120 g/kg<br>Kalsiumlignosulfonaatti: 40 g/kg<br>Kalsiumsulfaattidihydraatti 1 000 g/kg asti.<br>**Tehoaine**:<br>Salinomysiininatrium, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$,<br>*Streptomyces albus* (ATCC 21838/US 9401-06) - organismin käymisen avulla tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola, CAS-numero: 55 721-31-8<br>Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:<br>< 42 mg elaiofyliiniä / kg salinomysiininatriumia<br>< 40 g 17-epi-20-desoksisalinomysiiniä / kg salinomysiininatriumia | Broilerit | — | 50 | 70 | Käyttö kielletty vähintään 1 vrk ennen teurastusta.<br>Käyttöohjeissa oltava merkintä:<br>’Vaarallista hevoseläimille ja kalkkunoille’;<br>’Rehu sisältää ionoforin: samanaikainen käyttö eräiden lääkeaineiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi aiheuttaa kontraindikaatioita.’ | 22.4.2015 | 5 µg salinomysiiniä/kg kaikissa tuoreissa kudoksissa” |

▼B

*LIITE II*

| Nro tai EY-nro | Lisäaine | Kemiallinen kaava, kuvaus | Eläinlaji tai -ryhmä | Enimmäisikä | Vähimmäispitoisuus | Enimmäispitoisuus | Muut määräykset | Hyväksynnän voimassaolo päättyy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PMY/kg täysrehua | | | |
| **Mikro-organismit** | | | | | | | | |
| ”25 | *Lactobacillus acidophilus* DSM 13241 | *Lactobacillus acidophilus* -valmiste, joka sisältää vähintään:<br>$1 \times 10^{11}$ PMY/g lisäainetta | Koirat | — | $6 \times 10^{9}$ | $2 \times 10^{10}$ | Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.<br>Käytetään kuivarehussa, jonka vesipitoisuus on enintään 2 %. | 22.4.2009 |
| | | | Kissat | — | $3 \times 10^{9}$ | $2 \times 10^{10}$ | Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.<br>Käytetään kuivarehussa, jonka vesipitoisuus on enintään 2 %. | 22.4.2009” |

▼B

*LIITE III*

| EY-nro | Lisäaine | Kemiallinen kaava, kuvaus | Eläinlaji tai -ryhmä | Enimmäisikä | Vähimmäispitoisuus | Enimmäispitoisuus | Muut määräykset | Hyväksynnän voimassaolo päättyy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PMY/kg täysrehua | | | |
| **Mikro-organismit** | | | | | | | | |
| ”E 1709 | *Enterococcus faecium* ATCC 53519<br>*Enterococcus faecium* ATCC 55593<br>(suhteessa 1/1) | Kapseloidun *Enterococcus faecium* ATCC 53519:n ja *Enterococcus faecium* ATCC 55593:n seos, joka sisältää vähintään $2 \times 10^8$ PMY/g lisäainetta<br>(eli vähintään $1 \times 10^8$ PMY/g kumpaakin bakteeria) | Broilerit | — | $1 \times 10^8$ | $1 \times 10^8$ | Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.<br>Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät seuraavia kokkidiostaatteja: dekokinaatti, halofuginoni, lasalosidinatrium, maduramisiiniammonium, monensiininatrium, narasiini, narasiini/nikarbatsiini ja salinomysiininatrium. | Ilman määräaikaa |
| ▼M8 ——— | | | | | | | | |
| ▼M6 ——— | | | | | | | | |