Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 600/2005,

18. aprill 2005,

mis käsitleb teatava koktsidiostaatikumi söödalisandina kasutamise lubamist kümne aasta jooksul, teatava söödalisandi kasutamise ajutist lubamist ning teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 99, 19.4.2005, lk 5)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2028/2006, 18. detsember 2006	L 414	26	30.12.2006
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 496/2007, 4. mai 2007	L 117	9	5.5.2007
►M3	Komisjoni määrus (EÜ) nr 202/2009, 16. märts 2009	L 71	8	17.3.2009
►M4	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 516/2011, 25. mai 2011	L 138	43	26.5.2011
►M5	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 118/2012, 10. veebruar 2012	L 38	36	11.2.2012
►M6	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 334/2012, 19. aprill 2012	L 108	6	20.4.2012
►M7	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1014/2013, 22. oktoober 2013	L 281	1	23.10.2013
►M8	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/447, 14. märts 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 600/2005,

18. aprill 2005,

mis käsitleb teatava koktsidiostaatikumi söödalisandina kasutamise lubamist kümne aasta jooksul, teatava söödalisandi kasutamise ajutist lubamist ning teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat I lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada söödalisandina kümne aasta jooksul kõnealuses lisas kehtestatud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Mikroorganismide rühma kuuluvat II lisas nimetatud preparaati lubatakse ajutiselt kasutada söödalisandina nelja aasta jooksul kõnealuses lisas kehtestatud tingimuste alusel.

Artikkel 3

Mikroorganismide rühma kuuluvat III lisas nimetatud preparaati lubatakse tähtajatult kasutada söödalisandina kõnealuses lisas kehtestatud tingimuste alusel.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Söödalisandi registreerimisnumber	Söödalisandi ringlusesse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber	Söödalisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp	Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus
						Toimeaine kogus milligrammides täissööda kilogrammi kohta				
Koktsidiostaatikumid ja muud raviained										
„E 766	►**M7** Zoetis Belgium SA ◄	Salinomütsiinnaatrium 120 g/kg (Salinomax 120G)	**Söödalisandi koostis**: salinomütsiinnaatrium: 120 g/kg kaltsiumlignosulfonaat: 40 g/kg kaltsiumsulfaatdihüdraat kuni 1 000 g/kg **Toimeaine**: salinomütsiinnaatrium $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, polüeetermonokarboksüülhappe naatriumisool, saadud *Streptomyces albus'*e (ATCC 21838/US 9401-06) fermentatsioonil, CASi number: 55 721-31-8 Tooteomased lisandid: < 42 mg elaiofüliini 1 kg salinomütsiinnaatriumi kohta < 40 g 17-epi-20-desoksüsalinomütsiini 1 kg salinomütsiinnaatriumi kohta	Broilerkanad	—	50	70	Kasutamine keelatud vähemalt üks päev enne tapmist. Kasutusjuhendisse tuleb märkida: „Ohtlik hobuslastele ja kalkunitele.” „Käesolev sööt sisaldab ionofoori: samaaegne kasutamine koos teatud raviainetega (nt tiamuliin) võib olla vastunäidustatud.”	22.4.2015	5 µg salinomütsiini 1 kg kohta kõigi märgade kudede puhul”

▼B

II LISA

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Kasutusloa kehtivusaja lõpp
					CFU/kg täissöödas			
Mikroorganismid								
„25	*Lactobacillus acidophilus* DSM 13241	Preparaat *Lactobacillus acidophilus*, mis sisaldab minimaalselt: 1×10^{11} CFU/g söödalisandit	Koerad	—	6×10^{9}	2×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, säilitusaeg ja granuleerimispüsivus. Kasutamiseks kuivsöödas veesisaldusega 2 % või alla selle.	22.4.2009
			Kassid	—	3×10^{9}	2×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, säilitusaeg ja granuleerimispüsivus. Kasutamiseks kuivsöödas veesisaldusega 2 % või alla selle.	22.4.2009”

▼B

III LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Kasutusloa kehtivusaja lõpp
					CFU/kg täissöödas			
Mikroorganismid								
„E 1709	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (Suhtes 1:1)	Kapseldatud *Enterococcus faecium*'i ja *Enterococcus faecium*'i segu, mis sisaldab minimaalselt 2×10^8 CFU/g söödalisandit. (st minimaalselt 1×10^8 CFU/g kumbagi bakterit)	Broilerkanad	—	1×10^8	1×10^8	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, säilitusaeg ja granuleerimispüsivus. Võib kasutada koktsidiostaatikume sisaldavas segajõusöödas: dekokvinaat, halofuginoon, lasalotsiidnaatrium, maduramütsiinammoonium, monensiinnaatrium, narasiin, narasiin/nikarbasiin ja salinomütsiinnaatrium.	Tähtajatu
▼M8 ———								
▼M6 ———								