KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 358/2005

(2005. gada 2. marts)

par beztermiņa atļaujām izmantot lopbarībā atsevišķas piedevas un atļaujām izmantot jau atļautu piedevu jaunus lietošanas veidus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu, un 9.e panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [2], un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 tiek atļauts Eiropas Savienībā dzīvnieku ēdināšanā izmantot piedevas.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā ir noteikti pārejas pasākumi atļaujas pieteikumiem lopbarības piedevām saskaņā ar Direktīvu 70/524 pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

(3) Atļaujas pieteikumi piedevām, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumos, tika iesniegti pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(4) Dalībvalstu pirmās atsauksmes par šiem pieteikumiem, kas sniegtas saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktu, tika nosūtītas Komisijai pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas. Tādēļ šādus pieteikumus turpina izskatīt saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5) Ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūto alfa-amilāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermenta preparātu pirmo reizi pagaidu kārtā atļāva lietot gaļai audzējamiem cāļiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 654/2000 [3].

(6) Tika iesniegti jauni dati, ar ko pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šim fermenta preparātam.

(7) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (*EFSA*) 2004. gada 15. septembrī sniedza labvēlīgu atzinumu par mikroorganisma, ar kuru iegūts šis fermenta preparāts, toksīna izdalīšanas potenciālu.

(8) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(9) Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūto endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūto endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūto alfa-amilāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) iegūto bacilolizīna un ar *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) iegūto endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu pagaidu kārtā atļāva izmantot gaļai audzējamiem cāļiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2437/2000 [4].

(10) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šim fermenta preparātam.

(11) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(12) Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2437/2000 ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūto endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūto endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūto alfa-amilāzes un ar *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) iegūto endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu pagaidu kārtā atļāva izmantot gaļai audzējamiem cāļiem.

---

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

[2] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

[3] OV L 79, 30.3.2000., 26. lpp.

[4] OV L 280, 4.11.2000., 28. lpp.

(13) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šim fermenta preparātam.

(14) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(15) Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 [1] ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) iegūto endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes fermenta preparātu pirmo reizi pagaidu kārtā atļāva izmantot gaļai audzējamiem cāļiem.

(16) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šim fermenta preparātam.

(17) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(18) Attiecīgi šo četru fermenta preparātu izmantošana, kā norādīts I pielikumā, jāatļauj bez termiņa ierobežojuma.

(19) Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2697/2000 [2] vielu "tartrazīns" pagaidu kārtā atļāva izmantot kā krāsvielu dekoratīvajiem graudēdājiem putniem un sīkajiem grauzējiem.

(20) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šai krāsvielai.

(21) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(22) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2697/2000 "saulrieta dzeltenо FCF" vielu pagaidu kārtā atļāva izmantot kā krāsvielu dekoratīvajiem graudēdājiem putniem un sīkajiem grauzējiem.

(23) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šai krāsvielai.

(24) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(25) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2697/2000 "patentzilo V" vielu pagaidu kārtā atļāva izmantot kā krāsvielu dekoratīvajiem graudēdājiem putniem un sīkajiem grauzējiem.

(26) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šai krāsvielai.

(27) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(28) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2697/2000 vielu "hlorofila vara komplekss" pagaidu kārtā atļāva izmantot kā krāsvielu dekoratīvajiem graudēdājiem putniem un sīkajiem grauzējiem.

(29) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato beztermiņa atļaujas pieteikumu šai krāsvielai.

(30) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti nosacījumi, kādus šādai atļaujai izvirzīja Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā.

(31) Attiecīgi šo četru krāsvielu izmantošana, kā norādīts II pielikumā, jāatļauj bez termiņa ierobežojuma.

(32) Ar *Bacillus subtilis* (LMG-15136) iegūto fermenta preparātu endo-1(4)-beta-ksilanāzi atļauts izmantot gaļai audzējamiem cāļiem bez termiņa ierobežojuma saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1259/2004 [3] un pagaidu kārtā sivēniem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 937/2001 [4], gaļas tītariem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2188/2002 [5] un nobarojamām cūkām saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 261/2003 [6].

(33) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato atļaujas pagarināšanas pieteikumu šā fermenta preparāta izmantošanai dējējvistām.

[1] OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.
[2] OV L 319, 16.12.2000., 1. lpp.
[3] OV L 239, 9.7.2004., 8. lpp.
[4] OV L 130, 12.5.2001., 25. lpp.
[5] OV L 333, 10.12.2002., 5. lpp.
[6] OV L 37, 13.2.2003., 12. lpp.

(34) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (*EFSA*) ir sniegusi atzinumu par šā preparāta izmantošanu, kurā secināts, ka saskaņā ar šīs regulas III pielikumā uzskaitītajiem nosacījumiem tas nerada risku šai papildu dzīvnieku kategorijai.

(35) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 1. punkta nosacījumi, lai atļautu izmantot šādu preparātu.

(36) Ar *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) iegūto 3-fitāzes fermenta preparātu atļāva izmantot gaļai audzējamiem cāļiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 418/2001 ([1]).

(37) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato atļaujas pagarināšanas pieteikumu šā fermenta preparāta izmantošanai gaļas tītariem un sivēnmātēm.

(38) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (*EFSA*) ir sniegusi atzinumu par šā preparāta izmantošanu, kurā secināts, ka saskaņā ar šīs regulas III pielikumā uzskaitītajiem nosacījumiem tas nerada risku šīm papildu dzīvnieku kategorijām.

(39) Attiecīgi šo divu fermenta preparātu izmantošana, kā norādīts III pielikumā, pagaidu kārtā jāatļauj uz četriem gadiem.

(40) *Enterococcus faecium* mikroorganismu preparātu atļauts bez termiņa ierobežojuma izmantot teļiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1288/2004 ([2]), bet uz laiku līdz 2004. gada 30. jūnijam gaļai audzējamiem cāļiem, sivēniem, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm un gaļas liellopiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 866/1999 ([3]).

(41) Tika iesniegti jauni dati, kas pamato atļaujas pagarināšanas pieteikumu šā mikroorganisma preparāta izmantošanai suņiem un kaķiem.

(42) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (*EFSA*) ir sniegusi atzinumu par šā preparāta izmantošanu, kurā secināts, ka saskaņā ar šīs regulas IV pielikumā uzskaitītajiem nosacījumiem tas nerada risku šai papildu dzīvnieku kategorijai.

([1]) OV L 62, 2.3.2001., 3. lpp.
([2]) OV L 243, 15.7.2004., 10. lpp.
([3]) OV L 108, 27.4.1999., 21. lpp.

(43) Novērtējums rāda, ka ir izpildīti Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 1. punkta nosacījumi, lai atļautu izmantot šādu preparātu.

(44) Attiecīgi šā mikroorganisma preparāta izmantošana, kā norādīts IV pielikumā, jāatļauj uz četriem gadiem.

(45) Šo pieteikumu novērtējums rāda, ka nepieciešamas dažas procedūras, lai aizsargātu strādniekus no piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumu ieviešanu, kas veicina darba ņēmēju darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu ([4]).

(46) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

"Fermentu" grupas preparātus, kas uzskaitīti I pielikumā, ir atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā dzīvnieku barības piedevas, ievērojot nosacījumus, kas uzskaitīti šajā I pielikumā.

2. pants

"Krāsvielu, ieskaitot pigmentus, citu krāsvielu" grupas vielas, kas uzskaitītas II pielikumā, ir atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā dzīvnieku barības piedevas, ievērojot nosacījumus, kas uzskaitīti šajā II pielikumā.

3. pants

"Fermentu" grupas preparātus, kas uzskaitīti III pielikumā, ir atļauts pagaidu kārtā izmantot četrus gadus kā dzīvnieku barības piedevas, ievērojot nosacījumus, kas uzskaitīti šajā III pielikumā.

4. pants

"Mikroorganismu" grupas preparātu, kas uzrādīts IV pielikumā, ir atļauts pagaidu kārtā izmantot četrus gadus kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot nosacījumus, kas uzskaitīti šajā IV pielikumā.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

([4]) OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 2. martā

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

I PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1619	Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un endo-l,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: alfa-amilāze: 200 KNU (1)/g endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 350 FBG (2)/g šķidrā veidā: alfa-amilāze: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 225 FBG/ml	Gaļai audzējamie cāļi	—	Alfa-amilāze: 10 KNU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: alfa-amilāze: 20–40 KNU, endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 35–70 FBG. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un beta-glikāniem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % graudaugu (miežus, auzas, kviešus, rudzus, tritikāli vai kukurūzu).	Beztermiņa
					Endo-1,4-beta-glikanāze: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacililizīns EC 3.4.24.28 Endo-1,4,-betaksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) iegūts bacilolizīna un ar *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U (3)/g endo-1,4-beta-glikanāze: 4 000 U (4)/g alfa-amilāze: 400 U (5)/g bacilolizīns: 450 U (6)/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 20 000 U (7)/g	Gaļai audzējamie cāļi	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 587 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 175–2 350 U, endo-1,4-beta-glikanāze: 2 000–4 000 U, alfa-amilāze: 200–400 U, bacilolizīns: 225–450 U, endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 000–20 000 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 45 % kviešu.	Beztermiņa
					Endo-1,4-beta-glikanāze: 1 000 U	—		
					Alfa-amilāze: 100 U	—		
					Bacilolizīns: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U	—		

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības			
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Endo-1,4,-betaksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 10 000 U [3]/g endo-1,4-beta-glikanāze: 120 000 U [4]/g alfa-amilāze: 400 U [5]/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 210 000 U [7]/g	Gaļai audzējamie cāļi	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 000–2 000 U, endo-1,4-beta-glikanāze: 12 000–24 000 U, alfa-amilāze: 40–80 U, endo-1,4-beta-ksilanāze: 21 000–42 000 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 45 % kviešu.	Beztermiņa
					Endo-1,4-beta-glikanāze: 6 000 U	—		
					Alfa-amilāze: 20 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 500 U	—		
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Preparāts no endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes, kas iegūtas no *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), ar šādu minimālo aktivitāti: granulās: 6 000 U [8]/g 8 250 EXU [9]/g šķidrā veidā: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Gaļai audzējamie cāļi	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 BGU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 BGU, endo-1,4-beta-ksilanāze: 680 EXU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % miežu, vai 20 % rudzu.	Beztermiņa
					Endo-1,4-beta-ksilanāze: 680 EXU	—		

(1) 1 KNU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,6 un temperatūra 37 °C, minūtē no šķīstošās cietes atbrīvo 672 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(2) 1 FBG ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(3) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 7,5 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(4) 1U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no karboksimetilcelulozes atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(5) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 7,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no ūdenī nešķīstoša piesaistīta cietes polimēra substrāta izdala 1 mikromolu glikozīdu savienojumu.
(6) 1U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 7,5 un temperatūra 37 °C, minūtē izdala 1 mikrogramu trihloretiķskābē šķīstoša azokazeīna.
(7) 1U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,3 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 0,0067 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(8) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 40 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,278 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(9) 1 EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no kviešu arabinoksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).

II PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
Krāsvielas, ieskaitot pigmentus								
2. **Citas krāsvielas**								
E 102	Tartrazīns	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	Beztermiņa
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	Beztermiņa
E 110	Saulrieta dzeltenā FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	Beztermiņa
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	Beztermiņa
E 131	Patentzilā V	5-hidroksi-4′,4″-bis (dietilamino)-trifenil-karbinol-2,4-disulfoskābes kalcija sāls	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	Beztermiņa
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	Beztermiņa
E 141	Hlorofila – vara komplekss	—	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	Beztermiņa
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	Beztermiņa

III PIELIKUMS

EK Nr. vai Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
51	Endo-1,4,-betaksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā un šķidrā veidā: 100 IU [1]/g vai ml	Dējējvistas	—	10 IU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 10 IU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar arabinoksilāniem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu vai miežu.	2009. gada 6. marts
28	3-fitāze EC 3.1.3.8	No *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) iegūts 3-fitāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 5 000 PPU [2]/g šķidrā veidā: 1 000 PPU/g	Gaļas tītari	—	250 PPU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norādīt glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 250–1 000 PPU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,22 % fosfora fitīna savienojumu.	2009. gada 6. marts
			Sivēnmātes	—	250 PPU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norādīt glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500–1 000 PPU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,22 % fosfora fitīna savienojumu.	2009. gada 6. marts

[1] 1 IU ir fermenta daudzums, kas pie pH 4,5 un 30 °C temperatūrā 1 minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
[2] 1 PPU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta izdala 1 mikromolu neorganiskā fosfāta.

IV PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* preparāts, kas mikroinkapsulētā veidā satur ne mazāk kā: 5×10^9 CFU/g	Suņi	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	2009. gada 6. marts
			Kaķi	—	5×10^6	8×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	2009. gada 6. marts