UREDBA KOMISIJE (ES) št. 358/2005

z dne 2. marca 2005

o dovoljenjih brez roka za nekatere dodatke in dovoljenju novih uporab dodatkov, ki so že dovoljeni v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1] in zlasti člena 3 in člena 9d(1) in člena 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali [2] in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali v Evropski uniji.

(2) Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe glede zahtevkov za dovoljenje za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524 pred datumom začetka uporabe navedene uredbe.

(3) Zahtevki za dovoljenje za dodatke, naštete v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4) Začetne pripombe držav članic na te zahtevke so bili predloženi na podlagi člena 4(4) Direktive 70/524/EGS in so bile poslane Komisiji pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Takšni zahtevki bodo torej še naprej obravnavani v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5) Uporaba encimskega pripravka alfa-amilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 654/2000 [3].

(6) V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(7) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je 15. septembra 2004 dala pozitivno mnenje o potencialu mikroorganizmov, ki proizvajajo ta encimski pripravek, za tvorbo toksinov.

(8) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(9) Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), je bila začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2437/2000 [4].

(10) V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(11) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(12) Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), je bila začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2437/2000.

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).
[2] UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
[3] UL L 79, 30.3.2000, str. 26.
[4] UL L 280, 4.11.2000, str. 28.

(13) V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(14) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(15) Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 ([1]).

(16) V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(17) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(18) Skladno s tem je treba uporabo teh štirih encimskih pripravkov, kakor je določena v Prilogi I, dovoliti brez roka.

(19) Uporaba snovi „tartrazin“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 2697/2000 ([2]).

(20) V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(21) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(22) Uporaba snovi „oranžno FCF“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo (ES) št. 2697/2000.

(23) V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(24) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(25) Uporaba snovi „modro V“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo (ES) št. 2697/2000.

(26) V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(27) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(28) Uporaba snovi „klorofil bakrov kompleks“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo (ES) št. 2697/2000.

(29) V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(30) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(31) Skladno s tem je treba uporabo teh štirih barvil, kakor je določena v Prilogi II, dovoliti brez roka.

(32) Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), je dovoljena brez roka za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1259/2004 ([3]) in začasno za pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 937/2001 ([4]), za purane za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2188/2002 ([5]) in za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 261/2003 ([6]).

(33) V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka za nesnice so bili predloženi novi podatki.

([1]) UL L 191, 7.7.1998, str. 15.
([2]) UL L 319, 16.12.2000, str. 1.
([3]) UL L 239, 9.7.2004, str. 8.
([4]) UL L 130, 12.5.2001, str. 25.
([5]) UL L 333, 10.12.2002, str. 5.
([6]) UL L 37, 13.2.2003, str. 12.

(34) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je dala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za to dodatno kategorijo živali, pod pogoji, določenimi v Prilogi III k tej Uredbi.

(35) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za dovoljenje takega pripravka za navedeno uporabo določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(36) Uporaba encimskega pripravka 3-fitaze, ki ga proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), je dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 418/2001 ([1]).

(37) V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka za purane za pitanje in svinje so bili predloženi novi podatki.

(38) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je dala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za te dodatne kategorije živali, pod pogoji, določenimi v Prilogi III k tej Uredbi.

(39) Skladno s tem je treba uporabo teh dveh encimskih pripravkov, kakor je določena v Prilogi III, dovoliti za štiri leta.

(40) Uporaba pripravka iz mikroorganizmov *Enterococcus faecium* je dovoljena brez roka za teleta z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004 ([2]) in začasno do 30. junija 2004 za piščance za pitanje, pujske, prašiče za pitanje, svinje in govedo za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 866/1999 ([3]).

(41) V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega pripravka iz mikroorganizmov za pse in mačke so bili predloženi novi podatki.

(42) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je dala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za to dodatno kategorijo živali, pod pogoji, določenimi v Prilogi IV k tej Uredbi.

(43) Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za dovoljenje takega pripravka za navedeno uporabo določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(44) Skladno s tem je treba uporabo teh pripravkov iz mikroorganizmov, kakor je določena v Prilogi IV, dovoliti za štiri leta.

(45) Ocena teh zahtevkov kaže, da je treba zahtevati določene postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz Prilog. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu ([4]).

(46) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določeno v Prilogi I, se dovolijo za uporabo brez roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi I.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Barvila, vključno s pigmenti, druga barvila“, kot je določeno v Prilogi II, se dovolijo za uporabo brez roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi II.

Člen 3

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določeno v Prilogi III, se začasno dovolijo za štiri leta kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi III.

Člen 4

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je določeno v Prilogi IV, se začasno dovoli za štiri leta kot dodatek v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi IV.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

([1]) UL L 62, 2.3.2001, str. 3.
([2]) UL L 243, 15.7.2004, str. 10.
([3]) UL L 108, 27.4.1999, str. 21.
([4]) UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU
Član Komisije

PRILOGA I

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Encimi								
E 1619	Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek alfa-amilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika – prevlečena: Alfa-amilaza: 200 KNU ([1])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG ([2])/g Tekoča oblika: Alfa-amilaza: 130 KNU ([1])/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml	Piščanci za pitanje	—	Alfa-amilaza: 10 KNU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: Alfa-amilaza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35–70 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s škrobom in beta-glukani, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žit (npr. ječmen, oves, pšenico, rž, tritikalo, ali koruzo).	Brez roka
					Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Bacilolizin EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U ([4])/g Alfa-amilaza: 400 U ([5])/g Bacilolizin: 450 U ([6])/g Endo-1,4-beta-ksilanaza:20 000 U ([7])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000–4 000 U Alfa-amilaza: 200–400 U bacilolizin: 225–450 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000–20 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 45 % pšenice.	Brez roka
					Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U	—		
					Alfa-amilaza: 100 U	—		
					Bacilolizin: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U	—		

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 000 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 120 000 U ([4])/g Alfa-amilaza: 400 U ([5])/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 210 000 U ([7])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000–2 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000–24 000 U Alfa-amilaza: 40–80 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 21 000–42 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 45 % pšenice.	Brez roka
					Endo-1,4-beta-glukanaza: 6 000 U	—		
					Alfa-amilaza: 20 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 500 U	—		
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) z najmanjšo aktivnostjo: V granulirani obliki: 6 000 FBG ([8])/g 8 250 U ([9])/g Tekoča oblika: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Piščanci za pitanje	—	endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena ali 20 % rži.	Brez roka
					endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU je količina encima, ki sprosti 672 mikromolov reduktivnih sladkorjev (ekvivalenta glukoze) iz topnega škroba na minuto pri pH 5,6 in 37 °C.
([2]) 1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.
([3]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 7,5 in 30 °C.
([4]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
([5]) 1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega škrobnega polimera na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([6]) 1 U je količina encima, ki tvori 1 mikrogram azo-kazeina, topnega v triklorocetni kislini na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([7]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0067 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.
([8]) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,278 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 3,5 in 30 °C.
([9]) 1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz pšenice na minuto pri pH 3,5 in 55 °C.

PRILOGA II

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					mg/kg popolne krmne mešanice			
Barvila, vključno s pigmenti								
2. **Druga barvila**								
E 102	Tartrazin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka
E 110	Oranžno FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka
E 131	Modro V	Kalcijeva sol 5-hidroksi-4′,4″-bis (dietilamino)-trifenil-karbinol-2,4-disulfonska kislina	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka
E 141	Klorofil bakrov kompleks	—	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka

PRILOGA III

Številka ES ali št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Encimi								
51	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) z najmanjšo aktivnostjo: Trdna in tekoča oblika: 100 IU [1]/g ali ml	Kokoši nesnice	—	10 IU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 IU. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah arabinoksilana, npr. z vsebnostjo najmanj 40 % pšenice ali ječmena.	6. marec 2009
28	3-fitaza EC 3.1.3.8	Pripravek iz 3-fitaze, ki ga proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 5 000 PPU [2]/g Tekoča oblika: 1 000 PPU/g	Purani za pitanje	—	250 PPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 250–1 000 PPU. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja	6. marec 2009
			Svinje	—	250 PPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 PPU. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja.	6. marec 2009

([1]) 1 IU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz brezovega lesa na minuto pri pH 4,5 in 30 °C.
([2]) 1 PPU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5 in 37 °C.

PRILOGA IV

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Pripravek *Enterococcus faecium*, ki vsebuje minimalno mikroinkapsulirano obliko: 5×10^9 CFU/g	Psi	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6. marec 2009
			Mačke	—	5×10^6	8×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6. marec 2009