2026/2070

18.9.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/2070

z dnia 17 września 2026 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2026/164 w odniesieniu do 2-chloroetanolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ([1]), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Roztwór wodny chlorku choliny i preparat chlorku choliny zostały dopuszczone jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2026/164 ([2]).

(2) W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2026/164 poziom 2-chloroetanolu jest wyrażony nieprawidłowo, ponieważ wyrażony poziom odpowiada poziomowi 2-chloroetanolu w przedmiotowych dodatkach, ale nie w substancji czynnej. Ponadto poziom ten nie powinien odnosić się do 2-chloroetanolu, lecz do sumy tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażonej jako tlenek etylenu.

(3) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2026/164.

(4) Aby zachować uzasadnione oczekiwania podmiotów działających na rynku pasz oraz zapewnić pewność prawa, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i być stosowane z mocą wsteczną od daty wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2026/164.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE) 2026/164 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

([1]) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2026/164 z dnia 26 stycznia 2026 r. dotyczące przedłużenia zezwolenia na stosowanie roztworu wodnego chlorku choliny i preparatu chlorku choliny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 795/2013 (Dz.U. L, 2026/164, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/164/oj).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2026 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu								
3a890i	Chlorek choliny	*Skład dodatku* Roztwór wodny zawierający co najmniej 74 % chlorku choliny *Charakterystyka substancji czynnej* Chlorek choliny $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Numer CAS: 67-48-1 Postać stała wytwarzana w procesie syntezy chemicznej Kryteria czystości: min. 99 % bezwodnej masy 2-chloroetanol: maksymalnie 40 mg/kg tlenku etylenu ([1]) (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) *Metoda analityczna* ([2]) Do oznaczania ilościowego kwasu chlorku choliny w dodatku paszowym, premiksach, mieszankach paszowych i wodzie do pojenia: chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	Wszystkie gatunki zwierząt	-	-	-	1. Dodatek może być stosowany w wodzie do pojenia. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów podaje się warunki przechowywania, stabilność przy obróbce cieplnej oraz stabilność w wodzie do pojenia. 3. Nie zezwala się na jednoczesne stosowanie chlorku choliny w paszy i w wodzie do pojenia. 4. Etykieta paszy dla drobiu lub świń zawierającej chlorek choliny zawiera następującą informację: „W przypadku drobiu i świń zaleca się nieprzekraczanie poziomu suplementacji 1 000 mg chlorku choliny/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.”. 5. Instrukcje stosowania paszy dla drobiu lub świń zawierającej chlorek choliny zawierają następującą informację: „Nie zezwala się na jednoczesne stosowanie z wodą do pojenia, do której dodano chlorek choliny.”.	16 lutego 2036 r.

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
							6. Podmioty działające na rynku pasz wprowadzają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.	

([1]) Chociaż poziom 40 mg jest wyrażony jako tlenek etylenu, odnosi się on do obecności zanieczyszczenia 2-chloroetanolem. Metoda analizy wymaga, aby 2-chloroetanol był wyrażony w ten sposób.
([2]) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu								
3a890ii	Chlorek choliny	*Skład dodatku* Preparat zawierający co najmniej 50 % chlorku choliny Postać stała	Wszystkie gatunki zwierząt	-	-	-	1. Dodatek może być stosowany w wodzie do pojenia.	16 lutego 2036 r.

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		Charakterystyka substancji czynnej Chlorek choliny $C_5H_{14}Cl{\cdot}NO$ Numer CAS: 67-48-1 Postać stała wytwarzana w procesie syntezy chemicznej Kryteria czystości: min. 99 % bezwodnej masy 2-chloroetanol: maksymalnie 40 mg/kg tlenku etylenu ([1]) (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) *Metoda analityczna* ([2]) Do oznaczania ilościowego kwasu chlorku choliny w dodatku paszowym, premiksach, mieszankach paszowych i wodzie do pojenia: chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną (IC-CD)					2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów podaje się warunki przechowywania, stabilność przy obróbce cieplnej oraz stabilność w wodzie do pojenia. 3. Nie zezwala się na jednoczesne stosowanie chlorku choliny w paszy i w wodzie do pojenia. 4. Etykieta paszy dla drobiu lub świń zawierającej chlorek choliny zawiera następującą informację: „W przypadku drobiu i świń zaleca się nieprzekraczanie poziomu suplementacji 1 000 mg chlorku choliny/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej." 5. Instrukcje stosowania paszy dla drobiu lub świń zawierającej chlorek choliny zawierają następującą informację: „Nie zezwala się na jednoczesne stosowanie z wodą do pojenia, do której dodano chlorek choliny."	

Numer identyfikacyjny dodatku	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
							6. Podmioty działające na rynku pasz wprowadzają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.	

([1]) Chociaż poziom 40 mg jest wyrażony jako tlenek etylenu, odnosi się on do obecności zanieczyszczenia 2-chloroetanolem. Metoda analizy wymaga, aby 2-chloroetanol był wyrażony w ten sposób.

([2]) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.