Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO (CE) N. 902/2009 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 2009

►C1 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 256 del 29.9.2009, pag. 23)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 316 del 13.12.2018, pag. 23 (902/2009)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 902/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

▼C1

relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a8	Roal Oy	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Composizione dell'additivo: ►**C1** Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 114044) avente un'attività minima di: ◄ in forma solida: 4×10^6 BXU (1)/g in forma liquida: 4×10^5 BXU/g Caratterizzazione della sostanza attiva: ►**C1** Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 114044) ◄ Metodo di analisi (2): Nell'additivo e nella premiscela: prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri riduttori a pH 5,3 e a 50 °C Nei mangimi: metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall'enzima a partire dal substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina	Suinetti (svezzati)	—	24 000 BXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento 4. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	19.10.2019
				Polli da ingrasso		8 000 BXU			
				►**C1** Pollastre allevate per la produzione di uova ◄		8 000 BXU			
				Tacchini da ingrasso		16 000 BXU			
				Tacchini allevati per la riproduzione		16 000 BXU			

(1) 1 BXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori come lo xilosio proveniente da xilano di betulla, al minuto con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives