Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 226/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2007 година

за разрешаване на *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 и Levucell SC10 ME) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 26)

Изменен с:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1018/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 година	L 307	56	7.11.2012 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2260 на Комисията от 15 декември 2016 година	L 342	14	16.12.2016 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 226/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2007 година

за разрешаване на *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 и Levucell SC10 ME) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, принадлежащ към категория добавки „зоотехнически добавки“ и към функционална група „стабилизатори на чревната флора“, е разрешен като добавка при храненето на животните съгласно условията, предвидени в посоченото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Име на притежателя на разрешителното	Добавка (търговско наименование)	Състав, химическа формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Изтичане на срока на разрешителното
						CFU/kg готова храна за животни, съдържание на влага 12 %			
Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG, представлявано от Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Състав на добавката:** Твърда форма: Препарат от *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 от жизнеспособни клетки в суха форма с гарантирана минимална концентрация от 2×10^{10} CFU/g. Форма с покритие: Препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 от жизнеспособни клетки в суха форма с гарантирана минимална концентрация от 1×10^{10} CFU/g. **Характеристики на активното вещество:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % от жизнеспособни клетки в суха форма и 14 % от нежизнеспособни клетки. **Аналитичен метод** (1) Метод „заливане на блюдо“ и полимеразна верижна реакция (PCR)	Млекодайни кози Млекодайни овце	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. В упътванията за употреба на добавките и премиксите да се упоменат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността на гранулиране. 2. В допълващите фуражи да не се надвишава 50 °C с Levucell SC20 и 80 °C с Levucell SC10ME. 3. Форма с покритие, само за прибавяне към гранулирани фуражи. 4. Препоръчителна доза за млекодайни кози и млекодайни овце: 4×10^9 CFU на животно за ден. 5. Ако продуктът се обработва или смесва в затворена среда, се препоръчва да се използват предпазни очила и маски при смесването, ако миксерите не са оборудвани с изпускателни уредби.	22 март 2017 г.

(1) Аналитичните методи са описани подробно на страницата на Референтната лаборатория на Общността на следния адрес: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/