Официален вестник
на Европейския съюз

BG
Серия L

2026/2335

22.10.2026 г.

ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2026/2335 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2026 година

относно мониторинга на наличието на хлорирани парафини в храните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1) През 2020 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) прие становище относно хлорираните парафини във фуражите и храните ([1]), често наричани в аналитичната химия полихлорирани алкани (PCA). Органът отбеляза, че не е могъл да извърши надеждна оценка на експозицията и следователно пълно характеризиране на риска поради липса на данни, и стигна до заключението, че поради това към онзи момент не е било целесъобразно да се изведе основана на здравни критерии ориентировъчна стойност за хлорираните парафини. Органът препоръча, наред с другото, да се разработят валидирани методи за анализ, с които да се определя наличието на хлорирани парафини, както и подходящи стандарти за хлорирани парафини и референтни материали. Органът също така препоръча за надеждна оценка на експозицията на човека да се съберат повече данни относно наличието в храните на късоверижни хлорирани парафини (SCCP), средноверижни хлорирани парафини (MCCP) и дълговерижни хлорирани парафини (LCCP), известни също като PCA с дължина на веригата C_{10} —C_{13}, C_{14} — C_{17} и C_{18} —C_{30}.

(2) От работата на референтната лаборатория на Европейския съюз за халогенирани устойчиви органични замърсители (УОЗ) във фуражите и храните по разработването и валидирането на метод за анализ на хлорираните парафини в храните е видно, че метод за анализ на всички хлорирани парафини, включително LCCP, е наличен едва в няколко специализирани лаборатории.

(3) Поради това, за да се даде възможност за събиране на надеждни данни и тъй като PCA с дължина на веригата C_{10}—C_{17} са преобладаващата група PCA, присъстващи в храните, следва да се приложи аналитичен подход, при който сумата от тези PCA в храните следва да се определя чрез метод за анализ, за който оборудването е по-широко достъпно, а анализът — по-малко затрудняващ. Въпреки това, за да се гарантира, че се извършва достатъчно подробен анализ, без да се надвишава капацитетът на експертните лаборатории, и по-специално за да се събере повече информация за специфичното разпределение в храните на PCA с различна дължина на веригата, както и за корелацията на сумата от PCA с дължина на веригата C_{10}—C_{17} с по-дълговерижни PCA, пробите от конкретни групи храни, надвишаващи определен праг за сумата от тези PCA, получена от съществуващите данни, следва да подлежат на анализ в експертни лаборатории за всички PCA, включително PCA с дължина на веригата C_{18}—C_{30}.

(4) Поради това е целесъобразно да се препоръча мониторинг на хлорираните парафини в храните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

(1) Държавите членки съвместно със стопанските субекти в областта на храните следва да следят за наличието на хлорирани парафини в храните през 2026, 2027, 2028 и 2029 г.

(2) Мониторингът следва да включва групи храни, както е посочено в точка (4).

(3) Сумата от PCA с дължина на веригата C_{10}—C_{17} следва да бъде определена чрез газова хроматография/тандемна масспектрометрия (GC-MS/MS) или газова хроматография, съчетана с масспектрометрия с ниска разделителна способност (GC-LRMS). Когато се прилагат алтернативни техники за измерване, следва да бъдат налице доказателства, че те също дават резултати за сумата от PCA с дължина на веригата C_{10}—C_{17}. В случай, че установеното ниво на сумата от PCA с дължина на веригата C_{10}—C_{17} е по-високо от праговата стойност, посочена в точка (4), следва да се извърши анализ на всички PCA, в т.ч. PCA с дължина на веригата C_{18}—C_{30}, с използване на течна хроматография (LC) или газова хроматография (GC), съчетана с масспектрометрия с висока разделителна способност (HRMS).

([1]) Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2020 г. Scientific Opinion — Risk assessment of chlorinated paraffins in feed and food (Научно становище — Оценка на риска от хлорирани парафини във фуражите и храните). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020 г.;18(3):5991, 220 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5991.

(4) Праговите стойности на сумата от PCA с дължина на веригата C_{10}—C_{17} са следните:

за риба	100 ng/g мокро тегло
за млякото и млечните продукти:	20 ng/g мокро тегло
за растителни и животински масла и мазнини	1 000 ng/g мазнина
за продукти от животински произход, различни от риба, мляко, млечни продукти и животински мазнини (напр. месо, яйца,...)	300 ng/g мазнина
за преработени храни (цели ястия)	50 ng/g мокро тегло
за детски храни	20 ng/g мокро тегло

(5) Държавите членки и операторите в сектора на храните следва да предоставят данните на Органа с цел съставяне на единна база данни в съответствие с изискванията на насоките на Органа относно стандартното описание на пробите за храни и фуражи (Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed) и с допълнителните специални изисквания за докладване на Органа ([2]).

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2026 година.

За Комисията
Olivér VÁRHELYI
Член на Комисията

([2]) https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.