Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/899,

8. juuni 2016,

milles käsitletakse *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja ►M2 Genencor International B.V. ◄)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 152, 9.6.2016, lk 15)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/221, 6. veebruar 2019	L 35	28	7.2.2019
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/2183, 2. september 2024	L 2183	1	3.9.2024

▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/899,

8. juuni 2016,

milles käsitletakse *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja ►M2 Genencor International B.V. ◄)

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine ühikut ühes kilogrammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained									
4a24	►**M2** Genencor International B.V. ◄	6-fütaas EC 3.1.3.26	*Söödalisandi koostis* *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaas, mille minimaalne aktiivsus on 15 000 U ([1])/g. Vedelal kujul *Toimeaine kirjeldus* *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) *Analüüsimeetod* ([2]) Selleks et kvantifitseerida 6-fütaasi aktiivsust söödalisandis: — kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga. 6-fütaasi aktiivsuse mõõtmiseks eelsegus ja söödas: — kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga: EN ISO 30024.	Kõik kodulinnuliigid Kõik sealiigid (v.a piimapõrsad)	—	250 U	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik maksimumkogus: 2 000 U kilogrammi sööda kohta. 3. Söödatööstuses söödalisandi ja eelsegu kasutajatele kehtestatakse ohutu kasutamise kord ja asjakohased korralduslikud meetmed, et vältida sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid ohte. Kui naha kaudu, sissehingamise või silma sattumise teel toimuvat kokkupuudet ei ole nende eeskirjade ja meetmete abil võimalik vähendada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegu käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.	29. juuni 2026

([1]) U on ensüümi kogus, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
([2]) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.