Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/899 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione ►M2 Genencor International B.V. ◄]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione del 6 febbraio 2019	L 35	28	7.2.2019
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione del 2 settembre 2024	L 2183	1	3.9.2024

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/899 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione ►M2 Genencor International B.V. ◄]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a24	►**M2** Genencor International B.V. ◄	6-fitasi EC 3.1.3.26	*Composizione dell'additivo* Preparato di 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) con un'attività minima di 15 000 U ([1])/g Forma liquida: *Caratterizzazione della sostanza attiva* 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) *Metodo di analisi* ([2]) Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nell'additivo per mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato. Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nelle premiscele e nei mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi su fitato: EN ISO 30024.	Tutte le specie avicole Tutte le specie suine (suinetti lattanti esclusi)	—	250 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose massima raccomandata: 2 000 U/kg di mangime. 3. È necessario stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di inalazione e di contatto per via cutanea o oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi. Se i contatti sopra elencati non possono essere ridotti ad un livello accettabile dalle suddette procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.	29 giugno 2026

([1]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.
([2]) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports