Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2026/2028

11.9.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/2028

ze dne 10. září 2026

o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ELOCLEAR“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 29. června 2022 předložila společnost Arrow Regulatory (Ireland) Ltd žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek s názvem „ELOCLEAR“, který je typem přípravku 2 a 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Francie, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-HD078032-58.

(2) Přípravek „ELOCLEAR“ obsahuje aktivní chlor vyrobený elektrolýzou z chloridu sodného, který je zařazen na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2 a 4.

(3) Dne 11. března 2025 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení agentuře.

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 2. října 2025 Komisi stanovisko ([2]), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro přípravek „ELOCLEAR“ a závěrečnou zprávu o posouzení tohoto jednotlivého biocidního přípravku.

(5) Agentura dospěla k závěru, že přípravek „ELOCLEAR“ spadá do definice jednotlivého biocidního přípravku uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. r) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilý pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a při souladu s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6) Dne 20. října 2025 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7) Komise se stanoviskem agentury souhlasí, a domnívá se tedy, že povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ELOCLEAR“ je vhodné udělit.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 10. září 2025 k povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ELOCLEAR“ (ECHA/BPC/492/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Agentura ve svém stanovisku odhalila nedostatky v údajích o analytické metodě použité pro analýzu účinné látky v přípravku a doporučuje, aby držitel povolení poskytl údaje o výtěžnosti analytické metody pro účinnou látku, nebo zdůvodnění pro upuštění od těchto údajů, jako podmínku v povolení. Komise s uvedeným doporučením souhlasí a domnívá se, že držitel povolení by měl určit přesnost navrhované metody poskytnutím údajů o výtěžnosti účinné látky nebo zdůvodněním upuštění od těchto údajů jako podmínku týkající se dodávání biocidního přípravku na trh a jeho používání podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise se rovněž domnívá, že skutečnost, že údaje mají být poskytnuty po udělení povolení, nemá vliv na závěr o splnění podmínky podle čl. 19 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení na základě stávajících údajů.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Arrow Regulatory (Ireland) Ltd se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0035839-0000 pro dodávání na trh a používání jednotlivého biocidního přípravku „ELOCLEAR“ s výhradou shody s podmínkami stanovenými v příloze I a v souladu se souhrnem vlastností přípravku stanoveným v příloze II.

Povolení Unie je platné ode dne 1. října 2026 do dne 30. září 2036.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Podmínky (EU-0035839-0000)

Do dne 1. dubna 2027 předloží držitel povolení agentuře údaje o výtěžnosti analytické metody použité pro analýzu účinné látky v přípravku, nebo zdůvodnění pro upuštění od těchto údajů, aby prokázal přesnost metody.

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

ELOCLEAR

Typ přípravku (typy přípravků)

PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

PT04: Oblast potravin a krmiv

Číslo povolení: EU-0035839-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0035839-0000

Kapitola 1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Obchodní název (názvy) přípravku**

Obchodní název (názvy)	ELOCLEAR

1.2. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd
	Adresa	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Irsko
Číslo povolení	EU-0035839-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0035839-0000	
Datum udělení povolení	1. října 2026	
Datum skončení platnosti povolení	30. září 2036	

1.3. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	Irelevantní, protože biocidní přípravek generovaný in situ je „vyroben" v místě použití
Adresa výrobce	
Umístění výrobních závodů	Irelevantní, protože biocidní přípravek generovaný in situ je „vyroben" v místě použití

1.4. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	Aktivní chlor generovaný z chloridu sodného elektrolýzou
Jméno (název) výrobce	Irelevantní, protože účinná látka generovaná in situ je „vyrobena" v místě použití
Adresa výrobce	
Umístění výrobních závodů	Irelevantní, protože účinná látka generovaná in situ je „vyrobena" v místě použití

Kapitola 2. **SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Aktivní chlor generovaný z chloridu sodného elektrolýzou		Účinná látka			0,2 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

AL- Jiné kapaliny, přípravek se aplikuje nezředěný

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P406: Skladujte v odolný proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití 1: Dezinfekce tvrdých povrchů postřikem

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: bakterie Obecný název: bakterie Vývojové stadium: všechny Latinský název: plísně Obecný název: plísně Vývojové stadium: všechny Latinský název: kvasinky Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: všechny Latinský název: viry Obecný název: viry Vývojové stadium: všechny Latinský název: spory bakterií Obecný název: spory bakterií Vývojové stadium: všechny Latinský název: mycobacteriaceae Obecný název: mykobakterie Vývojové stadium: všechny Latinský název: bakteriofágy Obecný název: bakteriofágy Vývojové stadium: všechny

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých povrchů v průmyslových a zdravotnických zařízeních, v potravinářském průmyslu (včetně mlékárenského, masného, jatečního a pivovarnického průmyslu)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání Podrobný popis: Postřikem (postřik rozprašovačem, nízkotlaký tlakový postřik 1-3 bary nebo středotlaký tlakový postřik až 7 barů)
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Naneste na povrchy 0,15 l/m² přípravku Ředění (%): 0 Roztok připravený k použití (2000 mg/l dostupného chloru (av Cl)) Počet a načasování aplikace: Typ přípravku 2, při pokojové teplotě: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a sporám bakterií. Pro dezinfekci povrchů (zdravotnictví), po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, virům, sporám bakterií a mykobakteriím; po dobu kontaktu 15 minut proti plísním. Typ přípravku 2, při teplotách nejméně 10 °C a až do pokojové teploty: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím a kvasinkám. Typ přípravku 4, při pokojové teplotě: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů včetně masného průmyslu a pro dezinfekci povrchů v pivovarech, po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a sporám bakterií. Pro povrchovou dezinfekci jatek, po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám a virům. Typ přípravku 4, při teplotách nejméně 10 °C a až do pokojové teploty: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů včetně masného průmyslu, pro dezinfekci povrchů v mlékárenském průmyslu a na jatkách proti bakteriím a kvasinkám po dobu kontaktu 5 minut a proti bakteriofágům pouze pro mlékárenský průmysl. Frekvence: Aplikujte podle potřeby
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Není relevantní

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Roztok 2000 mg/l av Cl, který vzniká elektrolýzou chloridu sodného, naneste přímo na povrch postřikem rozprašovačem, nízkotlakým postřikem (1-3 bary) nebo středotlakým postřikem (až 7 barů).

— Používejte pouze na neporézní povrchy.

— Používejte pouze na předem vyčištěné povrchy.

— Přípravek naneste rovnoměrně na ošetřovaný povrch v takovém množství, aby byl povrch zcela smočen.

— Po uplynutí doby kontaktu opláchněte vodou.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

— Během dezinfekce nízkotlakým nebo středotlakým tlakovým postřikem 1-3 bary a až 7 barů a během oplachování.

Používejte ochranné respirační prostředky (RPE) chránící před kombinací plynů a částic s přiřazeným ochranným faktorem (APF) nejméně 4. Alespoň přístroj s polomaskou/čtvrtmaskou (EN140 nebo ekvivalent) s kombinovaným filtrem plyn/P3: filtr částic P3 podle normy EN 143 a filtr plynu podle normy EN 14387.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplný odkaz na tento předpis naleznete v oddíle 6.

— Během dezinfekce tlakovým postřikovačem (nízkotlakým a středotlakým) a do doby, než je koncentrace aktivního chloru ve vzduchu nižší než přijatelná expoziční koncentrace (AEC) 0,5 mg/m³ nebo nižší národní referenční hodnota, nesmí být přítomny osoby přihlížející ani široká veřejnost. Profesionální přihlížející osoby musí používat stejnou ochranu dýchacích cest jako profesionální uživatel, pokud je jejich přítomnost nezbytná.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití 2: Dezinfekce tvrdých povrchů vytíráním a stíráním

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: bakterie Obecný název: bakterie Vývojové stadium: všechny Latinský název: kvasinky Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: všechny Latinský název: plísně Obecný název: plísně Vývojové stadium: všechny Latinský název: viry Obecný název: viry Vývojové stadium: všechny Latinský název: spory bakterií Obecný název: spory bakterií Vývojové stadium: všechny Latinský název: mycobacteriaceae Obecný název: mykobakterie Vývojové stadium: všechny Latinský název: bakteriofágy Obecný název: bakteriofágy Vývojové stadium: všechny

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce tvrdých povrchů v průmyslových a zdravotnických zařízeních, v potravinářském průmyslu (včetně mlékárenského, masného, jatečního a pivovarnického průmyslu)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: vytírání/stírání Podrobný popis: Aplikace vytíráním/stíráním
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Na povrch naneste 0,15 l/m² přípravku Ředění (%): 0 Roztok připravený k použití (2000 mg/l dostupného chloru (av Cl)) Počet a načasování aplikace: Typ přípravku 2, při pokojové teplotě: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a sporám bakterií. Pro dezinfekci povrchů (zdravotnictví), po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, virům, sporám bakterií a mykobakteriím; po dobu kontaktu 15 minut proti plísním. Typ přípravku 2, při teplotách nejméně 10 °C a až do pokojové teploty: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím a kvasinkám. Typ přípravku 4, při pokojové teplotě: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů včetně masného průmyslu a pro dezinfekci povrchů v pivovarech, po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a sporám bakterií. Pro povrchovou dezinfekci jatek, po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám a virům. Typ přípravku 4, při teplotách nejméně 10 °C a až do pokojové teploty: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů včetně masného průmyslu, pro dezinfekci povrchů v mlékárenském průmyslu a na jatkách proti bakteriím a kvasinkám po dobu kontaktu 5 minut a proti bakteriofágům pouze pro mlékárenský průmysl. Frekvence: Aplikujte podle potřeby
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Není relevantní

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Ponořte mop nebo hadr do kbelíku s roztokem 2000 mg/l av Cl, který vzniká elektrolýzou chloridu sodného. Zajistěte důkladné navlhčení povrchu.

— Používejte pouze na neporézní povrchy.

— Používejte pouze na předem vyčištěné povrchy.

— Přípravek naneste rovnoměrně na ošetřovaný povrch v takovém množství, aby byl povrch zcela smočen.

— Po uplynutí doby kontaktu opláchněte vodou.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití 3: Dezinfekce vnitřních povrchů (čištění na místě)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: bakterie Obecný název: bakterie Vývojové stadium: všechny Latinský název: kvasinky Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: všechny Latinský název: plísně Obecný název: plísně Vývojové stadium: všechny Latinský název: viry Obecný název: viry Vývojové stadium: všechny Latinský název: spory bakterií Obecný název: spory bakterií Vývojové stadium: všechny Latinský název: bakteriofágy Obecný název: bakteriofágy Vývojové stadium: všechny
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce vnitřního povrchu v potravinářském průmyslu (obecná dezinfekce včetně masného průmyslu a specifických odvětví (mlékárenský průmysl, jatka a pivovarnictví).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Čištění na místě (CIP) s recirkulací nebo bez ní Podrobný popis:
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Na povrch naneste 0,15 l/m^2 přípravku Ředění (%): 0 Roztok připravený k použití (2000 mg/l dostupného chloru (av Cl)) Počet a načasování aplikace: Typ přípravku 4, při pokojové teplotě: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů včetně masného průmyslu a pro dezinfekci povrchů v pivovarech, po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a sporám bakterií. Pro povrchovou dezinfekci jatek, po dobu kontaktu 5 minut proti bakteriím, kvasinkám a virům.

	Typ přípravku 4, při teplotách nejméně 10 °C a až do pokojové teploty: Pro všeobecnou dezinfekci povrchů včetně masného průmyslu, pro dezinfekci povrchů v mlékárenském průmyslu a na jatkách proti bakteriím a kvasinkám po dobu kontaktu 5 minut a proti bakteriofágům pouze pro mlékárenský průmysl. Frekvence: Po každém kroku čištění v procesu.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Není relevantní

4.3.1. **Návod k danému způsobu použití**

— Dávkujte přímo do systému roztok 2000 mg/l av Cl vytvořený elektrolýzou v systému, který má být dezinfikován. Dezinfekce se provádí s recirkulací nebo bez ní

— Po aplikaci opláchněte ošetřené povrchy pitnou vodou.

— Používejte pouze na předem vyčištěné povrchy. Po každém kroku čištění v procesu se provádí dezinfekce vnitřních povrchů.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** ([1])

5.1. **Návod k použití**

Pokyny pro dodavatele zařízení:

Technické parametry IGS pro generování koncentrace AS in situ 2000 mg/l:

Technický název zařízení: ELOCUBE nebo ELOSYSTEM

Prekurzor: Potravinářská sůl PDV vyhovující normě BS 998:1990

pH prekurzoru:6 - 8

Dodávka soli se uskutečňuje buď ve formě volně ložené soli s automatickým dávkováním nebo se sůl dodává ručně za vzniku solanky

Použitá proudová hustota: 122,3 A/m^2

([1]) Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

Vstupní průtok prekurzoru byl 11,2 l/min/m²

Vstupní teplota prekurzoru: 18,6 - 19,0 °C

Zařízení jsou vybavena změkčovačem vody

Tvrdost vody: ≤1,0 °dH

Jakékoli další relevantní provozní podmínky: Titanová anoda potažená 100 % rutheniem nebo směsí ruthenia a iridia (<20 %)

Pokyny pro koncového uživatele:

V případě potřeby podpory nahlédněte do příručky k zařízení ELOCUBE/ELOSYSTEM nebo se obraťte na dodavatele zařízení.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Pro ruční míchání a nakládání: Během nakládání prekurzoru se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima a po použití si umyjte ruce.

Zajistěte, aby aplikace probíhala v dobře větraných prostorách.

U potravinářských komodit zajistěte, aby koncentrace chlorečnanu, přítomného v potravinách, nepřekročila hodnoty MRL stanovené nařízením 2020/749.

Po aplikaci přípravku povrchy opláchněte.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Umyjte kůži vodou. Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

— Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

— Nepoužitý výrobek a veškerý ostatní odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

— Produkt vyrobený in situ skladujte na chladném místě chráněném před mrazem mimo dosah přímého slunečního světla a při teplotě nižší než 20 °C.

— Produkt vyrobený in situ lze po generování in situ skladovat na místě maximálně 7 dní při pokojové teplotě.

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

— Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

— Výrobek je stabilní až 7 dní při skladování při pokojové teplotě v HDPE

— Pokud jde o „kategorii (kategorie) uživatele (uživatelů)“: „Odborníky (včetně průmyslových uživatelů)“ se rozumí vyškolení odborníci, pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy.

— Úplné názvy norem EN uvedených v oddíle 4.1.2:

EN 140 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Polomasky a čtvrtmasky – Požadavky, zkoušení a značení

EN 143 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení, značení

EN 14387 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry – Požadavky, zkoušení, značení

— Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Úř. věst L 131, 5.5.1998, s. 11

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj

— Nařízení Komise (EU) 2020/749 ze dne 4. června 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu

Úř. věst L 178, 8.6.2020, s. 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj