2025/1186

18.6.2025.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1186

od 17. lipnja 2025.

o izdavanju odobrenja Unije za pojedinačni biocidni proizvod „exeol air cid 01” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Društvo SODEL podnijelo je 12. lipnja 2024. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 i člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 414/2013 ([2]) za odobrenje Unije za jednaki pojedinačni biocidni proizvod, kako je utvrđeno u članku 1. Provedbene uredbe (EU) br. 414/2013, pod nazivom „exeol air cid 01”, koji pripada vrstama proizvoda 2 i 4 kako su opisane u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012, uz upućivanje na pojedinačni biocidni proizvod pod brojem odluke EU-0029752-0007, koji je dio povezane referentne skupine biocidnih proizvoda „Oxy'Pharm H_2O_2”. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-NA095946-30. U zahtjevu je naveden i broj odobrenja povezane referentne skupine biocidnih proizvoda „Oxy'Pharm H_2O_2”, koja je odobrena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/1764 ([3]) pod brojem odobrenja EU-0029752-0000.

(2) Pojedinačni biocidni proizvod „exeol air cid 01” kao aktivnu tvar sadržava vodikov peroksid, koji je uvršten na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrste proizvoda 2 i 4.

(3) Agencija je 25. listopada 2024. Komisiji dostavila mišljenje ([4]) i nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „exeol air cid 01” u skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 414/2013.

(4) Agencija je u svojem mišljenju zaključila da su predložene razlike između pojedinačnog biocidnog proizvoda „exeol air cid 01” i povezanog pojedinačnog referentnog biocidnog proizvoda pod brojem odluke EU-0029752-0007, koji je dio povezane referentne skupine biocidnih proizvoda „Oxy'Pharm H_2O_2”, ograničene na informacije koje mogu biti predmet administrativne izmjene u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 354/2013 ([5]) te da na temelju ocjene povezane referentne skupine biocidnih proizvoda „Oxy'Pharm H_2O_2” i podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda jednaki pojedinačni biocidni proizvod „exeol air cid 01” ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 414/2013 od 6. svibnja 2013. o određivanju postupka za odobravanje jednakih biocidnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 125, 7.5.2013., str. 4., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).
([3]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1764 od 12. rujna 2023. o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Oxy'Pharm H_2O_2” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 225, 13.9.2023., str. 21., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1764/oj).
([4]) Mišljenje Europske agencije za kemikalije od 25. listopada 2024. o odobrenju Unije za jednaki pojedinačni biocidni proizvod „exeol air cid 01”, UBS-C-1770534-19-00/F (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).
([5]) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 354/2013 od 18. travnja 2013. o izmjenama biocidnih proizvoda odobrenih u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 109, 19.4.2013., str. 4., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Agencija je 25. listopada 2024. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „exeol air cid 01” na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za jednaki pojedinačni biocidni proizvod „exeol air cid 01”.

(7) Datum isteka odobrenja trebalo bi uskladiti s datumom isteka odobrenja za povezanu referentnu skupinu biocidnih proizvoda „Oxy'Pharm H_2O_2”.

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu SODEL izdaje se odobrenje Unije s brojem odobrenja EU-0033504-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu jednakog pojedinačnog biocidnog proizvoda „exeol air cid 01” u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz Priloga.

Odobrenje Unije valjano je od 8. srpnja 2025. do 30. rujna 2033.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

exeol air cid 01

Vrsta(e) proizvoda

PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Broj autorizacije: EU-0033504-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0033504-0000

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Trgovački naziv(i) proizvoda**

Trgovački naziv(i)	exeol air cid 01

1.2. **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	SODEL
	Adresa	190 rue René Barthélémy, 14100 Lisieux, Francuska
Broj autorizacije	EU-0033504-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0033504-0000	
Datum autorizacije	8. srpnja 2025.	
Datum isteka autorizacije	30. rujna 2033.	

1.3. **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	OXY'PHARM
Adresa proizvođača	829 rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	OXY'PHARM site 1 829 rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, Francuska

1.4. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Resource Efficiency GmbH
Adresa proizvođača	Rellinghauser Straße 1—11, 45128 Essen, Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Evonik Industries AG / BL Active Oxygens, Untere Kanalstraße 3, 79618 Rheinfelden, Njemačka

2. **SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	7,9 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

AL Svaka druga tekućina

3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI**

Oznake upozorenja	H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P264: Nakon uporabe ruke temeljito oprati. P280: Nositi zaštitu za oči. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet.

4. **AUTORIZIRANA UPORABA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Upotreba #3.1: Dezinfekcija tvrde površine nebulizatorom pomoću vodikovog peroksida (FHP) od 7,9%

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: –

	Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Micobakterije Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: – Znanstveno ime: - Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: -
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija prostorija nebulizatorom pomoću vodikovog peroksida (FHP), za prostore zapremine između 4 i 150 m^3. To obuhvaća dezinfekciju tvrdih neporoznih površina opreme i materijala (osim medicinskih uređaja) koji se nalaze u tretiranoj prostoriji: — Bolnice i klinike, — laboratoriji za istraživanja i analize (uključujući laboratorije za biosigurnost razine 3 i čiste sobe), — prijevoz u okviru zdravstvene skrbi, — farmaceutska industrija, — industrijske praonice, — stomatološka kirurgija i implantološki centri, — prijevozna sredstva — hoteli, — restorani, — škole, — jaslice, — veterinarske ambulante.
Način(i) primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: Riječ je o proizvodu koji je spreman za upotrebu i stavlja se u uređaj. Ovaj uređaj automatski nebulizira biocidni proizvod u zatvorenom prostoru/sobi koja se dezinficira, a korisnici ili nazočne osobe ne smiju biti prisutni.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: — Djelotvornost baktericidna, na kvasac, fungicidna, gljivica, sporicidna i virucidna: 5 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata. — Mikobactericidna aktivnost (log redukcija ≥ 4): 7 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata. Veličina kapljica: 1-15 µm – Broj i vremenski raspored primjene: Dezinficirajte prostorije i opremu onoliko često koliko je propisano važećim higijenskim protokolom.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1. boca 1 litra od polietilena visoke gustoće (HDPE), bijele boje (neprozirna), s navojnim čepom za otplinjavanje. 2. jednokratna boca 2 litara od polietilena visoke gustoće (HDPE), sive boje (neprozirna). 3. kanistar 5 litara (pakiranje za ponovno punjenje) od polietilena visoke gustoće (HDPE), bijele boje (neproziran). 4. kanistar 20 litara od polietilena visoke gustoće (HDPE), bijele boje (neproziran).

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Površine se moraju očistiti prije dezinfekcije. Proizvod je spreman za upotrebu i treba se koristiti bez razrjeđivanja. Proizvod je namijenjen za opremu kao što je Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair. Pročitati upute prije upotrebe. Koristi se prema sljedećim protokolima:

— Djelotvornost baktericidna, na kvasac, fungicidna, gljivica, sporicidna i virucidna: 5 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata.

— Mikobactericidna aktivnost (log redukcija ≥ 4): 7 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata.

Veličina kapljica: 1-15 µm

Relativna vlažnost: 25% - 75%

Temperatura: sobna temperatura

Poštovati vrijeme kontakta.Vrijeme kontakta počinje kad je u prostoriji prisutna potrebna količina proizvoda.

Korisnik je uvijek dužan provesti mikrobiološku provjeru dezinfekcije prostorija koje se trebaju dezinficirati (ili u odgovarajućoj "standardnoj prostoriji", ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, te se nakon toga može izraditi i koristiti protokol za dezinfekciju tih prostorija.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Prva pomoć

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Ako izložena osoba može gutati treba joj dati da nešto popije. NE izazivati povraćanje. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti s ispiranjem još 5 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Vjerojatni izravni ili neizravni učinci

— Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Upotreba #3.3: Dezinfekcija tvrde površine nebulizatorom pomoću vodikovog peroksida (FHP)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	–
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Micobakterije Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Virusi Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: bakteriofagi Stadij razvoja: – Znanstveno ime: – Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: –
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija prostorije FHP postupkom za tvrde neporozne površine opreme i materijala koji se nalaze u tretiranoj prostoriji zapremine između 4 i 150 m^3: — prehrambena industrija, — javne kuhinje, — restorani.
Način(i) primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: Riječ je o proizvodu koji je spreman za upotrebu i stavlja se u uređaj. Ovaj uređaj automatski nebulizira biocidni proizvod u zatvorenom prostoru/sobi koja se dezinficira, a korisnici ili nazočne osobe ne smiju biti prisutni.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: — Djelotvornost baktericidna, na bakteriofage, na kvasac, fungicidna, sporicidna i virucidna: 5 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata. — Mikobactericidna aktivnost: 7 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata. Veličina kapljica: 1-15 µm – Broj i vremenski raspored primjene: Dezinficirajte prostorije i opremu onoliko često koliko je propisano važećim higijenskim protokolom.

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1. boca 1 litra od polietilena visoke gustoće (HDPE), bijele boje (neprozirna), s navojnim čepom za otplinjavanje. 2. jednokratna boca 2 litara od polietilena visoke gustoće (HDPE), sive boje (neprozirna). 3. kanistar 5 litara (pakiranje za ponovno punjenje) od polietilena visoke gustoće (HDPE), bijele boje (neproziran). 4. kanistar 20 litara od polietilena visoke gustoće (HDPE), bijele boje (neproziran).

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Površine moraju biti očišćene prije dezinfekcije. Proizvod je spreman za upotrebu i treba se koristiti bez razrjeđivanja. Proizvod je namijenjen za opremu kao što je Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair. Pročitati upute prije upotrebe. Koristi se prema sljedećim protokolima:

— Djelotvornost baktericidna, na bakteriofage, na kvasac, fungicidna, sporicidna i virucidna: 5 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata.

— Mikobactericidna aktivnost: 7 ml proizvoda/m^3 i vrijeme kontakta od 2 sata.

Veličina kapljica: 1-15 µm

Relativna vlažnost: 25% - 75%

Temperatura: sobna temperatura

Poštovati vrijeme kontakta.Vrijeme kontakta počinje kad je u prostoriji prisutna potrebna količina proizvoda.

Korisnik je uvijek dužan provesti mikrobiološku provjeru dezinfekcije prostorija koje se trebaju dezinficirati (ili u odgovarajućoj "standardnoj prostoriji", ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, te se nakon toga može izraditi i koristiti protokol za dezinfekciju tih prostorija.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Prva pomoć:

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Ako izložena osoba može gutati treba joj dati da nešto popije. NE izazivati povraćanje. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti s ispiranjem još 5 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Vjerojatni izravni ili neizravni učinci

— Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU** ([1])

5.1. **Upute za uporabu**

-

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Tijekom raspršivanja sobu držati zatvorenom i ne ulaziti unutra. Primjena proizvoda provodi se bez prisutnosti ljudi ili životinja.

Svi otvori u prostoriji (na primjer okviri prozora) iz kojih može procuriti maglica moraju biti zabrtvljeni prije raspršivanja.

Osigurati da se znakom upozorenja tijekom cijelog postupka zabrani pristup području koje se tretira raspršivanjem maglice.

Ne bi trebalo dozvoliti pristup tretiranom području sve dok koncentracija vodikovog peroksida ne bude ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili niža, s obzirom na relevantnu nacionalnu referentnu vrijednost.

Profesionalni korisnik može ući u prostoriju samo u hitnim situacijama kada je razina vodikovog peroksida pala ispod 36 ppm (50 mg/m³) noseći obaveznu sljedeću osobnu zaštitnu opremu (OZO): Zaštitna oprema za disanje (RPE) razvrstana s oznakom EN 14387 ili istovjetnu s dodijeljenim zaštitnim faktorom (AFP) 40 (nositelj odobrenja u podacima o proizvodu treba navesti vrstu RPE-a) i odgovarajuća zaštitna oprema (rukavice razvrstane prema Europskoj normi EN 374 ili istovjetne, zaštita očiju u skladu s Europskom normom EN ISO 16321 ili istovjetna, kombinezon). Nositelj odobrenja u podacima o proizvodu treba navesti materijal rukavica i kombinezona. Za pune nazive normi EN vidjeti odjeljak 6.

Trebalo bi upotrijebiti mjerni uređaj kako bi se osiguralo da koncentracija vodikovog peroksida bude ispod 0,9 ppm ili niža, s obzirom na relevantnu nacionalnu referentnu vrijednosti. Životinje/osobe bez zaštitne opreme smiju ponovno ući u tretiranu prostoriju tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku bude ispod 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) ili niže, s obzirom na relevantnu nacionalnu referentnu vrijednost.

Osobna zaštitna oprema:

Nositi zaštitne naočale otporne na kemikalije u skladu s Europskom normom EN ISO 16321 ili istovjetne, radi zaštite očiju tijekom miješanja i punjenja proizvoda u ambalažu/spremnik koji se izravno koristi u uređaju za nebulizaciju (kao što su Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax ili Nocomax Easy).

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

–

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Nakon postupka odložiti neiskorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima.

Korišteni proizvod može se isprati u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

— Vijek trajanja: 2 godine.

([1]) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

Puni nazivi normi EN spomenuti u odjeljku 5.2. navedeni su u nastavku:

EN 374 – Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama

ISO 16321 – Zaštita očiju i lica u profesionalnoj uporabi

EN 14387 – Zaštitne naprave za disanje – Filtar (filtri) za plin i kombinirani filtar (filtri) – Uvjeti, ispitivanje, označavanje