Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1186

18.6.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/1186

(2025. gada 17. jūnijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju atsevišķajam biocīdam "exeol air cid 01"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2024. gada 12. jūnijā uzņēmums *SODEL* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 ([2]) 4. pantu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā lūdza piešķirt Savienības atļauju Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 1. pantā minētajam vienādajam atsevišķajam biocīdam ar nosaukumu "exeol air cid 01", kas atbilstoši aprakstam Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā pieder pie 2. un 4. produkta veida, par atsauces biocīdu uzskatot atsevišķo biocīdu ar vienuma numuru EU-0029752-0007, kurš pieder pie saistīto atsauces biocīdu saimes "Oxy'Pharm H_2O_2". Biocīdu reģistrā pieteikums tika reģistrēts ar lietas numuru BC-NA095946-30. Pieteikumā bija norādīts arī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/1764 ([3]) atļautās saistīto atsauces biocīdu saimes "Oxy'Pharm H_2O_2" atļaujas numurs EU-0029752-0000.

(2) Atsevišķā biocīda "exeol air cid 01" sastāvā aktīvā viela ir ūdeņraža peroksīds, kas ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā minētajā Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā pie 2. un 4. produkta veida.

(3) 2024. gada 25. oktobrī Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 6. pantu Komisijai iesniedza atzinumu ([4]) un "exeol air cid 01" biocīda raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu.

(4) Atzinumā Aģentūra secina, ka proponētās atšķirības starp atsevišķo biocīdu "exeol air cid 01" un saistīto atsauces atsevišķo biocīdu ar vienuma numuru EU-0029752-0007, kas pieder pie saistīto atsauces biocīdu saimes "Oxy'Pharm H_2O_2", skar tikai tādu informāciju, kas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2013 ([5]) var būt administratīvu izmaiņu priekšmets, un ka, balstoties uz saistīto atsauces biocīdu saimes "Oxy'Pharm H_2O_2" novērtējumu un ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, vienādais atsevišķais biocīds "exeol air cid 01" atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013 (2013. gada 6. maijs), ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 125, 7.5.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1764 (2023. gada 12. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Oxy'Pharm H_2O_2" (OV L 225, 13.9.2023., 21. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1764/oj).

([4]) Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2024. gada 25. oktobra atzinums par vienādā atsevišķā biocīda "exeol air cid 01" Savienības atļauju, UBS-C-1770534-19-00/F, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 2024. gada 25. oktobrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai arī nosūtīja "exeol air cid 01" BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(6) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi vienādajam atsevišķajam biocīdam "exeol air cid 01" piešķirt Savienības atļauju.

(7) Atļaujas derīguma termiņš būtu jāsaskaņo ar saistīto atsauces biocīdu saimes "Oxy'Pharm H_2O_2" atļaujas derīguma termiņu.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo uzņēmumam *SODEL* piešķir Savienības atļauju (atļaujas numurs EU-0033504-0000) piedāvāt tirgū un lietot vienādo atsevišķo biocīdu "exeol air cid 01" atbilstoši pielikumā dotajam biocīda raksturojuma kopsavilkumam.

Savienības atļauja ir derīga no 2025. gada 8. jūlija līdz 2033. gada 30. septembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

"exeol air cid 01"

Produkta veids(-i)

PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Atļaujas numurs: EU-0033504-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0033504-0000

1. nodaļa. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	exeol air cid 01

1.2. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*SODEL*
	Adrese	*190 rue René Barthélémy 14100 Lisieux, France*
Atļaujas numurs	EU-0033504-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0033504-0000	
Licences piešķiršanas datums	2025. gada 8. jūlijs	
Licences derīguma termiņš	2033. gada 30. septembris	

1.3. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*OXY'PHARM*
Ražotāja adrese	*829 rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne,* Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*OXY'PHARM site 1* *829 rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne,* Francija

1.4. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Evonik Resource Efficiency GmbH*
Ražotāja adrese	*Rellinghauser Straße 1–11, 45128 Essen*, Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	*Evonik Resource Efficiency GmbH site 1* *Evonik Industries AG/BL Active Oxygens, Untere Kanalstraße 3, 79618 Rheinfelden*, Vācija

2. nodaļa. **PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7,9 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. **BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet acu aizsargus. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.

4. nodaļa. **ATĻAUTAIS (-IE) LIETOŠANAS VEIDI**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

3.1. lietojums: Cietu virsmu dezinfekcija miglojot ar 7,9 % ūdeņraža peroksīdu (FHP)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: –

	Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: –
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Telpu dezinfekcija, miglojot ar ūdeņraža peroksīdu (FHP), telpām ar 4–150 m^3 tilpumu. Tas ietver iekārtu un materiālu (izņemot medicīniskās ierīces) cieto neporaino virsmu dezinfekciju, kas atrodas apstrādātajā telpā: — slimnīcas/klīnikas, — pētniecības un analīžu laboratorijas (tostarp P3 laboratorijas un tīrtelpas), — veselības aprūpes transports, — farmācijas nozare, — rūpnieciskās veļas mazgātavas, — zobārstniecības un implantoloģijas centri, — viesnīcas, — skolas, — bērnudārzi.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Miglošana Sīks apraksts: Šis produkts ir lietošanai gatavs produkts, kas tiek ievietots ierīcē. Ierīce automātiski veic miglošanu ar biocīdu slēgtā dezinficējamā telpā, kurā nav neviena lietotāja vai klātesošā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: — Baktericīda, pretraugu, fungicīda, sporicīda un virucīda aktivitāte: 5 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks. — Mikobaktericīda aktivitāte (log samazināšanās: ≥ 4): 7 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks. Pilienu izmērs: 1–15 μm - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Dezinficēt telpas un aprīkojumu pēc nepieciešamības saskaņā ar spēkā esošu higiēnas protokolu.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	1) HDPE, balta (necaurspīdīga) 1 litra pudele ar skrūvējamo vāciņu gāzu izvadīšanai. 2) HDPE, pelēka (necaurspīdīga) 2 litru vienreizlietojamā pudele. 3) HDPE, balta (necaurspīdīga) 5 litru kanna (iepakojums ar porcijām). 4) HDPE, balta (necaurspīdīga) 20 litru kanna.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Virsmas pirms dezinficēšanas ir jānotīra. Produkts ir lietošanai gatavs produkts un jāizmanto neatšķaidītā veidā. Produkts ir paredzēts tādām iekārtām kā *Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair*. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietojiet saskaņā ar sekojošiem protokoliem:

— Baktericīda, pretraugu, fungicīda, sporicīda un virucīda aktivitāte: 5 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks.

— Mikobaktericīda aktivitāte (log samazināšanās: ≥ 4): 7 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks.

Pilienu izmērs: 1–15 μm

Relatīvais mitrums: 25 %–75 %

Temperatūra: istabas temperatūra

Ievērot ieteicamo saskares laiku. Saskares laika atskaite sākas, kad telpā ir uzklāts nepieciešamais produkta daudzums.

Lietotājs vienmēr veic dezinfekcijas mikrobioloģisko validāciju dezinficējamajās telpās (vai piemērotā "standarta telpā", ja tāds ir) ar izmantojamajām ierīcēm, pēc kuras var sastādīt šo telpu dezinfekcijas protokolu un to pēc tam izmantot.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Pirmā palīdzība

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Iespējama tieša vai netieša ietekme:

— Izraisa nopietnu acu kairinājumu

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

3.3. lietojums: Cietu virsmu dezinfekcija miglojot ar ūdeņraža peroksīdu (FHP)

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: bakteriofāgi Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: – Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: –
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Telpu dezinfekcija ar FHP cietu neporainu iekārtu virsmu un materiālu, kas atrodas apstrādātajā telpā ar platību 4–150 m^3, dezinfekcija: — pārtikas rūpniecība, — centralizētas virtuves, — restorāni.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Miglošana Sīks apraksts: Šis produkts ir lietošanai gatavs produkts, kas tiek ievietots ierīcē. Ierīce automātiski veic miglošanu ar biocīdu slēgtā dezinficējamā telpā, kurā nav neviena lietotāja vai klātesošā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: — Baktericīda, pretbakteriofāgu, pretraugu, fungicīda, sporicīda un virucīda aktivitāte: 5 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks. — Mikobaktericīda aktivitāte: 7 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks. Pilienu izmērs: 1–15 μm - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Dezinficēt telpas un aprīkojumu pēc nepieciešamības saskaņā ar spēkā esošu higiēnas protokolu.

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	1) HDPE, balta (necaurspīdīga) 1 litra pudele ar skrūvējamo vāciņu gāzu izvadīšanai. 2) HDPE, pelēka (necaurspīdīga) 2 litru vienreizlietojamā pudele. 3) HDPE, balta (necaurspīdīga) 5 litru kanna (iepakojums ar porcijām). 4) HDPE, balta (necaurspīdīga) 20 litru kanna.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Virsmas pirms dezinficēšanas ir jānotīra. Produkts ir lietošanai gatavs produkts un jāizmanto neatšķaidītā veidā. Produkts ir paredzēts tādām iekārtām kā *Nocospray*/*Bio-sanitizer*/*Sanofog*/*Nocomax*/*Nocomax Easy*/*Glosair*. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietojiet saskaņā ar sekojošiem protokoliem:

— Baktericīda, pretbakteriofāgu, pretraugu, fungicīda, sporicīda un virucīda aktivitāte: 5 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks.

— Mikobaktericīda aktivitāte: 7 ml produkta/m^3 un 2 stundu saskares laiks.

Pilienu izmērs: 1–15 μm

Relatīvais mitrums: 25 %–75 %

Temperatūra: istabas temperatūra

Ievērot ieteicamo saskares laiku. Saskares laika atskaite sākas, kad telpā ir uzklāts nepieciešamais produkta daudzums.

Lietotājs vienmēr veic dezinfekcijas mikrobioloģisko validāciju dezinficējamajās telpās (vai piemērotā "standarta telpā", ja tāds ir) ar izmantojamajām ierīcēm, pēc kuras var sastādīt šo telpu dezinfekcijas protokolu un to pēc tam izmantot.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Pirmā palīdzība

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Iespējama tieša vai netieša ietekme:

— Izraisa nopietnu acu kairinājumu

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. nodaļa. **VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU** ([1])

5.1. **Lietošanas pamācība**

—

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Difūzijas laikā turēt telpu slēgtu un neienākt tajā. Apstrādi nedrīkst veikt cilvēku vai dzīvnieku klātbūtnē.

Pirms difūzijas jāveic visu telpā esošo atveru (piem., logu rāmju), pa kurām var noplūst migla, noslēgšana.

Nodrošināt, ka piekļuve ar miglu apstrādātajai zonai ir liegta, izmantojot brīdinājuma zīmi.

Apstrādātajā zonā nedrīkst ienākt, kamēr ūdeņraža peroksīda koncentrācija nav kļuvusi ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) vai zemāka atbilstoši nacionālajai atsauces vērtībai.

Profesionālais lietotājs drīkst ienākt telpā tikai ārkārtas situācijās, kad ūdeņraža peroksīda līmenis ir kļuvis zemāks par 36 ppm (50 mg/m^3), obligāti lietojot tālāk norādītos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL): Elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 14387 vai līdzvērtīgam, ar aizsardzības faktoru (APF) 40 (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda elpceļu aizsardzības līdzekļa tips) un piemērotus aizsardzības līdzekļus (aizsargcimdi, kas atbilst Eiropas standartam EN 374 vai līdzvērtīgam, acu aizsargi, kas atbilst Eiropas standartam EN ISO 16321 vai līdzvērtīgam, kombinezons). Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu un aizsargkombinezona materiāls. EN standarta pilno nosaukumu skatiet 6. sadaļā.

Lai nodrošinātu, ka ūdeņraža peroksīda koncentrācija ir samazinājusies zem 0,9 ppm vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības, jāizmanto mērierīce. Neaizsargātas personas/dzīvnieki drīkst atkārtoti iekļūt apstrādātajā telpā tikai pēc tam, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā samazinās zem 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Jāvalkā pret ķīmiskajām vielām izturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standartam EN ISO 16321 vai līdzvērtīgam, lai aizsargātu acis, sajaucot un ievietojot produktu iepakojumā, kas tiek tieši izmantots miglošanas ierīcē (piemēram, *Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax* vai *Nocomax Easy*).

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

-

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Apstrādes beigās atbrīvojieties no neizlietotā produkta un iepakojuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Izlietoto produktu var izskalot pašvaldības kanalizācijā vai izmest kūtsmēslu novietnē atkarībā no vietējiem noteikumiem. Izvairieties no nokļūšanas individuālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

— Uzglabāšanas laiks: 2 gadi.

([1]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Pilns ES standartu nosaukumu saraksts, kas minēts 5.2. apakšiedaļā:

EN ISO 16321 – Profesionāla acu un sejas aizsardzība

EN 374 – Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskajām vielām un mikroorganismiem

EN 14387 – Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi. Gāzes filtri un kombinētie filtri. Prasības, testēšana, marķēšana