2025/2249

11.11.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/2249

ze dne 10. listopadu 2025,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o sestavení seznamu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů a opatření týkající se těchto organismů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES [1], a zejména na čl. 37 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 [2] zavádí seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“). Stanoví rovněž ochranná opatření s cílem zamezit výskytu uvedených škodlivých organismů na určitých rostlinách k pěstování.

(2) Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 stanoví seznam RNŠO a určitých rostlin k pěstování. Příloha V uvedeného prováděcího nařízení stanoví opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování.

(3) Aby se zohlednila nejnovější aktualizovaná verze mezinárodní nomenklatury stanovené databázemi „List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature“ [3] a Index Fungorum [4], názvy škodlivých organismů *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.*, *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.*, *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*, *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* a *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* by měly být v přílohách IV a V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 nahrazeny názvy *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [5], *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [6], *Diaporthe sojae* Lehman [7], *Fusarium fujikuroi* Nirenberg [8], *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [9], *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al* [10]., *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al* [11]., *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al* [12]. a *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al* [13].

---

[1] Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

[2] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

[3] Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. and Göker, M. (2020). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 5607–5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.

[4] https://www.indexfungorum.org/.

[5] EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

[6] EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

[7] https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

[8] https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

[9] EPPO (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

[10] EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

[11] EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

[12] EPPO (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

[13] EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. Datové listy EPPO o škodlivých organismech doporučených k regulaci. https://gd.eppo.int.

(4) V souladu s čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/3115 ([14]) má být v rostlinolékařském osvědčení v oddíle s názvem „Dodatkové prohlášení“ ode dne 6. července 2026 specifikován konkrétní požadavek, který je splněn, kdykoliv příslušný prováděcí akt, přijatý podle čl. 28 odst. 1 a 2, čl. 30 odst. 1 a 3, čl. 37 odst. 4, čl. 41 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3, umožňuje u těchto požadavků několik možností. Tato specifikace má zahrnovat plné znění příslušného požadavku. V případě RNŠO musí specifikace zahrnovat rovněž kategorii dotčených rostlin k pěstování. Uvedená ustanovení se použijí, aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

(5) S ohledem na změnu čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 by některé části přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 měly být upraveny tak, aby třetí země mohly v rostlinolékařském osvědčení uvést příslušné použité opatření a aby členské státy mohly provádět odpovídající dovozní kontroly jednodušším a účinnějším způsobem.

(6) Zejména v částech A, B, G a I přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 jsou opatření týkající se RNŠO a odpovídajících rostlin uvedena ve formě textu. Je proto nezbytné je přesunout do tabulek, aby byly jednotlivé možnosti lépe viditelné. Ze stejného důvodu by v částech C, D, E, F, H, J a K uvedené přílohy měl být každý řádek stávajících tabulek očíslován.

(7) Kromě toho by v tabulkách ve všech částech přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 měly být škodlivé organismy a jejich příslušná taxonomická skupina uvedeny v abecedním pořadí. To je nezbytné proto, aby byly tyto seznamy srozumitelnější a snadněji použitelné pro příslušný orgán, profesionální provozovatele a jiné uživatele.

(8) Vzhledem k tomu, že kódy Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO) pro všechny RNŠO jsou uvedeny v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, není již nutné je uvádět v příloze V uvedeného nařízení. Měly by být proto z uvedené přílohy odstraněny.

(9) Kromě toho by v zájmu přesnosti měly vědecké názvy škodlivých organismů vždy zahrnovat příslušného autora. Odkaz na autora by proto měl být zahrnut do vědeckého názvu škodlivých organismů ve všech částech přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud chybí.

(10) V zájmu vyjasnění oblasti působnosti opatření by měl být upřesněn druh materiálu, na který se vztahují, spolu s příslušnými druhy rostlin. Kromě toho by do třetího sloupce každé tabulky v příloze V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 měla být doplněna slova „úřední potvrzení“, aby byl zajištěn soulad s přílohami VII a VIII uvedeného nařízení.

(11) V příloze V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, jsou-li stanovena opatření pouze pro přemísťování rostlin k pěstování v rámci území Unie, je vhodné stanovit stejná opatření pro dovoz uvedených rostlin do Unie ze třetích zemí, aby se uplatnil nediskriminační přístup. Tak je tomu v případě opatření týkajících se organismů *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), Impatiens necrotic spot tospovirus a Tomato spotted wilt tospovirus v části C, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow and *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v části D, *Fusarium* Link (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. a Tomato spotted wilt tospovirus v části H.

([14]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/3115 ze dne 27. listopadu 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o víceleté programy průzkumů, hlášení týkající se výskytu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů, dočasné výjimky ze zákazů dovozu a zvláštních požadavků na dovoz a zavedení postupů pro jejich udělování, dočasné dovozní požadavky na vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, zavedení postupů pro zařazení vysoce rizikových rostlin na seznam, obsah rostlinolékařských osvědčení a používání rostlinolékařských pasů a pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv pro vymezená území a průzkumy za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů, a kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o některá hlášení nesouladu (Úř. věst. L, 2024/3115, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) V příloze V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 v případě organismů *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v části A, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, Chrysanthemum stunt viroid a Potato spindle tuber viroid v části C, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v části E, *Verticillium dahliae* Kleb., *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v části H a *Verticillium dahliae* Kleb. a *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao v části J je vhodné při splnění požadovaných opatření umožnit přemísťování v rámci území Unie a dovoz do Unie u příslušných rostlin, které pocházejí z oblastí uznaných příslušným orgánem za prosté uvedených škodlivých organismů, jelikož uvedené škodlivé organismy nejsou v jiných částech světa příliš rozšířeny.

(13) V části G přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, a zejména v případě organismů *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman a *Fusarium* Link (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, jedno z opatření vyžaduje, aby bylo provedeno ošetření osiva schválené proti konkrétním škodlivým organismům. Z důvodů právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že toto schválení uděluje příslušný orgán.

(14) Přílohy IV a V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(15) Z důvodu jednotnosti by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako čl. 1 bod 14 nařízení (EU) 2024/3115, který vyžaduje, aby bylo v rostlinolékařských osvědčeních uvedeno plné znění příslušné možnosti pro dotčenou kategorii rostlin k pěstování, pokud jde o regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii.

(16) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

Přílohy IV a V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 6. července 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Přílohy IV a V prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění takto:

(1) příloha IV se mění takto:

a) v ČÁSTI A v prvním sloupci tabulky se odkaz na „*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]“ nahrazuje odkazem na „*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]“;

b) v ČÁSTI B v prvním sloupci tabulky se odkaz na „*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]“ nahrazuje odkazem na „*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]“;

c) v části D se první sloupec tabulky mění takto:

i) odkaz na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) odkaz na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) odkaz na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

d) v části F se první sloupec tabulky mění takto:

i) odkaz na „*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“ se nahrazuje odkazem na „*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“;

ii) odkaz na „*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]“;

iii) odkaz na „*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]“;

iv) odkaz na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

v) odkaz na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

vi) odkaz na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

e) v části H v tabulce se odkaz na „*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]“ se nahrazuje odkazem na „*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]“;

f) v části I:

i) odkaz na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) odkaz na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) odkaz na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ se nahrazuje odkazem na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

(2) příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování

Obsah

Část A: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu pícnin

Oddíl 1. Přehlídka porostu

Oddíl 2. Odběr vzorků a testování osiva pícnin

Oddíl 3. Další opatření pro některé druhy rostlin

Část B: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu obilovin

Oddíl 1. Přehlídka porostu

Oddíl 2. Odběr vzorků osiva obilovin

Oddíl 3. Další opatření pro osivo *Oryza sativa* L.

Část C: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

Část D: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Část E: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

Část F: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Část G: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a přadných rostlin

Oddíl 1. Přehlídka porostu

Oddíl 2. Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

Oddíl 3. Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Část H: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Oddíl 1. Prohlídka

Oddíl 2. Další opatření pro některé druhy rostlin

Část I: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu *Solanum tuberosum* L.

Část J: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování *Humulus lupulus*, kromě osiva

Část K: Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlinách určených k produkci ovoce *Actinidia* Lindl., kromě osiva

ČÁST A

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu pícnin

Oddíl 1. Přehlídka porostu

(1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využije k produkci osiva pícnin, s ohledem na výskyt RNŠO v porostu s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Prahové hodnoty pro výskyt RNŠO na plodině produkující osivo při přehlídkách porostu

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

(2) Přehlídky porostu uvedené v bodě 1 se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují přiměřenou prohlídku. Provádí se nejméně jedna přehlídka porostu ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

(3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k přehlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

(4) Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud bylo v příslušných zemích podrobeno opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 2. Odběr vzorků a testování osiva pícnin

(1) Příslušný orgán:

a) úředně odebere vzorky osiva z partií osiva pícnin;

b) pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c) porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);

d) dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

(2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo pícnin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

(3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka uvedená v příloze III směrnice 66/401/EHS.

(4) Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud bylo v příslušných zemích podrobeno opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 3. Další opatření pro některé druhy rostlin

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušného orgánu provedou doplňkové prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 2 týkajících se příslušných RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují.

Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 2 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 2

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování a případně kategorie	Opatření
Bakterie			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Osivo: *Medicago sativa* L. osivo předstupňů, základní a certifikované osivo	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v posledních třech letech před výsevem pěstován druh *Medicago sativa* L., při přehlídkách porostu na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* nebo nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* na žádném sousedním předchozím porostu *Medicago sativa* L. nebo c) porost náleží k odrůdě považované za vysoce odolnou vůči organismu *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* a obsah neškodných nečistot nepřekročí 0,1 % hmotnosti.
Hlístice			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Osivo: *Medicago sativa* L. osivo předstupňů, základní a certifikované osivo	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování a případně kategorie	Opatření
			b) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev, ve dvou předcházejících letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány žádné hlavní hostitelské porosty a byla přijata vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření na stanovišti produkce nebo c) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a výskyt organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebo d) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření proti organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

ČÁST B

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu obilovin

Oddíl 1. Přehlídka porostu

(1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva obilovin, s cílem potvrdit, že výskyt RNŠO nepřekračuje prahové hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Prahové hodnoty pro výskyt RNŠO na plodinách produkujících osivo při přehlídkách porostu

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
Houby a řasovky					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m^2 zjištěné při přehlídkách na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.	Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m^2 zjištěné při přehlídkách na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.	**Certifikované osivo první generace (C1):** Nejvýše čtyři rostliny s příznaky napadení na 200 m^2 zjištěné při přehlídkách na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
					Certifikované osivo druhé generace (C2): Nejvýše osm rostlin s příznaky napadení na 200 m^2 zjištěných při přehlídkách na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.
Hlístice					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

(2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují přiměřenou přehlídku porostu.

Provádí se nejméně jedna přehlídka porostu ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

(3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k přehlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který se úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

(4) Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud bylo v příslušných zemích podrobeno opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 2. Odběr vzorků osiva obilovin

(1) Příslušný orgán:

a) úředně odebere vzorky osiva z partií osiva obilovin;

b) pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c) porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod jeho úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);

d) dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

(2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem odebírá vzorky a testuje osivo obilovin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

(3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem příslušného orgánu.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka uvedená v příloze III směrnice 66/402/EHS.

(4) Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud bylo v příslušných zemích podrobeno opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 3. Další opatření pro osivo *Oryza sativa* L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede doplňkové prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 2 týkajících se příslušných RNŠO pro osivo *Oryza sativa* L.

Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 2 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 2

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Hlístice			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Osivo: *Oryza sativa* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Aphelenchoides besseyi* Christie v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) osivo bylo úředně testováno vhodnými testy na reprezentativním vzorku z každé partie a bylo shledáno prostým organismu *Aphelenchoides besseyi* Christie nebo c) osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření horkou vodou či jinému vhodnému ošetření proti organismu *Aphelenchoides besseyi* Christie.

ČÁST C

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Rostliny k pěstování pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Bakterie			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* během posledního vegetačního období prohlédnuto, a rostliny vykazující příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu a veškeré okolní rostliny byly neprodleně vytrhány a zlikvidovány.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Actinidia* Lindl.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) je splněn jeden z těchto požadavků: i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nebo ii) jsou splněny tyto požadavky: — na stanovišti produkce byly pozorovány příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nejvýše u 1 % rostlin a tyto rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a — z reprezentativní části zbývajících rostlin bez příznaků napadení byly odebrány vzorky a tyto rostliny byly otestovány na výskyt organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu a

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			— rostliny byly podrobeny náhodnému odběru vzorků a testování na výskyt organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto před uvedením na trh a byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední ukončené vegetační období po prohlídce shledáno prostým organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo c) při prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie vykazovala příznaky napadení nejvýše 2 % rostlin v partii a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Citrus* L., hybridy *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybridy *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybridy *Poncirus* Raf.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly prohlédnuty v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Spiroplasma citri* Saglio a shledány prostými uvedeného škodlivého organismu, a b) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Spiroplasma citri* Saglio v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo c) stanoviště produkce bylo v posledním vegetačním období při prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Spiroplasma citri* Saglio shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu nebo d) příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin prohlédnutých během posledního vegetačního období ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Spiroplasma citri* Saglio a veškeré rostliny s příznaky napadení byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Prunus* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední ukončené vegetační období po prohlídce shledáno prostým organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokázalo-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, nebo c) příznaky výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* vykazují nejvýše 2 % rostlin v partii při prohlídkách během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a dané rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení na stanovišti produkce a v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokáže-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, nebo d) v případě stálezelených druhů byly rostliny před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vypěstovány z osiva, které: i) pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo ii) bylo vyprodukováno z rostlin, na kterých nebyly při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo iii) bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
		Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vypěstovány z osiva, které: i) pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			ii) bylo vyprodukováno z rostlin, na kterých nebyly při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo iii) bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
		Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vypěstovány z osiva, které: i) pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo ii) bylo vyprodukováno z rostlin, na kterých nebyly při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			iii) bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
		Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vypěstovány z osiva, které: i) pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas vesicatoria* (*ex* Doidge) Vauterin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo ii) bylo vyprodukováno z rostlin, na kterých nebyly při prohlídkách provedených během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas vesicatoria* (*ex* Doidge) Vauterin *et al.* zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo iii) bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas vesicatoria* (*ex* Doidge) Vauterin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Houby a řasovky			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Castanea* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny příznaky výskytu organismu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. nebo c) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. byly vytrhány, zbývající rostliny se pravidelně každý týden prohlížejí a na stanovišti produkce nejsou v průběhu alespoň tří týdnů před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie pozorovány žádné příznaky.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Pinus* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismů *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky způsobované organismy *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow nebo c) bylo provedeno vhodné ošetření proti organismům *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow a rostliny byly před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie prohlédnuty a shledány prostými příznaků uvedených škodlivých organismů.
12.	*Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na hostitelských rostlinách nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. kromě *R. simsii* L., *Viburnum* L.	c) jsou splněny tyto požadavky: i) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na stanovišti produkce a všechny rostliny v okruhu 2 m od materiálu s příznaky napadení byly vytrhány a zlikvidovány, včetně ulpělé zeminy, a ii) pro všechny hostitelské rostliny v okruhu 10 m od rostlin s příznaky napadení a pro všechny zbývající rostliny z napadené partie platí, že: — během tří měsíců od zjištění rostlin s příznaky napadení nebyly na uvedených rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodnou dobu pro zjištění organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld žádné příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu a během tohoto tříměsíčního období nebylo provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a — po tomto tříměsíčním období: — na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na uvedených rostlinách nebo — reprezentativní vzorek uvedených rostlin určených k vývozu do Unie nebo k přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a iii) u všech ostatních rostlin na místě produkce: — na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na uvedených rostlinách nebo — reprezentativní vzorek uvedených rostlin určených k vývozu do Unie nebo k přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Osivo: *Helianthus annuus* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění uvedeného škodlivého organismu během vegetačního období nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			c) jsou splněny tyto požadavky: i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění uvedeného škodlivého organismu během vegetačního období a ii) příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni vykázalo během těchto prohlídek nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nebo d) jsou splněny tyto požadavky: i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni během vegetačního období a ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni a iv) reprezentativní vzorek z každé partie byl otestován a shledán prostým uvedeného škodlivého organismu; nebo e) osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Citrus* L., hybridy *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybridy *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybridy *Poncirus* Raf.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly v průběhu posledního ukončeného vegetačního období pěstovány na stanovišti produkce, jež bylo při nejméně dvou prohlídkách ve vhodných termínech během daného vegetačního období shledáno prostým organismu *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			c) příznaky vykázala nejvýše 2 % rostlin v partii při nejméně dvou prohlídkách během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a příslušné rostliny s příznaky napadení a veškeré ostatní rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Chrysanthemum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly za poslední tři měsíce prohlíženy nejméně jednou měsíčně a na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Puccinia horiana* Hennings nebo b) matečné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Puccinia horiana* Hennings byly odstraněny a zlikvidovány spolu s rostlinami v okruhu 1 m a rostliny, které byly před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie prohlédnuty a shledány prostými příznaků uvedeného škodlivého organismu, byly vhodným způsobem fyzikálně nebo chemicky ošetřeny.

Hmyz a roztoči

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Fuchsia* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Aculops fuchsiae* Keifer v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách na stanovišti produkce během předchozího vegetačního období v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Aculops fuchsiae* Keifer nebyly na rostlinách ani na matečných rostlinách, ze kterých byly získány, pozorovány příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu nebo c) před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie bylo provedeno vhodné chemické či fyzikální ošetření, po němž byly rostliny prohlédnuty a nebyly nalezeny příznaky výskytu organismu *Aculops fuchsiae* Keifer.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Opogona sacchari* Bojer v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, na kterém nebyly při prohlídkách prováděných nejméně každé tři měsíce v období alespoň šest měsíců před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie pozorovány příznaky ani známky výskytu organismu *Opogona sacchari* Bojer, nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) na stanovišti produkce se uplatňuje režim, jehož cílem je monitorování a potlačování populace organismu *Opogona sacchari* Bojer a odstraňování napadených rostlin, každá partie byla před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie prohlédnuta v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu a byla shledána prostou příznaků výskytu organismu *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Rostliny k pěstování, kromě osiva, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do těchto rodů a druhů: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly: i) pěstovány po dobu dvou let před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie na stanovišti: — s fyzickou izolací proti zavlečení organismu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nebo — kde byla v souvislosti s organismem *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) použita vhodná preventivní ošetření, a ii) podrobeny prohlídkám prováděným alespoň jednou za čtyři měsíce, které potvrdí, že je uvedený materiál prostý organismu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis*Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Hlístice			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rostliny k pěstování: *Allium* sp. L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly prohlédnuty a od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly v partii pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nebo c) cibule byly na základě prohlídek prováděných v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev shledány prostými příznaků výskytu uvedeného škodlivého organismu a byly zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly prohlédnuty a od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly v partii pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nebo c) cibule byly na základě prohlídek prováděných v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev shledány prostými příznaků výskytu uvedeného škodlivého organismu a byly zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.
Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy			
21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Malus* Mill.	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo c) příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider vykázala nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce při prohlídkách ve vhodných termínech během posledního vegetačního období a příslušné rostliny s příznaky napadení a veškeré ostatní rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Prunus* L.	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo c) příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider vykázalo nejvýše 1 % rostlin na stanovišti produkce při prohlídkách ve vhodných termínech během posledního vegetačního období a příslušné rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Pyrus* L.	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo c) rostliny na stanovišti produkce a veškeré rostliny v bezprostředním okolí, které během prohlídek ve vhodných termínech během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Lavandula* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly pěstovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, o němž je známo, že je prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, nebo c) při prohlídkách partie během posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* nebo d) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* byly vytrhány a zlikvidovány a partie byla otestována na základě reprezentativního vzorku zbývajících rostlin a byla shledána prostou uvedeného škodlivého organismu.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Chrysanthemum stunt viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny se získávají do tří generací od rozmnožení z podnože, která byla při testech shledána prostou organismu Chrysanthemum stunt viroid.
26.	Citrus exocortis viroid	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Citrus* L.	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými organismu Citrus exocortis viroid, a a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Citrus exocortis viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo během posledního ukončeného vegetačního období při prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus exocortis viroid shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
27.	Citrus tristeza virus (izoláty z EU)	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Citrus* L., hybridy *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybridy *Fortunella* Swingle,	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly v předchozích třech letech otestovány a shledány prostými organismu Citrus tristeza virus (izoláty z EU), a a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Citrus tristeza virus (izoláty z EU) v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
		Poncirus Raf., hybridy *Poncirus* Raf.	b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném na základě testování reprezentativního vzorku rostlin provedeného během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodném termínu pro zjištění organismu Citrus tristeza virus (izoláty z EU) prostým uvedeného škodlivého organismu nebo c) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce fyzicky chráněném proti přenašečům a shledaném na základě testování namátkově zvolených rostlin provedeného během posledního ukončeného vegetačního období v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus tristeza virus (izoláty z EU) prostým uvedeného škodlivého organismu nebo d) v případech, kdy měl test pozitivní výsledek na výskyt organismu Citrus tristeza virus (izoláty z EU) v partii, byly všechny rostliny otestovány jednotlivě, pozitivní výsledek vykázala nejvýše 2 % z daných rostlin a testované rostliny, u nichž bylo zjištěno napadení uvedeným škodlivým organismem, byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, hybridy *Impatiens* L. New Guinea	Úřední potvrzení, že rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobeno monitorování relevantních přenašečů třásněnky (*Frankliniella occidentalis* Pergande), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a a) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Impatiens necrotic spot tospovirus nebo b) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky výskytu organismu Impatiens necrotic spot tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k vývozu do Unie nebo přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.
29.	Potato spindle tuber viroid	Rostliny k pěstování: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Potato spindle tuber viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo c) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
30.	Plum pox virus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus	Úřední potvrzení, že vegetativně množené podnože *Prunus* pocházejí z matečných rostlin, z nichž byly za předchozích pět let odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus, a a) rozmnožovací materiál byl vyprodukován v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Plum pox virus v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na rozmnožovacím materiálu na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období v nejvhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány žádné příznaky organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo c) na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období v nejvhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky, podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány příznaky organismu Plum pox virus nejvýše u 1 % rostlin, veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu. V případě písmene c) se mohou z reprezentativní části rostlin nevykazujících při prohlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus odebrat vzorky a otestovat na základě posouzení rizika napadení daných rostlin s ohledem na výskyt uvedeného škodlivého organismu.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., hybridy *Impatiens* L. New Guinea, *Pelargonium* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobeno monitorování relevantních přenašečů třásněnky (*Frankliniella occidentalis* (Pergande) a *Thrips tabaci* Lindeman), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a a) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus nebo b) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k vývozu do Unie nebo přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.

ČÁST D

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede u určitých druhů rostlin prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Rostliny k pěstování, kromě osiva, pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Houby a řasovky			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Castanea sativa* Mill.	Úřední potvrzení, že: a) reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			c) reprodukční materiál lesních dřevin vykazující příznaky výskytu organismu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. byl vytrhán, zbývající materiál se pravidelně každý týden prohlíží a na stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před vývozem daného materiálu do Unie nebo jeho přemístěním v rámci Unie pozorovány žádné příznaky uvedeného škodlivého organismu.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Pinus* L.	Úřední potvrzení, že: a) reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismů *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky způsobované organismy *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow nebo c) na stanovišti produkce bylo provedeno vhodné ošetření proti organismům *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow a reprodukční materiál lesních dřevin byl před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie vizuálně prohlédnut a shledán prostým příznaků způsobovaných uvedenými škodlivými organismy.
3.	*Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Rostliny k pěstování, kromě pylu a osiva: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix × eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Úřední potvrzení, že: a) reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na reprodukčním materiálu lesních dřevin c) jsou splněny tyto požadavky: i) reprodukční materiál lesních dřevin vykazující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na stanovišti produkce a veškerý reprodukční materiál lesních dřevin s ulpělou zeminou v okruhu 2 m od materiálu s příznaky napadení byl vytrhán a zlikvidován, včetně ulpělé zeminy a nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			ii) pro veškerý reprodukční materiál lesních dřevin v okruhu 10 m od rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající reprodukční materiál lesních dřevin z napadené partie platí, že: — během tří měsíců od zjištění reprodukčního materiálu lesních dřevin s příznaky napadení nebyly na uvedeném reprodukčním materiálu lesních dřevin pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodnou dobu pro zjištění organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld žádné příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu a během tohoto tříměsíčního období nebylo provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) a — po tomto tříměsíčním období: — na stanovišti produkce nebyly na tomto reprodukčním materiálu lesních dřevin pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld — reprezentativní vzorek tohoto reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k vývozu do Unie nebo k přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a nebo iii) pro veškerý ostatní reprodukční materiál lesních dřevin na místě produkce platí, že: — na stanovišti produkce nebyly na tomto reprodukčním materiálu lesních dřevin pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld nebo — reprezentativní vzorek tohoto reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k vývozu do Unie nebo k přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ČÁST E

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Bakterie			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Osivo: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Osivo: *Phaseolus vulgaris* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a byl shledán prostým organismu *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* nebo c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a byl shledán při těchto testech prostým organismu *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Phaseolus vulgaris* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a byl shledán prostým organismu *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* nebo c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a byl shledán při těchto testech prostým organismu *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu *Xanthomonas euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí či obdobnou metodou a a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované uvedeným škodlivým organismem nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Osivo: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí či obdobnou metodou a a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Osivo: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí či obdobnou metodou a a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Osivo: *Capsicum annuum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Osivo: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí či obdobnou metodou a a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) při prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
Hmyz a roztoči			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Osivo: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Acanthoscelides obtectus* (Say) v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření nebo b) reprezentativní vzorek osiva byl podroben prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Acanthoscelides obtectus* (Say), bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Osivo: *Pisum sativum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Bruchus pisorum* (Linnaeus) v souladu s příslušnými mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření nebo b) reprezentativní vzorek osiva byl podroben prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Bruchus pisorum* (Linnaeus), bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Osivo: *Vicia faba* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Bruchus rufimanus* Boheman v souladu s příslušnými mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření nebo b) reprezentativní vzorek osiva byl podroben prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu *Bruchus rufimanus* Boheman, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.
Hlístice			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Osivo: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a nebyly pozorovány příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu nebo c) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nebo d) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy			
16.	Pepino mosaic virus	Osivo: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Pepino mosaic virus v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic virus nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
17.	Potato spindle tuber viroid	Osivo: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Potato spindle tuber viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
18.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Osivo: *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridy	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází ze země, kterou příslušný orgán uznal podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) osivo bylo podrobeno úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálními provozovateli pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu nebo c) v případě partie osiva pocházejícího z 30 nebo méně než 30 matečných rostlin byly osivo nebo matečná rostlina tohoto osiva podrobeny úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálním provozovatelem pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na výskyt ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
19.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Osivo: *Capsicum annuum* L., kromě osiva odrůdy, o níž je známo, že je odolná vůči ToBRFV	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází ze země, kterou příslušný orgán uvedené země uznal podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo b) osivo bylo podrobeno úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálními provozovateli pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu nebo c) v případě partie osiva pocházejícího z 30 nebo méně než 30 matečných rostlin byly osivo nebo matečná rostlina tohoto osiva podrobeny úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálním provozovatelem pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na výskyt ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.

ČÁST F

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Příslušný orgán nebo, pokud je tak vyžadováno, profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování a to, že nebudou překročeny prahové hodnoty uvedené v tabulce 2.

Rostliny k pěstování, kromě osiva, pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování a to, že nebudou překročeny prahové hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování a případně kategorie	Opatření
1.	Blackleg (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že pěstované rostliny byly podrobeny úřední přehlídce porostu ze strany příslušného orgánu.
		Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor předcházející základní sadbě brambor	Úřední potvrzení, že úřední prohlídky prokázaly, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu *Dickeya* spp. Samson *et al.* a *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*
2.	Vločkovitost hlíz bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že jsou v souladu s přílohou IV částí G.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření, s ohledem na možný výskyt přenašečů, nebo b) při úředních prohlídkách pěstovaných rostlin na stanovišti produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* nebo c) příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že jsou v souladu s příslušnými ustanoveními přílohy IV části G.
		Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor předcházející základní sadbě brambor	Úřední potvrzení, že úřední prohlídky prokázaly, že pocházejí z matečných rostlin, které jsou prosté organismu *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že: a) při úředních prohlídkách na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování a případně kategorie	Opatření
			b) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky byly vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz; pro veškeré podnože, u nichž byly u rostoucího porostu pozorovány příznaky, byly pro každou partii po sklizni provedeny testy hlíz, aby se potvrdila nepřítomnost organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*
		Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor předcházející základní sadbě brambor	Úřední potvrzení, že úřední prohlídky prokázaly, že pocházejí z matečných rostlin, které jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že jsou v souladu s přílohou IV částí G.
6.	Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry, a příznaky, které způsobuje Potato leaf roll virus (izoláty z EU)	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že pěstované rostliny byly podrobeny úřední prohlídce a splňují prahové hodnoty stanovené pro každou kategorii v tabulce 2.
		Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor předcházející základní sadbě brambor	Úřední potvrzení, že sadba brambor je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismů Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S (EU isolates), Potato virus X (izoláty z EU), Potato virus Y a Potato leaf roll virus (izoláty z EU), a že je splněno jedno z těchto opatření: a) jsou-li použity metody mikrovegetativního množení, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním matečné rostliny nebo testováním matečné rostliny pod úředním dohledem příslušného orgánu nebo b) jsou-li použity metody klonové selekce, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním klonového materiálu nebo testováním klonového materiálu pod úředním dohledem příslušného orgánu.
7.	Potato spindle tuber viroid	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., klonový materiál	Úřední potvrzení, že úřední testování nebo testování pod úředním dohledem příslušného orgánu prokázalo, že klonový materiál je získán z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Potato spindle tuber viroid.
		Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadba brambor	Úřední potvrzení, že: a) nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid nebo b) u každé partie bylo provedeno úřední testování hlíz po sklizni a uvedené hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid.
		Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., certifikovaná sadba brambor	Úřední potvrzení, že úřední prohlídka prokázala, že certifikovaná sadba brambor je prostá organismu Potato spindle tuber viroid, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování a případně kategorie	Opatření
8.	Prašná strupovitost bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Hlízy k pěstování: Solanum tuberosum L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrdil, že jsou v souladu s přílohou IV částí G.
9.	Příznaky virové infekce	Hlízy k pěstování: *Solanum tuberosum* L., sadba brambor	Úřední potvrzení, že při úředních prohlídkách přímého potomstva nepřekračuje množství rostlin s příznaky napadení procentuální podíl, který uvádí příloha IV část G.

Kromě opatření stanovených v tabulce 1 provede příslušný orgán úřední prohlídky s cílem zajistit, že výskyt RNŠO na pěstovaných rostlinách nepřekročí prahové hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2

Prahové hodnoty pro výskyt RNŠO na rostlinách, z nichž budou vyprodukovány hlízy k pěstování

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor ([1])		Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro základní sadbu brambor	Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro certifikovanou sadbu brambor
			PBTC	PB		
1.	Blackleg (*Dickeya* Samson *et al.* spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry, a příznaky, které způsobuje Potato leaf roll virus (izoláty z EU)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Potato spindle tuber viroid	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

([1]) Jak je stanovena v příloze prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor (Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

ČÁST G

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a přadných rostlin

Oddíl 1. Přehlídka porostu

(1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva olejnin a přadných rostlin, s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Prahové hodnoty pro výskyt RNŠO na rostlinách k pěstování, z nichž se produkuje osivo

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
Houby a řasovky				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

(2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna přehlídka porostu ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

(3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k přehlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

(4) Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud bylo v příslušných zemích podrobeno opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 2. Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

(1) Příslušný orgán:

a) úředně odebere vzorky osiva z partií osiva olejnin a přadných rostlin;

b) pověří odběratele vzorků, aby provedli odběr vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c) porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod jeho úředním dohledem;

d) dohlíží nad prací odběratelů vzorků, jak stanoví písmeno b).

(2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo olejnin a přadných rostlin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

(3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem příslušného orgánu.

(4) Při zkouškách osiva pro certifikaci a obchodního osiva se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka uvedená v příloze III směrnice 2002/57/ES.

(5) Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud bylo v příslušných zemích podrobeno opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 3. Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede doplňkové prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 2 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 2 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 2

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Houby a řasovky			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Osivo: *Linum usitatissimum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Alternaria linicola* Groves & Skolko v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Alternaria linicola* Groves & Skolko nebo c) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Alternaria linicola* Groves & Skolko stanovená v příloze IV.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Osivo: *Linum usitatissimum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley nebo c) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley stanovená v příloze IV.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Osivo: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Botrytis cinerea* de Bary v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) bylo provedeno ošetření schválené proti organismu *Botrytis cinerea* de Bary nebo c) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Botrytis cinerea* de Bary stanovená v příloze IV.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Osivo: *Linum usitatissimum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Colletotrichum lini* Westerdijk v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Colletotrichum lini* Westerdijk nebo c) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Colletotrichum lini* Westerdijk stanovená v příloze IV.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Osivo: *Glycine max* (L.) Merryl	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips nebo c) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips stanovená v příloze IV.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Osivo: *Glycine max* (L.) Merryl	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Diaporthe sojae* Lehman v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Diaporthe sojae* Lehman nebo c) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Diaporthe sojae* Lehman stanovená v příloze IV.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
7.	*Fusarium* Link (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Osivo: *Linum usitatissimum* L.	Úřední potvrzení, že: a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Fusarium* (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell nebo b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena tolerance u osiva pro organismus *Fusarium* Link (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, stanovená v příloze IV.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Osivo: *Helianthus annuus* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo *Helianthus annuus* L. pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období nebo c) jsou splněny tyto požadavky: i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění uvedeného škodlivého organismu během vegetačního období a nebo ii) příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni vykázalo během prohlídky nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nebo d) jsou splněny tyto požadavky: i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni a ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a iii) při konečné prohlídce nebyly nalezeny žádné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni a z každé partie byl otestován reprezentativní vzorek a shledán prostým organismu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			e) osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy			
9.	Tobacco ringspot virus	Osivo: *Glycine max* (L.) Merr.	Úřední potvrzení, že: a) osivo *Glycine max* (L.) Merr. pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Tobacco ringspot virus v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) stanoviště produkce bylo během vegetačního období podrobeno nejméně dvěma prohlídkám ve vhodných termínech pro zjištění příznaků napadení organismem Tobacco ringspot virus a všechny rostliny s příznaky napadení byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a při konečné prohlídce nebyly nalezeny žádné rostliny vykazující příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu.

ČÁST H

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Oddíl 1. Prohlídka

(1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a veškeré další kroky, aby byly zajištěny tyto podmínky:

a) rostliny přinejmenším vypadají, na základě prohlídky, že jsou prakticky prosté škodlivých organismů uvedených v tabulce v tomto bodu, s ohledem na příslušný rod či druh;

b) veškeré rostliny vykazující ve fázi rostoucího porostu viditelné známky či příznaky výskytu škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu byly bezprostředně po jejich objevení vhodně ošetřeny nebo případně odstraněny;

c) v případě cibulí šalotek a česneku jsou rostliny získány přímo z materiálu, který byl ve fázi rostoucího porostu zkontrolován a shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu.

(2) Rostliny k pěstování, kromě osiva, pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud byly v příslušných zemích podrobeny opatřením stanoveným v tomto oddíle.

Oddíl 2. Další opatření pro některé druhy rostlin

Kromě toho příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Rostliny k pěstování, kromě osiva, pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Bakterie			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány z osiva, které splňuje opatření stanovená v části E, a byly udržovány prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány z osiva, které splňuje opatření stanovená v části E, a mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány z osiva, které splňuje opatření stanovená v části E, a mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány z osiva, které splňuje opatření stanovená v části E, a mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány z osiva, které splňuje opatření stanovená v části E, a mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
Houby a řasovky			
6.	*Fusarium* Link (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Asparagus officinalis* L.	Úřední potvrzení, že: a) je splněn jeden z těchto požadavků: i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Fusarium* Link nebo ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Fusarium* Link byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) korunky *Asparagus officinalis* L. byly prohlédnuty před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Fusarium* Link.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Asparagus officinalis* L.	Úřední potvrzení, že: a) je splněn jeden z těchto požadavků: i) porost byl prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk nebo ii) porost byl prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a byly vytrhány rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a b) korunky *Asparagus officinalis* L. byly prohlédnuty před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu *Stromatinia cepivora* Berk. nebo b) jsou splněny tyto požadavky: i) jeden z těchto požadavků: — porost byl prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Stromatinia cepivora* Berk. nebo — porost byl prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Stromatinia cepivora* Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a ii) rostliny byly prohlédnuty před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Stromatinia cepivora* Berk.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Allium sativum* L.	Úřední potvrzení, že: a) je splněn jeden z těchto požadavků: i) porost byl prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Stromatinia cepivora* Berk. nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			ii) porost byl prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Stromatinia cepivora* Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a b) rostliny nebo sadba byly prohlédnuty před vývozem do Unie nebo přemístěním v rámci Unie a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Stromatinia cepivora* Berk.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Cynara cardunculus* L.	Úřední potvrzení, že matečné rostliny jsou získány z materiálu testovaného a shledaného prostým organismu *Verticillium dahliae* Kleb. a a) rostliny byly pěstovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Verticillium dahliae* Kleb. v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) jsou splněny tyto požadavky: i) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu *Verticillium dahliae* Kleb. a ii) rostliny byly prohlédnuty ve vhodných termínech od začátku posledního ukončeného vegetačního období a shledány prostými příznaků výskytu organismu *Verticillium dahliae* Kleb.

Hlístice

11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rostliny k pěstování, jiné než rostliny pro produkci komerčního porostu: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a nebyly pozorovány příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu nebo c) jsou splněny tyto požadavky: i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a příznaky napadení uvedeným škodlivým organismem byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a ii) rostliny, u nichž bylo zjištěno napadení organismem *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, byly okamžitě vytrhány a

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			iii) zbývající rostliny byly prostřednictvím laboratorních testů na reprezentativním vzorku shledány prostými organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nebo d) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu.
		Rostliny k pěstování pro produkci komerčního porostu: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a nebyly pozorovány příznaky výskytu uvedeného škodlivého organismu nebo c) jsou splněny tyto požadavky: i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a iii) zbývající rostliny byly po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledány prostými organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nebo d) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

12.	Leek yellow stripe virus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Allium sativum* L.	Úřední potvrzení, že: a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo b) porost byl prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění uvedeného škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
13.	Onion yellow dwarf virus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Úřední potvrzení, že: a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus nebo b) jsou splněny tyto požadavky: i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění uvedeného škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a ii) rostliny, u nichž bylo zjištěno napadení organismem Onion yellow dwarf virus, byly okamžitě vytrhány a iii) příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.
14.	Potato spindle tuber viroid	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že: a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu.
15.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridy	Úřední potvrzení, že: a) rostliny k pěstování pocházejí ze země, kterou příslušný orgán uvedené země uznal podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo b) rostliny k pěstování jsou získány z osiva, které splňuje požadavky stanovené v části E této přílohy, a byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
16.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., kromě rostlin k pěstování náležejících k odrůdě, o níž je známo, že je odolná vůči ToBRFV	Úřední potvrzení, že: a) rostliny k pěstování pocházejí ze země, kterou příslušný orgán uznal podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo b) rostliny k pěstování jsou získány z osiva, které splňuje požadavky stanovené v části E této přílohy, a byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Úřední potvrzení, že rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (*Frankliniella occidentalis* Pergande a *Thrips tabaci* Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a a) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus nebo b) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k vývozu do Unie nebo přemístění v rámci Unie byl otestován a shledán prostým uvedeného škodlivého organismu.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Solanum lycopersicum* L.	Úřední potvrzení, že: a) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus nebo b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus.

ČÁST I

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu Solanum tuberosum L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se výskytu RNŠO na osivu *Solanum tuberosum* L.

Osivo pocházející ze třetích zemí smí být dovezeno do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Virus			
1.	Potato spindle tuber viroid	Osivo: *Solanum tuberosum* L.	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Potato spindle tuber viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo c) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu.

ČÁST J

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování Humulus lupulus L., kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Rostliny k pěstování, kromě osiva, pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Houby a řasovky			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Humulus lupulus* L.	Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu a shledány prostými organismu *Verticillium dahliae* Kleb., a a) rostliny k pěstování pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Verticillium dahliae* Kleb. v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu *Verticilium dahliae* Kleb., nebo c) jsou splněny tyto požadavky: i) rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů *Humulus lupulus* L. a

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			ii) stanoviště produkce bylo ve vhodných termínech při prohlídce listů během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu *Verticillium dahliae* Kleb. a iii) jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu *Verticillium dahliae* Kleb. a další výsadbou.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Humulus lupulus* L.	Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu a shledány prostými organismu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, a a) rostliny k pěstování pocházejí z oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, nebo c) jsou splněny tyto požadavky: i) rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů *Humulus lupulus* L. a ii) stanoviště produkce bylo ve vhodných termínech při prohlídce listů během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao a iii) jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao a další výsadbou.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

3.	Citrus bark cracking viroid	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Humulus lupulus* L.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu Citrus bark cracking viroid v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			b) jsou splněny tyto požadavky: i) místo produkce bylo během posledních dvou ukončených vegetačních období při prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus bark cracking viroid shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu a s cílem předejít mechanickému přenosu jsou na místě produkce uplatňována vhodná hygienická opatření a ii) rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly shledány prostými příznaků výskytu organismu Citrus bark cracking viroid, a — reprezentativní vzorek matečných rostlin byl během posledních dvanácti měsíců otestován v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus bark cracking viroid a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu a — matečné rostliny byly izolovány od rostlin *Humulus lupulus* L. rostoucích na sousedních místech produkce nacházejících se ve vzdálenosti nejméně 20 m a platí jedna z těchto možností: — v případě matečných rostlin, které byly uchovávány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou před zdroji napadení organismem Citrus bark cracking viroid, byly matečné rostliny každoročně vizuálně prohlíženy, byly z nich odebrány vzorky a byly otestovány v nejvhodnějším termínu pro zjištění výskytu organismu Citrus bark cracking viroid tak, aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu pěti let, nebo — v případě matečných rostlin, které nebyly uchovávány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou před zdroji napadení organismem Citrus bark cracking viroid, byly matečné rostliny v posledních pěti ukončených vegetačních obdobích při prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění organismu Citrus bark cracking viroid shledány prostými tohoto škodlivého organismu a iii) v případě produkce zakořeněných rostlin k pěstování, které mají být přemístěny, bylo stanoviště produkce použité k zakořenění — izolováno od produkčních porostů *Humulus lupulus* L. nacházejících se ve vzdálenosti nejméně 20 m nebo — fyzicky chráněno před zdroji napadení organismem Citrus bark cracking viroid.

ČÁST K

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlinách určených k produkci ovoce Actinidia Lindl., kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede prohlídky a další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, která jsou stanovena ve třetím sloupci tabulky 1.

Rostliny k pěstování, kromě osiva, pocházející ze třetích zemí smí být dovezeny do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu v příslušných zemích provedl prohlídky a jakékoli další kroky, aby bylo zajištěno dodržení opatření uvedených v tabulce 1 týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování.

Tabulka 1

Seznam RNŠO nebo příznaků, které dané RNŠO způsobují, odpovídajících rostlin k pěstování a opatření, která musí být dodržena

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Bakterie			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Rostliny k pěstování, kromě osiva: *Actinidia* Lindl.	Úřední potvrzení, že: a) rozmnožovací materiál a ovocné rostliny byly vyprodukovány v oblasti uznané příslušným orgánem za prostou organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo b) rozmnožovací materiál a ovocné rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly dvakrát ročně vizuálně prohlédnuty a byly shledány prostými organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, a byla splněna jedna z možností podle písmene c) a jedna z možností podle písmene d): c) jeden z těchto požadavků týkajících se matečných rostlin: i) v případě matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních zajišťujících fyzickou ochranu před napadením organismem *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, byly z reprezentativní části matečných rostlin každé čtyři roky odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto tak, aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu osmi let, nebo ii) v případě matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních zajišťujících fyzickou ochranu před napadením organismem *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, byly z reprezentativní části matečných rostlin každý rok odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto tak, aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu tří let, a

	RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
			d) jeden z těchto požadavků týkajících se rozmnožovacího materiálu: i) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních zajišťujících fyzickou ochranu před napadením organismem *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nebyly na tomto rozmnožovacím materiálu a těchto ovocných rostlinách na stanovišti produkce v posledním ukončeném vegetačním období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nebo ii) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních zajišťujících fyzickou ochranu před napadením organismem *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, nebyly na tomto rozmnožovacím materiálu a těchto ovocných rostlinách na stanovišti produkce v posledním ukončeném vegetačním období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a tento rozmnožovací materiál a tyto ovocné rostliny byly podrobeny náhodnému odběru vzorků a testování na výskyt organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto před uvedením na trh a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu nebo iii) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních zajišťujících fyzickou ochranu před napadením organismem *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, byly příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto pozorovány na stanovišti produkce nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a tento rozmnožovací materiál a tyto ovocné rostliny a veškerý rozmnožovací materiál a veškeré ovocné rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, z reprezentativní části zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení byly odebrány vzorky a byly otestovány na výskyt organismu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.“