C/2024/1989

12.3.2024 г.

Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(C/2024/1989)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета ([1]) в срок от три месеца от датата на нейното публикуване.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

‘Bingöl Balı’

ЕС №: PDO-TR-02886 – 5.1.2023 г.

ЗНП (X) ЗГУ ( )

1. **Наименование/наименования**

„Bingöl Balı“

2. **Държава членка или трета държава**

Турция

3. **Описание на селскостопанския продукт или храната**

3.1. *Вид продукт*

Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло и др.)

3.2. *Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1*

„Bingöl Balı“ е многоцветен мед, получен от географския район, определен в раздел 4. Цветът му може да варира от светлокехлибарен до тъмнокехлибарен. Предлага се на пазара като пчелна пита и като извлечен мед. При производството се използват *Apis mellifera* anatoliaca, *A. mellifera* caucasica, *A. mellifera* meda видове пчели и техните хибриди.

Поленовите характеристики на „Bingöl Balı“ са следните:

i) Поленът включва поне един от свързаните таксони: *Astragalus sp.* (сграбиче), *Centaurea sp.* (метличина), *Hypericum sp.* (жълт кантарион), *Trifolium sp.* (детелина) и *Xeranthemum sp.* (безсмъртниче или едногодишни вечни),

ii) Поленът също така е съвместим с поленовия спектър, посочен в таблица 2 (не се изисква наличието на всички включени поленови таксони заедно).

Таблица 1

Физикохимични характеристики на „Bingöl Balı“

Параметър	Стойност
Влажност (% макс.)	18 %
Захароза (g/100g; мин.)	3 g/100 g
Фруктоза+глюкоза (g/100g; мин.)	65 g/100 g
Фруктоза+глюкоза	1,00—1,30
Малтоза (% макс.)	4 %

([1]) OJ L 343, 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Неразтворимо във вода вещество (g/100g; макс.)	0,1 g/100 g
Свободна киселинност (meq/kg; макс.)	40 meq/kg
Електропроводимост (mS/cm; макс.)	0,8 mS/cm
Брой диастази (мин.)	15
Хидроксиметилфурфурол (HMF) (mg/kg;	20 mg/kg.
$\delta^{13}C_{мед}$	- 23 или по-малко
$\delta^{13}C_{протеин} - \delta^{13}C_{мед}$	- 1,0 или повече
$C_{4\ захари}$ (макс.)	7 %
Пролин (mg/kg; мин.)	450

Таблица 2

Физикохимични характеристики на „Bingöl Balı“

	Таксон	Семейство	Съдържание на прашец (първично: ≥ 45 %, вторично: 16—44 %, незначително: 3—15 %, в минимални количества: 3 %
1.	*Acanthus* sp. (страшник)	Страшникови	Незначително, в минимални количества
2.	*Sambucus sp.* (бъз)	Мешковицови	Незначително, в минимални количества
3.	*Allium sp.* (лук)	Кокичеви	Незначително, в минимални количества
4.	*Rhus sp.* (шмак)	Смрадликови	Незначително, в минимални количества
5.	Сенникови	Сенникови	в минимални количества
6.	*Chaerophyllum sp.* (балдаран)	Сенникови	в минимални количества
7.	*Eryngium campestre (полски ветрогон)*	Сенникови	Вторично, незначително, в минимални количества
8.	*Pimpinella* sp. (анасон)	Сенникови	Първично, в минимални количества
9.	*Achillea* sp. (равнец)	Сложноцветни	Незначително, в минимални количества
10.	*Anthemis* sp. (подрумиче)	Сложноцветни	в минимални количества
11.	*Artemisia* sp. (пелин)	Сложноцветни	Вторично, в минимални количества
12.	*Carduus* sp. (магарешки бодил)	Сложноцветни	в минимални количества
13.	*Cichorium* sp. (цикория)	Сложноцветни	Вторично, незначително, в минимални количества
14.	*Cirsium* spp. (паламида)	Сложноцветни	Незначително, в минимални количества
15.	*Cirsium yildizianum*	Сложноцветни	Вторично, в минимални количества
16.	*Crepis* sp. (дрипавка)	Сложноцветни	Вторично, незначително, в минимални количества
17.	*Echinops* sp.	Сложноцветни	Незначително, в минимални количества
18.	*Gundelia* sp.	Сложноцветни	в минимални количества
19.	*Helichrysum* sp. (жълт смил)	Сложноцветни	Първично, вторично, незначително, в минимални количества
20.	*Leontodon* sp. (жълтица)	Сложноцветни	в минимални количества
21.	*Onopordum* sp. (гингер)	Сложноцветни	в минимални количества
22.	*Ptilostemon* sp.	Сложноцветни	в минимални количества
23.	*Senecio* sp. (спореж)	Сложноцветни	в минимални количества

24.	*Taraxacum* sp. (глухарче)	Сложноцветни	Незначително, в минимални количества
25.	Xanthium sp. (рогачица)	Сложноцветни	в минимални количества
26.	*Alkanna* sp. (айважива)	Грапаволистни	в минимални количества
27.	*Anchusa* sp. (винче)	Грапаволистни	в минимални количества
28.	*Cerinthe minor (малък меденик)*	Грапаволистни	в минимални количества
29.	*Echium* sp. (усойниче)	Грапаволистни	Незначително, в минимални количества
30.	*Myosotis* sp. (незабравка)	Грапаволистни	Незначително, в минимални количества
31.	*Onosma* sp. (омразниче)	Грапаволистни	в минимални количества
32.	*Campanula* sp. (камбанка)	Камбанкови	Незначително, в минимални количества
33.	*Campanula* sp. (камбанка)	Камбанкови	Незначително, в минимални количества
34.	*Cephalaria* sp. (звездоглавка)	Бъзови	Незначително, в минимални количества
35.	*Dipsacus* sp. (лугачка)	Бъзови	в минимални количества
36.	*Scabiosa* spp. (самогризка)	Бъзови	в минимални количества
37.	*Valeriana* sp. (дилянка)	Бъзови	в минимални количества
38.	*Dianthus* sp. (карамфил)	Карамфилови	Незначително
39.	*Saponaria* sp.	Карамфилови	в минимални количества
40.	*Silene* sp. (плюскавиче)	Карамфилови	в минимални количества
41.	Карамфилови/ Щирови	Карамфилови Щирови	Вторично, незначително, в минимални количества
42.	*Chenopodium* sp. (кучешка лобода)	Лободови	Незначително, в минимални количества
43.	*Convolvulus* sp. (поветица)	Поветицови	Вторично, в минимални количества
44.	*Cornus* sp. (дрян)	Дрянови	в минимални количества
45.	*Sedum* sp. (глъстига)	Дебелецови	Незначително
46.	*Eleagnus* sp. (миризлива върба)	Миризливовърбови	в минимални количества
47.	*Euphorbia* sp. (млечка)	Euphorbiaceae (Млечкови)	в минимални количества
48.	*Coronilla* sp. (зайчина)	Бобови	Незначително, в минимални количества
49.	*Genista* sp. (жълтуга)	Бобови	в минимални количества
50.	Hedysarum sp.	Бобови	Незначително, в минимални количества
51.	*Lathyrus* sp. (секирче)	Бобови	в минимални количества
52.	*Lotus* sp. (звездан)	Бобови	Първично, вторично, незначително, в минимални количества
53.	*Medicago* sp. (люцерна)	Бобови	Незначително
54.	*Melilotus* sp. (комунига)	Бобови	Вторично, незначително, в минимални количества
55.	*Onobrychis* sp. (еспарзета)	Бобови	в минимални количества
56.	*Robinia pseudoacacia (бяла акация)*	Бобови	в минимални количества
57.	*Securigera* sp.	Бобови	Незначително
58.	*Vicia* spp. (глушина)	Бобови	в минимални количества

59.	*Geranium* sp. (здравец)	Здравецови	в минимални количества
60.	Устноцветни	Устноцветни	Незначително, в минимални количества
61.	*Lamium macrodon (мъртва коприва)*	Устноцветни	Вторично, незначително
62.	*Lamium* sp.	Устноцветни	Първично, вторично, незначително, в минимални количества
63.	*Marrubium* sp.	Устноцветни	в минимални количества
64.	*Mentha* sp.	Устноцветни	в минимални количества
65.	Nepeta sp.	Устноцветни	в минимални количества
66.	*Origanum* sp.	Устноцветни	Незначително, в минимални количества
67.	*Phlomis* sp.	Устноцветни	Незначително, в минимални количества
68.	*Salvia* sp.	Устноцветни	в минимални количества
69.	*Teucrium* sp.	Устноцветни	Незначително, в минимални количества
70.	*Thymus* spp.	Устноцветни	в минимални количества
71.	*Lythrum salicaria (обикн. блатия)*	Блатиеви	Незначително, в минимални количества
72.	*Alcea* sp.,	Слезови	в минимални количества
73.	Malva sp.	Слезови	в минимални количества
74.	Tilia sp.	Слезови	в минимални количества
75.	*Morus* sp. (черница)	Черничеви	в минимални количества
76.	Epilobium sp.	Върболикови	в минимални количества
77.	*Corydalis* sp. (лисичина)	Макови	в минимални количества
78.	*Papaver* sp. (мак)	Макови	в минимални количества
79.	*Linaria* sp. (луличка)	Живовлекови	Незначително, в минимални количества
80.	*Plantago lanceolata (теснолистен живовлек)*	Живовлекови	Първично, вторично, незначително, в минимални количества
81.	*Acantholimon* sp.	Саркофаеви	в минимални количества
82.	Polygala sp.	Телчаркови	в минимални количества
83.	*Polygonum* sp. (пача трева)	Лападови	в минимални количества
84.	Rheum sp. (ревен)	Лападови	в минимални количества
85.	*Rumex* sp. (лапад)	Лападови	в минимални количества
86.	*Portulaca* sp. (калдъръмче)	Portulacaceae	в минимални количества
87.	*Lysimachia* sp. (ленивче)	Игликови	в минимални количества
88.	*Ranunculus* sp. (лютиче)	RANUNCULACEAE	в минимални количества
89.	*Paliurus spina christi (обикн. драка)*	Зърникови	в минимални количества
90.	*Cerasus* sp. (череша)	Розоцветни	в минимални количества
91.	*Filipendula* sp. (орехче)	Розоцветни	Незначително, в минимални количества
92.	*Fragaria* sp. (ягода)	Розоцветни	в минимални количества
93.	*Potentilla* sp. (очиболец)	Розоцветни	Вторично, незначително, в минимални количества

94.	*Prunus* sp. (слива)	Розоцветни	в минимални количества
95.	*Pyrus* sp. (круша)	Розоцветни	в минимални количества
96.	*Rosa canina (обикн. шипка)*	Розоцветни	Незначително, в минимални количества
97.	Розоцветни	Розоцветни	Вторично, незначително, в минимални количества
98.	*Rubus* sp. (къпина)	Розоцветни	в минимални количества
99.	*Sanguisorba* minor (дребна динка)	Розоцветни	Незначително, в минимални количества
100.	*Galium* sp. (еньовче)	Брошови	Незначително, в минимални количества
101.	*Citrus* sp.	Седефчеви	Незначително, в минимални количества
102.	*Salix* sp. (върба)	Върбови	Незначително, в минимални количества
103.	*Verbascum* spp. (лопен)	Живеничеви	Първично, вторично, незначително, в минимални количества
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	в минимални количества

3.3. *Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)*

—

3.4. *Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район*

Всички етапи на производството, преработката и приготвянето трябва да бъдат осъществени в определения географски район.

3.5. *Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование*

Медът се продава в стъклени буркани с максимално тегло 1 kg.

Медът на восъчна пита се продава в правоъгълна, квадратна или лакирана опаковка от 3—5 kg, подходяща за контакт с храни.

Предлаганият на пазара мед трябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина и да се съхранява на чисти и сухи места с вътрешна температура, ненадвишаваща 20 °C, без миризми.

3.6. *Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование*

Наименованието „Bingöl Balı“ и едно от следните лога на „Bingöl Balı“, трябва да фигурират върху опаковката на продукта.





4. **Кратко определение на географския район**

Определеният географски район включва всички села и градове на провинция Bingöl в областта Източен Анадол в Турция.

5. **Връзка с географския район**

Заявлението за регистрация на наименованието за произход „Bingöl Balı“ се основава единствено на специфичното качество и на характеристиките на продукта, които са резултат от природните и човешки фактори в географския район.

Специфични характеристики на географския район

Провинция Bingöl е заобиколена от планини. Основните морфологични единици са вулканични плата с различна надморска височина в планински райони из цялата провинция; долини, образувани от потоци, които разсичат планинските райони и се установяват по линиите на разлома, както и равнини и басейни, образувани в резултат на тектоничната активност сред планинските масиви. Надморската височина и земните форми, които се променят на кратки разстояния, водят до разнообразие на разделените топография, климатични елементи и растителност.

Годишното количество на валежите и големият брой слънчеви дни в Bingöl обуславят богатството на флората в географския район. Дъбовете (*Quercus petraea subsp. pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky и *Quercus libani Oliv.*) оформят преобладаващото покритие в горските райони. В степните зони изобилстват видовете сграбиче *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. и *Astragalus gummifer Labill.*

Тъй като средната височина на плата е 1 500—2 000 m, летният период е студен и периодът на цъфтеж се удължава. Това води до създаването на естествени места за гнездене, които могат да се използват от юни до октомври по отношение на пчеларската дейност. Това също така осигурява защитени местни райони за пчеларството.

Липсата на предприятия от тежката промишленост в Bingöl гарантира, че почвените и водните ресурси остават чисти.

Специфични характеристики на продукта

Провинция Bingöl заема важно място в пчеларството по отношение на своето местоположение, природни условия и производствени стойности. Bingöl е разположена в източната част на Анадолския Диагонал в иранско-туранската растителна област, притежаваща различен топографски профил в сравнение с по-широкия регион и страната, и има голям потенциал за пчеларство поради богатото си цветно разнообразие и широкия спектър от периоди на цъфтеж. Поради тази причина провинция Bingöl притежава богато растително многообразие и се характеризира с висока степен на ендемизъм. Съществуват около 1 700 растителни вида, от които 300 са ендемични за Bingöl. Освен това повече от 200 растителни таксони са регистрирани като пчелни растения с мелисопалинологични анализи. Основните растителни семейства сред тези пчелни растения са Сложноцветни (семейство Маргаритки), Бобови (семейство Бобови) и Звъникови (семейство Жълт кантарион). Това цветно разнообразие очевидно е отразено в ботаническия произход на „Bingöl Balı“.

От ботаническа гледна точка „Bingöl Balı“ се характеризира с богатото си съдържание на полен, включително наличието на поне един от съответните таксони: *Astragalus* sp. (сграбиче), *Centaurea* sp. (метличина), *Hypericum* sp. (жълт кантарион), *Trifolium* sp. (детелина) и *Xeranthemum* sp. (безсмъртниче или едногодишни вечни), както и някои от полените, посочени в Таблица 2 от точка 3.2

Човешки фактор

Пчеларството, което се извършва от много години в провинция Bingöl, е важен източник на доходи за географския район.

Дейностите по пчеларство се извършват предимно под формата на мигриращо пчеларство. Дейностите на пчеларите започват в началото на март с грижите и храненето на пчелните семейства през зимата и с управлението на пчелите майки. Тази подготовка продължава до средата на май. Пчеларите могат да преместят пчелите си в рамките на географския район през май в зависимост от потока на нектара.

Промяната на местоположението на пчелите зависи главно от височината. Растителността оредява на надморска височина от 1 100 m, така че пчелите се преместват на 1 900 m и по-високо, на 3—4 km от населените места, в посока на естествени водоизточници и райони с изобилни потоци на нектар и полен.

Препратка към публикуваната продуктова спецификация

—