C/2024/1989

12.3.2024

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(C/2024/1989)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ([1]) do tří měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Bingöl Balı“

EU č.: PDO-TR-02886 – 5.1.2023

CHOP (x) CHZO ( )

1. **Název (názvy)**

„Bingöl Balı“

2. **Členský stát nebo třetí země**

Turecko

3. **Popis zemědělského produktu nebo potraviny**

3.1 *Druh produktu*

Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

3.2 *Popis výrobku, na který se vztahuje název uvedený v bodě (1)*

„Bingöl Balı“ je smíšený květový med získávaný ze zeměpisné oblasti uvedené v oddíle 4. Jeho barva může přecházet od světle jantarové po tmavě jantarovou. Prodává se jako plástečkový a vytočený med. V produkci se používají plemena včel *Apis mellifera anatoliaca, A. mellifera caucasica, A. mellifera meda* a jejich kříženci.

Pylové vlastnosti medu „Bingöl Balı“ jsou tyto:

i) Pyl by měl obsahovat alespoň jeden z příbuzných taxonů *Astragalus* sp. (kozinec), *Centaurea* sp. (chrpa), *Hypericum* sp. (třezalka), *Trifolium* sp. (jetel) a *Xeranthemum* sp. (suchokvět),

ii) a dále by měl být kompatibilní s pylovým spektrem uvedeným v tabulce 2 (nevyžaduje se přítomnost všech uvedených pylových taxonů zároveň).

Tabulka 1

Fyzikálně-chemické vlastnosti medu „Bingöl Balı“

Vlastnost	Hodnota
Vlhkost (max. %)	18 %
Sacharóza (g / 100 g; max.)	3 g / 100 g
Fruktóza + glukóza (g / 100 g; min.)	65 g / 100 g
Fruktóza/glukóza	1,00–1,30
Maltóza (max. %)	4 %

([1]) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Látka nerozpustná ve vodě (g / 100 g; max.)	0,1 g / 100 g
Obsah volných kyselin (mekv/kg; max.)	40 mekv/kg
Elektrická vodivost (mS/cm; max.)	0,8 mS/cm
Počet diastáz (min.)	15
HMF (mg/kg; max.)	20 mg/kg
$\delta^{13} C_{med}$	– 23 nebo méně
$\delta^{13} C_{protein} - \delta^{13} C_{med}$	– 1,0 nebo více
$C_{4\ cukry}$ (max.)	7 %
Prolin (mg/kg; min.)	450

Tabulka 2

Pylové vlastnosti medu „Bingöl Balı“

	Taxon	Čeleď	Obsah pylu (hlavní: ≥ 45 %, doprovodný: 16–44 %, ojedinělý: 3–15 %, stopový: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	ojedinělý, stopový
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	ojedinělý, stopový
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	ojedinělý, stopový
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	ojedinělý, stopový
5.	Apiaceae	Apiaceae	stopový
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	stopový
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	doprovodný, ojedinělý, stopový
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	hlavní, stopový
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	ojedinělý, stopový
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	stopový
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	doprovodný, stopový
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	stopový
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	doprovodný, ojedinělý, stopový
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	ojedinělý, stopový
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	doprovodný, stopový
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	doprovodný, ojedinělý, stopový
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	ojedinělý, stopový
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	stopový
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	hlavní, doprovodný, ojedinělý, stopový
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	stopový
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	stopový
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	stopový
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	stopový

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	ojedinělý, stopový
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	stopový
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	stopový
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	stopový
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	stopový
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	ojedinělý, stopový
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	ojedinělý, stopový
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	stopový
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	ojedinělý, stopový
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	ojedinělý, stopový
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	ojedinělý, stopový
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	stopový
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	stopový
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	stopový
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	ojedinělý
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	stopový
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	stopový
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ *Amaranthaceae*	doprovodný, ojedinělý, stopový
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	ojedinělý, stopový
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	doprovodný, stopový
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	stopový
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	ojedinělý
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	stopový
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	stopový
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	ojedinělý, stopový
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	stopový
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	ojedinělý, stopový
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	stopový
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	hlavní, doprovodný, ojedinělý, stopový
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	ojedinělý
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	doprovodný, ojedinělý, stopový
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	stopový
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	stopový
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	ojedinělý
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	stopový

59.	*Geranium* sp.	Geraniaceae	stopový
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	ojedinělý, stopový
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	doprovodný, ojedinělý
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	hlavní, doprovodný, ojedinělý, stopový
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	stopový
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	stopový
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	stopový
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	ojedinělý, stopový
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	ojedinělý, stopový
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	stopový
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	ojedinělý, stopový
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	stopový
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	ojedinělý, stopový
72.	*Alcea* sp.,	Malvaceae	stopový
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	stopový
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	stopový
75.	*Morus* sp.	Moraceae	stopový
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	stopový
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	stopový
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	stopový
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	ojedinělý, stopový
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	hlavní, doprovodný, ojedinělý, stopový
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	stopový
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	stopový
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	stopový
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	stopový
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	stopový
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	stopový
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	stopový
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	stopový
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	stopový
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	stopový
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	ojedinělý, stopový
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	stopový
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	doprovodný, ojedinělý, stopový

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	stopový
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	stopový
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	ojedinělý, stopový
97.	Rosaceae	Rosaceae	doprovodný, ojedinělý, stopový
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	stopový
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	ojedinělý, stopový
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	ojedinělý, stopový
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	ojedinělý, stopový
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	ojedinělý, stopový
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	hlavní, doprovodný, ojedinělý, stopový
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	stopový

3.3 *Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)*

—

3.4 *Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti*

Veškeré fáze produkce, zpracování a přípravy musí probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.5 *Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název*

Med se prodává ve skleněných nádobách o maximální hmotnosti 1 kg.

Plástečkové medy se prodávají balené v obdélníkových, čtvercových nebo lakovaných baleních o hmotnosti 3–5 kg vhodných pro styk s potravinami.

Med nabízený k prodeji je chráněn před přímým slunečním zářením a skladován v čistých a suchých prostorách s vnitřní teplotou do 20 °C bez zápachů.

3.6 *Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název*

Na obalu výrobku musí být uveden název „Bingöl Balı“ a jedno z následujících log „Bingöl Balı“.





4. **Stručné vymezení zeměpisné oblasti**

Vymezená zeměpisná oblast zahrnuje všechny vesnice a města v provincii Bingöl ve východní Anatolii v Turecku.

5. **Souvislost se zeměpisnou oblastí**

Žádost o zápis označení původu „Bingöl Balı“ je založena výhradně na zvláštní jakosti a vlastnostech produktu, které vyplývají z přírodních a lidských faktorů přítomných v dané zeměpisné oblasti.

Specifičnost zeměpisné oblasti

Provincie Bingöl je obklopena horami. Hlavními morfologickými jednotkami jsou plošiny sopečného původu s různými nadmořskými výškami v horských oblastech celé provincie, údolí vzniklá poté, co vodní toky rozdělily horské oblastí a usadily se na zlomových liniích, roviny a pánve vzniklé v důsledku tektonismu mezi horskými masivy. Nadmořská výška a krajinný reliéf, jež se rychle mění i na krátkých úsecích, vedou k rozmanitosti topografie, klimatických prvků a vegetace.

Díky ročním srážkám a vysokému počtu slunečných dnů v provincii Bingöl je flóra této zeměpisné oblasti bohatá. V lesních oblastech tvoří dominantní pokryv duby (*Quercus petraea* subs. *pinnatiloba (K.Koch) Menitsky* a *Quercus libani Oliv.*). Ve stepních oblastech se hojně vyskytují druhy kozince *Astragalus muschianus Kotschy & Boiss. ex Boiss.* a *Astragalus gummifer Labill.*

Vzhledem k tomu, že průměrná výška náhorních plošin dosahuje 1 500 – 2 000 m, je letní období chladné a doba kvetení se prodlužuje. To vede k vytváření přirozených biotopů, které lze z hlediska včelařských činností využívat od června do října. Včelařství zde rovněž disponuje chráněnými lokalitami.

Díky tomu, že v provincii Bingöl nejsou podniky těžkého průmyslu, zůstávají půda a vodní zdroje čisté.

Specifičnost produktu

Provincie Bingöl je z hlediska své polohy, přírodních podmínek a produkčních hodnot významným místem pro včelařské činnosti. Provincie Bingöl se nachází východně od anatolské diagonály v íránsko-turanské floristické oblasti a v rámci širší oblasti i Turecka má specifickou topografii. Díky své bohaté floristické rozmanitosti a širokým rozpětím v obdobích kvetení skýtá významný potenciál pro včelařství. Z tohoto důvodu se provincie Bingöl vyznačuje bohatou rozmanitostí flóry a vysokou mírou endemismu. Flóra provincie Bingöl zahrnuje přibližně 1 700 druhů, z toho 300 endemických. Na základě melissopalynologických analýz bylo kromě toho více než 200 rostlinných taxonů zaregistrováno jako včelařské rostliny. Nejrozšířenějšími rostlinnými čeleděmi mezi těmito včelařskými rostlinami jsou *Asteraceae* (čeleď hvězdnicovité), *Fabaceae* (čeleď bobovité) a *Hypericaceae* (čeleď třezalkovité). Tato rozmanitost rostlin je v botanickém původu medu „Bingöl Balı“ patrná.

Produkt „Bingöl Balı“ se vyznačuje bohatým obsahem pylu, přičemž by měl obsahovat alespoň jeden z příbuzných taxonů *Astragalus* sp. (kozinec), *Centaurea* sp. (chrpa), *Hypericum* sp. (třezalka), *Trifolium* sp. (jetel) a *Xeranthemum* sp. (suchokvět) a některé z pylů uvedených v tabulce 2, bod 3.2.

Lidský faktor

Včelařství, které se v provincii Bingöl provozuje již mnoho let, je pro tuto zeměpisnou oblast důležitým zdrojem příjmů.

Včelařské činnosti se většinou provádějí formou kočovného včelařství. Začínají počátkem března péčí o včelstva a jejich krmením během zimy a kontrolou včelí matky. Tato příprava trvá až do poloviny května. V květnu mohou včelaři přemístit své včely v rámci zeměpisné oblasti v závislosti na míře toku nektaru.

Tato přemístění závisejí zejména na nadmořské výšce. Od nadmořské výšky 1 100 m se vegetace stává vzácnější, takže se včely stěhují do 1 900 m a výše, 3 až 4 kilometry od osad, směrem k přírodním vodním zdrojům a oblastem s bohatými toky nektaru a pylu.

Odkaz na zveřejnění specifikace

—