C/2024/1989

12.3.2024

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(C/2024/1989)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 ([1]), senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

ENHEDSDOKUMENT

"Bingöl Balı"

EU-nr.: PDO-TR-02886 — 5.1.2023

BOB (x) BGB ( )

1. **Betegnelse**

"Bingöl Balı"

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Tyrkiet

3. **Beskrivelse af landbrugsprodukteller fødevaren**

3.1. *Produkttype*

Kategori 1.4. Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

3.2. *Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1*

"Bingöl Balı" er en flerblomsthonning fra det geografiske område, der er afgrænset i punkt 4. Dens farve kan variere fra lys ravfarvet til mørk ravfarvet. Den markedsføres som bikagehonning og slynget honning. Der anvendes bier af arterne *Apis mellifera* anatoliaca, *A. mellifera* caucasica og *A. mellifera* meda samt deres hybrider til produktionen.

"Bingöl Balı" har følgende pollenegenskaber:

i) Pollen bør indeholde mindst én af de beslægtede taxa *Astragalus* sp. (astragel), *Centaurea* sp. (knopurt), *Hypericum* sp. (perikon), *Trifolium* sp. (kløver) og *Xeranthemum* sp. (papirblomst).

ii) Pollen bør også overholde det pollenspektrum, der er angivet i tabel 2 (det er ikke et krav, at alle nævnte pollentaxa forekommer samtidig).

Tabel 1

Fysisk-kemiske egenskaber for "Bingöl Balı"

Egenskab	Værdi
Vandindhold (maks. i %)	18 %
Saccharose (g/100 g, maks.)	3 g/100 g
Fruktose + glukose (g/100 g, min.)	65 g/100 g
Fruktose/glukose	1,00-1,30
Maltose (maks. i %)	4 %

([1]) EUT L 343 af 14.12 2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Vanduopløselige stoffer (g/100 g, maks.)	0,1 g/100 g
Indhold af frie syrer (meq/kg, maks.)	40 meq/kg
Elektrisk ledningsevne (mS/cm, maks.)	0,8 mS/cm
Antal diastaser (min.)	15
HMF (mg/kg, maks.)	20 mg/kg
$\delta^{13}C_{honning}$	- 23 eller derunder
$\delta^{13}C_{protein} - \delta^{13}C_{honning}$	– 1,0 eller derover
$C_{4\ sukker}$ (maks.)	7 %
Prolin (mg/kg, min.)	450

Tabel 2

Melissopalynologiske egenskaber for "Bingöl Balı"

	Taxon	Familie	Pollenindhold (primær: ≥ 45 %, sekundær: 16-44 %, mindre: 3-15 %, spor: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Mindre, spor
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Mindre, spor
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Mindre, spor
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Mindre, spor
5.	Apiaceae	Apiaceae	Spor
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	Spor
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Sekundær, mindre, spor
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Primær, spor
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Mindre, spor
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	Spor
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Sekundær, spor
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	Spor
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Sekundær, mindre, spor
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Mindre, spor
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Sekundær, spor
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Sekundær, mindre, spor
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Mindre, spor
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	Spor
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Primær, sekundær, mindre, spor
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	Spor
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	Spor
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	Spor
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	Spor

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Mindre, spor
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	Spor
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	Spor
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	Spor
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	Spor
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Mindre, spor
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Mindre, spor
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	Spor
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Mindre, spor
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Mindre, spor
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Mindre, spor
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	Spor
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	Spor
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	Spor
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Mindre
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	Spor
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	Spor
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Sekundær, mindre, spor
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Mindre, spor
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Sekundær, spor
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	Spor
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Mindre
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	Spor
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Spor
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Mindre, spor
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	Spor
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Mindre, spor
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	Spor
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Primær, sekundær, mindre, spor
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Mindre
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Sekundær, mindre, spor
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	Spor
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	Spor
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Mindre
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	Spor

59.	*Geranium* sp.	Geraniaceae	Spor
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Mindre, spor
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Sekundær, mindre
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Primær, sekundær, mindre, spor
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	Spor
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	Spor
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	Spor
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Mindre, spor
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Mindre, spor
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	Spor
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Mindre, spor
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	Spor
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Mindre, spor
72.	*Alcea* sp.	Malvaceae	Spor
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	Spor
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	Spor
75.	*Morus* sp.	Moraceae	Spor
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	Spor
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	Spor
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	Spor
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Mindre, spor
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Primær, sekundær, mindre, spor
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	Spor
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	Spor
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	Spor
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	Spor
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	Spor
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	Spor
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	Spor
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	Spor
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	Spor
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	Spor
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Mindre, spor
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	Spor
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Sekundær, mindre, spor

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	Spor
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	Spor
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Mindre, spor
97.	Rosaceae	Rosaceae	Sekundær, mindre, spor
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	Spor
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	Mindre, spor
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Mindre, spor
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Mindre, spor
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Mindre, spor
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Primær, sekundær, mindre, spor
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	Spor

3.3. *Foder (kun for animalske produkter) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)*

—

3.4. *Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område*

Alle faser af produktionen, forarbejdningen og klargøringen skal finde sted i det afgrænsede geografiske område.

3.5. *Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til*

Honningen sælges i glas på højst 1 kg.

Bikagehonningen sælges i rektangulær, firkantet eller lakeret emballage på 3-5 kg, der er egnet til kontakt med fødevarer.

Den udbudte honning skal beskyttes mod direkte sollys og opbevares et rent, tørt og lugtfrit sted med en rumtemperatur på højst 20 °C.

3.6. *Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til*

Betegnelsen "Bingöl Balı" og et af følgende logoer for "Bingöl Balı" skal være angivet på produktets emballage.





4. **Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning**

Det afgrænsede geografiske område omfatter alle landsbyer og byer i provinsen Bingöl i det østlige Anatolien i Tyrkiet.

5. **Tilknytning til det geografiske område**

Ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen "Bingöl Balı" er udelukkende baseret på produktets særlige kvalitet og kendetegn, der er resultatet af de naturlige og menneskelige faktorer, som findes i det geografiske område.

Det geografiske områdes egenart

Provinsen Bingöl er omgivet af bjerge. De vigtigste morfologiske enheder er vulkanplateauer i forskellige højder i bjergområder i hele provinsen, dale dannet af vandløb, der skærer gennem bjergområder og løber langs med forkastningslinjer, og sletter og bassiner, der er dannet af tektonisk aktivitet i bjergmasser. Højder og landskaber, der ændrer sig over korte afstande, giver mangfoldighed med hensyn til topografi, klimaforhold og vegetation.

Den årlige nedbørsmængde og det store antal solskinsdage i Bingöl giver en rig flora i det geografiske område. Egetræer (*Quercus petraea subsp. pinnatiloba* (K. Koch) Menitsky og *Quercus libani Oliv.*) udgør det dominerende dække i skovområderne. I steppeområderne er der store forekomster af astragelarterne *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. og *Astragalus gummifer Labill.*

Eftersom plateauernes gennemsnitlige højde er 1 500-2 000 m over havet, er sommerperioden kølig, og blomstrings perioden lang. Dette medfører dannelse af naturlige ynglesteder, der kan anvendes til biavl fra juni til oktober. Det betyder også, at der forefindes beskyttede lokale områder til biavl.

Fraværet af tunge industrivirksomheder i Bingöl har sikret, at jord- og vandressourcerne forbliver rene.

Produktets egenart

Provinsen Bingöl spiller en vigtig rolle for biavl på grund af sin beliggenhed, naturlige forhold og produktionsværdier. Bingöl ligger i den østlige del af Anatoliens diagonal i den iransk-turanske floraregion og har en særlig topografi i forhold til regionen som helhed og landet samt rige muligheder for biavl på grund af den store floradiversitet og de mange forskellige blomsterperioder. Provinsen Bingöl har således en rig plantediversitet og et stort antal endemiske arter. Der er ca. 1 700 plantearter, hvoraf 300 er endemiske for Bingöl. Desuden er over 200 plantetaxa blevet registreret som biplanter med melissopalynologiske analyser. De væsentligste plantefamilier blandt disse biplanter, er Asteraceae (astersfamilien), Fabaceae (bælgplantefamilien) og Hypericaceae (perikonfamilien). Denne floradiversitet afspejles naturligvis i den botaniske oprindelse af "Bingöl Balı".

Botanisk set er "Bingöl Balı" kendetegnet ved sit rige pollenindhold, herunder tilstedeværelsen af mindst én af de beslægtede taxa *Astragalus* sp. (astragel), *Centaurea* sp. (knopurt), *Hypericum* sp. (perikon), *Trifolium* sp. (kløver) og *Xeranthemum* sp. (papirblomst) samt nogle af de pollen, der er angivet i punkt 3.2 i tabel 2.

Den menneskelige faktor

Biavl, som har fundet sted i provinsen Bingöl i mange år, er en vigtig indtægtskilde for det geografiske område.

Biavlen omfatter for det meste en flytning af bistaderne. Biavlernes aktiviteter starter i begyndelsen af marts, idet vinteren går med pasning og fodring af bikolonierne og tilsyn med bidronningen. Disse forberedelser fortsætter indtil midt i maj. Biavlerne kan flytte deres bier inden for det geografiske område i maj alt efter nektarproduktionen.

Ændringen af biernes placering afhænger primært af højden over havet. Det tynder ud i vegetationen fra en højde på 1 100 m over havet, så bierne flyttes til en højde på 1 900 m og derover 3-4 km fra bebyggelserne til naturlige vandkilder og områder med en rigelig nektar- og pollenproduktion.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

—