C/2024/1989

12.3.2024

Veröffentlichung eines Antrags auf Eintragung eines Namens nach Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

(C/2024/1989)

Diese Veröffentlichung eröffnet die Möglichkeit, gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ([1]) innerhalb von drei Monaten ab dieser Veröffentlichung Einspruch gegen den Antrag zu erheben.

EINZIGES DOKUMENT

„Bingöl Balı“

EU-Nr.: PDO-TR-02886 – 5.1.2023

g. U. (x) g. g. A. ( )

1. **Name(n)**

„Bingöl Balı“

2. **Mitgliedstaat oder Drittland**

Türkei

3. **Beschreibung des Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels**

3.1. *Art des Erzeugnisses*

Klasse 1.4. Sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs (Eier, Honig, verschiedene Milcherzeugnisse außer Butter usw.)

3.2. *Beschreibung des Erzeugnisses, für das der unter Punkt 1 aufgeführte Name gilt*

„Bingöl Balı“ ist ein Blütenhonig, der in dem unter Punkt 4 beschriebenen geografischen Gebiet gewonnen wird. Seine Farbe kann zwischen hell- und dunkel-bernsteinfarben variieren. Er wird in Form von Honigwaben und als extrahierter Honig auf den Markt gebracht. Bei der Erzeugung werden die Bienenrassen *Apis mellifera* anatoliaca, *A. mellifera* caucasica, *A. mellifera* meda und ihre Hybriden verwendet.

„Bingöl Balı“ weist folgende Polleneigenschaften auf:

i) Der Pollen sollte mindestens eine der verwandten Taxa enthalten: *Astragalus* sp. (Tragant), *Centaurea* sp. (Flockenblumen), *Hypericum* sp. (Johanniskräuter), *Trifolium* sp. (Klee) und *Xeranthemum* sp. (Spreublumen).

ii) Außerdem sollte der Pollen mit dem in Tabelle 2 aufgeführten Pollenspektrum kompatibel sein (das Vorhandensein aller aufgeführten Pollentaxa ist nicht erforderlich).

Tabelle 1

Physikochemische Eigenschaften von „Bingöl Balı“

Merkmal	Wert
Feuchtigkeit (% max.)	18 %
Saccharose (g/100 g; max.)	3 g/100 g
Fruktose + Glukose (g/100 g; min.)	65 g/100 g
Fruktose/Glukose	1,00–1,30
Maltose (% max.)	4 %

([1]) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj?locale=de.

Nicht wasserlösliche Stoffe (g/100 g; max.)	0,1 g/100 g
Freie Säure (meq/kg; max.)	40 meq/kg
Elektrische Leitfähigkeit (mS/cm; max.)	0,8 mS/cm
Anzahl der Diastasen (min.)	15
HMF (mg/kg; max.)	20 mg/kg
δ-$^{13}C_{Honig}$	- 23 oder weniger
δ-$^{13}C_{Protein} - \delta$-$^{13}C_{Honig}$	– 1,0 oder mehr.
C_4-Zucker (max.)	7 %
Prolin (mg/kg; min.)	450

Tabelle 2

Melissopalynologische Eigenschaften von „Bingöl Balı“

	Taxon	Familie	Pollengehalt (primär: ≥ 45 %, sekundär: 16-44 %, geringfügig: 3-15 %, in Spuren: <3 %)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Geringfügig, in Spuren
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Geringfügig, in Spuren
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Geringfügig, in Spuren
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Geringfügig, in Spuren
5.	Apiaceae	Apiaceae	In Spuren
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	In Spuren
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Primär, in Spuren
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Geringfügig, in Spuren
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	In Spuren
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Sekundär, in Spuren
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	In Spuren
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Geringfügig, in Spuren
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Sekundär, in Spuren
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Geringfügig, in Spuren
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	In Spuren
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Primär, sekundär, geringfügig, in Spuren
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	In Spuren
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	In Spuren
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	In Spuren
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	In Spuren

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Geringfügig, in Spuren
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	In Spuren
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	In Spuren
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	In Spuren
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	In Spuren
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Geringfügig, in Spuren
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Geringfügig, in Spuren
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	In Spuren
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Geringfügig, in Spuren
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Geringfügig, in Spuren
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Geringfügig, in Spuren
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	In Spuren
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	In Spuren
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	In Spuren
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Geringfügig
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	In Spuren
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	In Spuren
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Geringfügig, in Spuren
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Sekundär, in Spuren
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	In Spuren
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Geringfügig
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	In Spuren
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	In Spuren
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Geringfügig, in Spuren
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	In Spuren
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Geringfügig, in Spuren
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	In Spuren
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Primär, sekundär, geringfügig, in Spuren
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Geringfügig
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	In Spuren
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	In Spuren
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Geringfügig
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	In Spuren

59.	*Geranium* sp.	Geraniaceae	In Spuren
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Geringfügig, in Spuren
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Sekundär, geringfügig
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Primär, sekundär, geringfügig, in Spuren
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	In Spuren
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	In Spuren
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	In Spuren
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Geringfügig, in Spuren
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Geringfügig, in Spuren
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	In Spuren
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Geringfügig, in Spuren
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	In Spuren
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Geringfügig, in Spuren
72.	*Alcea* sp.,	Malvaceae	In Spuren
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	In Spuren
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	In Spuren
75.	*Morus* sp.	Moraceae	In Spuren
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	In Spuren
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	In Spuren
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	In Spuren
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Geringfügig, in Spuren
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Primär, sekundär, geringfügig, in Spuren
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	In Spuren
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	In Spuren
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	In Spuren
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	In Spuren
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	In Spuren
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	In Spuren
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	In Spuren
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	In Spuren
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	In Spuren
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	In Spuren
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Geringfügig, in Spuren
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	In Spuren
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	In Spuren
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	In Spuren
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Geringfügig, in Spuren
97.	Rosaceae	Rosaceae	Sekundär, geringfügig, in Spuren
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	In Spuren
99.	Sanguisorba minor	Rosaceae	Geringfügig, in Spuren
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Geringfügig, in Spuren
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Geringfügig, in Spuren
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Geringfügig, in Spuren
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Primär, sekundär, geringfügig, in Spuren
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	In Spuren

3.3. *Futter (nur für Erzeugnisse tierischen Ursprungs) und Rohstoffe (nur für Verarbeitungserzeugnisse)*

—

3.4. *Besondere Erzeugungsschritte, die in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen müssen*

Alle Phasen der Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung erfolgen ausschließlich im abgegrenzten geografischen Gebiet.

3.5. *Besondere Vorschriften für Vorgänge wie Schneiden, Reiben, Verpacken usw. des Erzeugnisses mit dem eingetragenen Namen*

Der Honig wird in Glasgläsern mit einem Gewicht von höchstens 1 kg verkauft.

Wabenhonig wird in rechteckiger, quadratischer oder lackierter Verpackung von 3-5 kg verkauft, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Der in den Verkehr gebrachte Honig muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und an sauberen und trockenen Orten mit einer Innentemperatur von höchstens 20 °C gelagert werden, ohne Geruch.

3.6. *Besondere Vorschriften für die Kennzeichnung des Erzeugnisses mit dem eingetragenen Namen*

Der Name „Bingöl Balı“ und eines der folgenden Logos von „Bingöl Balı“ sind auf der Verpackung des Erzeugnisses anzubringen.





4. **Kurzbeschreibung der Abgrenzung des geografischen Gebiets**

Das abgegrenzte geografische Gebiet umfasst alle Dörfer und Städte der Provinz Bingöl in Ostanatolien (Türkei).

5. **Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet**

Der Antrag auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung „Bingöl Balı“ stützt sich ausschließlich auf die besondere Qualität und die Merkmale des Erzeugnisses, die sich aus den natürlichen und menschlichen Einflüssen in dem geografischen Gebiet ergeben.

Besonderheit des geografischen Gebiets

Die Provinz Bingöl ist von Bergen umgeben. Über die gesamte Provinz erstrecken sich vulkanische Plateaus in verschiedenen Höhenlagen, mit Tälern, die von Flüssen und Bächen geformt wurden und die Bergregionen durchschneiden. Zu den wichtigsten morphologischen Einheiten gehören Verwerfungslinien, Ebenen und Talkessel, die durch tektonische Aktivitäten in den Gebirgsmassiven entstanden sind. Durch die sich in kurzen Abständen ändernden Höhenlagen und Landformen besteht eine große topografische, klimatische und pflanzliche Vielfalt.

Aufgrund der jährlichen Niederschlagsmengen und der Zahl der Sonnentage in Bingöl zeichnet sich das geografische Gebiet durch eine reichhaltige Flora aus. Eichen (*Quercus petraea* subsp. *pinnatiloba* (K. Koch) Menitsky und *Quercus libani* Oliv.) sind die dominante Baumart in den bewaldeten Gebieten. In den Steppengebieten kommen die Tragant-Arten *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. und *Astragalus gummifer* Labill. häufig vor.

Aufgrund der durchschnittlichen Höhe der Plateaus von 1 500 bis 2 000 m sind die Sommer kühl, wodurch sich die Blütezeiten verlängern. Dies führt zur Bildung natürlicher Nistplätze, die von Juni bis Oktober für die Bienenzucht genutzt werden können. Und es bieten sich geschützte lokale Bereiche für die Bienenzucht.

Da es in Bingöl keine Schwerindustrie gibt, ist sichergestellt, dass die Boden- und Wasserressourcen sauber bleiben.

Besonderheit des Erzeugnisses

Die Provinz Bingöl ist im Hinblick auf ihre Lage, natürlichen Bedingungen und Produktionswerte ein wichtiger Standort für die Imkerei. Bingöl liegt im Osten der anatolischen Diagonale in der iranisch-türkischen Flora-Region, die sich topografisch von der übrigen Region und dem Land abhebt und aufgrund ihrer vielfältigen Blütenpflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten ein großes Potenzial für die Bienenzucht aufweist. Die Provinz Bingöl zeichnet sich durch eine vielfältige Pflanzenwelt und einen hohen Anteil an endemischen Arten aus. In der Provinz kommen etwa 1 700 Arten vor, von denen 300 endemisch sind. Darüber hinaus wurden mehr als 200 Pflanzentaxa nach melissopalynologischen Analysen als Bienenpflanzen registriert. Die wichtigsten Pflanzenfamilien unter diesen Bienenpflanzen sind Asteraceae (Korbblütler), Fabaceae (Hülsenfrüchtler) und Hypericaceae (Johanniskrautgewächse). Der botanische Ursprung von „Bingöl Balı“ liegt klar in dieser Vielfalt der Blütenpflanzen.

Botanisch gesehen zeichnet sich „Bingöl Balı“ durch den Reichtum seines Pollengehalts aus, wobei mindestens eines der folgenden Taxa enthalten ist: *Astragalus sp*. (Tragant), *Centaurea sp*. (Flockenblumen), *Hypericum sp*. (Johanniskräuter), *Trifolium sp*. (Klee) und *Xeranthemum sp*. (Spreublumen) sowie einige der in Tabelle 2 unter Punkt 3.2 aufgeführten Pollen.

Menschliche Einflüsse

Die seit vielen Jahren in der Provinz Bingöl ausgeübte Imkerei ist eine wichtige Einkommensquelle für das geografische Gebiet.

Zumeist wird die Imkerei in Form von Wanderimkerei ausgeübt. Die Imker werden ab Anfang März tätig. Zunächst werden die Bienenkolonien im Winter gepflegt und gefüttert, und die Bienenkönigin wird kontrolliert. Die Vorbereitungen dauern bis Mitte Mai. Im Mai können die Imker ihre Bienen an andere Orte im geografischen Gebiet bringen, je nach Nektarfluss.

Die Veränderung des Bienenstandorts hängt hauptsächlich von der Höhenlage ab. Ab einer Höhe von 1 100 m wird die Vegetation spärlicher, sodass die Bienen auf 1 900 m und höher, 3-4 km von den Siedlungen entfernt, an natürliche Wasserquellen und in Gebiete mit reichlichem Nektar- und Pollenfluss ziehen.

Hinweis auf die Veröffentlichung der Spezifikation

—