C/2024/1989

12.3.2024

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(C/2024/1989)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Bingöl Balı»

Αριθ. ΕΕ: PDO-TR-02886 — 5.1.2023

ΠΟΠ (x) ΠΓΕ ( )

1. **Ονομασία/-ες**

   «Bingöl Balı»

2. **Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα**

   Τουρκία

3. **Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου**

3.1. *Τύπος προϊόντος*

Κλάση 1.4. Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.)

3.2. *Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία*

Το «Bingöl Balı» είναι πολυανθικό μέλι που λαμβάνεται από τη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στο σημείο 4. Το χρώμα του μπορεί να ποικίλλει από ανοιχτό έως σκούρο κεχριμπαρένιο. Διατίθεται στο εμπόριο ως κηρήθρα και μέλι εκχύλισης. Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται οι φυλές μελισσών *Apis mellifera* anatoliaca, *A. mellifera* caucasica, *A. mellifera* meda και τα υβρίδιά τους.

Τα γυρεοσκοπικά χαρακτηριστικά του «Bingöl Balı» είναι τα εξής:

i) η γύρη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις σχετικές ταξινομικές ομάδες *Astragalus* sp. (αστράγαλος), *Centaurea* sp. (κενταύριο), *Hypericum* sp. (βαλσαμόχορτο), *Trifolium* sp. (τριφύλλι) και *Xeranthemum* sp. (αμάραντος),

ii) η γύρη θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με το γυρεολογικό φάσμα που αναφέρεται στον πίνακα 2 (δεν απαιτείται η παρουσία όλων των καταγεγραμμένων ταξινομικών ομάδων).

Πίνακας 1

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του «Bingöl Balı»

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Υγρασία (κατ' ανώτατο %)	18 %
Σακχαρόζη (g/100g· κατ' ανώτατο όριο)	3g/100g
Φρουκτόζη + γλυκόζη (g/100g· κατ' ελάχιστο όριο)	65g/100g
Φρουκτόζη/Γλυκόζη	1,00-1,30
Μαλτόζη (κατ' ανώτατο %)	4 %

([1]) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Ουσία αδιάλυτη στο νερό (g/100g· κατ' ανώτατο όριο)	0,1g/100g
Ελεύθερη οξύτητα (meq/kg· κατ' ανώτατο όριο)	40 meq/kg
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (mS/cm· κατ' ανώτατο όριο)	0,8mS/cm
Αριθμός διαστάσεων (κατ' ελάχιστο όριο)	15
HMF (mg/kg· κατ' ανώτατο όριο)	20mg/kg
$\delta^{13}C_{\text{μέλι}}$	- 23 ή λιγότερο
$\delta^{13}C_{\text{πρωτεΐνη}} - \delta^{13}C_{\text{μέλι}}$	– 1,0 ή περισσότερο
$C_{4\ \text{σάκχαρα}}$(κατ' ανώτατο όριο)	7 %
Προλίνη (mg/kg· κατ' ελάχιστο όριο)	450

Πίνακας 2

Μελιτογυρεολογικά χαρακτηριστικά του «Bingöl Balı»

	Ταξινομική ομάδα	Οικογένεια	Περιεκτικότητα σε γύρη (Κυρίαρχο: ≥ 45 %, Δευτερεύον: 16 — 44 %, Ήσσονος σημασίας: 3 — 15 %, Ίχνη: <3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
5.	Apiaceae	Apiaceae	Ίχνη
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	Ίχνη
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Κυρίαρχο, ίχνη
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	Ίχνη
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Δευτερεύον, ίχνη
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	Ίχνη
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Δευτερεύον, ίχνη
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	Ίχνη
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Κυρίαρχο, δευτερεύον, ήσσονος σημασίας, ίχνη
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	Ίχνη
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	Ίχνη
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	Ίχνη
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	Ίχνη

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	Ίχνη
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	Ίχνη
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	Ίχνη
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	Ίχνη
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	Ίχνη
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	Ίχνη
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	Ίχνη
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	Ίχνη
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Ήσσονος σημασίας
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	Ίχνη
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	Ίχνη
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Δευτερεύον, ίχνη
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	Ίχνη
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Ήσσονος σημασίας
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	Ίχνη
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Ίχνη
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	Ίχνη
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	Ίχνη
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Κυρίαρχο, δευτερεύον, ήσσονος σημασίας, ίχνη
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Ήσσονος σημασίας
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	Ίχνη
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	Ίχνη
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Ήσσονος σημασίας
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	Ίχνη

59.	Geranium sp.	Geraniaceae	Ίχνη
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Κυρίαρχο, δευτερεύον, ήσσονος σημασίας, ίχνη
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	Ίχνη
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	Ίχνη
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	Ίχνη
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	Ίχνη
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	Ίχνη
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
72.	*Alcea* sp.,	Malvaceae	Ίχνη
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	Ίχνη
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	Ίχνη
75.	*Morus* sp.	Moraceae	Ίχνη
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	Ίχνη
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	Ίχνη
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	Ίχνη
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Κυρίαρχο, δευτερεύον, ήσσονος σημασίας, ίχνη
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	Ίχνη
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	Ίχνη
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	Ίχνη
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	Ίχνη
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	Ίχνη
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	Ίχνη
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	Ίχνη
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	Ίχνη
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	Ίχνη
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	Ίχνη
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	Ίχνη
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	Ίχνη
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	Ίχνη
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
97.	Rosaceae	Rosaceae	Δευτερεύον, Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	Ίχνη
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Ήσσονος σημασίας, Ίχνη
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Κυρίαρχο, δευτερεύον, ήσσονος σημασίας, ίχνη
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	Ίχνη

3.3. *Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)*

—

3.4. *Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής*

Όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και παρασκευής πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

3.5. *Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία*

Το μέλι πωλείται σε γυάλινα δοχεία μέγιστου βάρους 1 kg.

Τα μέλια κηρήθρας πωλούνται σε ορθογώνιες, τετράγωνες ή στεγανοποιημένες με λακάρισμα συσκευασίες βάρους 3-5 kg, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα.

Το μέλι που διατίθεται προς πώληση πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως και να αποθηκεύεται σε καθαρούς και στεγνούς χώρους με εσωτερική θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 20 °C, χωρίς οσμές.

3.6. *Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία*

Η ονομασία «Bingöl Balı» και ένα από τα ακόλουθα λογότυπα «Bingöl Balı» πρέπει να περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.





4. **Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής**

Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή καλύπτει όλα τα χωριά και τις πόλεις που ανήκουν στην επαρχία Bingöl της Ανατολικής Ανατολίας στην Τουρκία.

5. **Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή**

Η αίτηση για καταχώριση της ονομασίας προέλευσης «Bingöl Balı» βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιαίτερη ποιότητα και στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που είναι αποτέλεσμα των φυσικών και των ανθρώπινων παραγόντων που απαντούν στη γεωγραφική περιοχή.

Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Η επαρχία Bingol περιβάλλεται από βουνά. Οι κύριες μορφολογικές μονάδες είναι ηφαιστειακά υψίπεδα σε διαφορετικά υψόμετρα σε ορεινές περιοχές σε ολόκληρη την επαρχία, κοιλάδες που σχηματίζονται από ρεύματα που τέμνουν ορεινές περιοχές και εδραιώνονται σε τεκτονικά ρήγματα, καθώς και πεδιάδες και λεκάνες που σχηματίζονται λόγω της τεκτονικής δραστηριότητας των ορεινών μαζών. Τα υψόμετρα και οι σχηματισμοί που αλλάζουν σε μικρές αποστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ποικιλομορφία όσον αφορά το ανάγλυφο, τα κλιματικά στοιχεία και τη βλάστηση.

Οι ετήσιες βροχοπτώσεις και ο μεγάλος αριθμός ημερών ηλιοφάνειας στο Bingöl συντείνουν στον πλούτο της χλωρίδας της γεωγραφικής περιοχής. Οι δρύες [*Quercus petraea subsp. pinnatiloba (K.Koch) Menitsky* και *Quercus libani Oliv.*] αποτελούν την κυρίαρχη κάλυψη των δασικών περιοχών. Σε περιοχές στέπας, τα είδη αστραγάλου *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. και *Astragalus gummifer Labill.,* αφθονούν.

Δεδομένου ότι το μέσο ύψος των υψιπέδων είναι 1 500-2 000 m, κατά τη θερινή περίοδο το κλίμα είναι δροσερό και η περίοδος ανθοφορίας παρατείνεται. Οι συνθήκες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό φυσικών τόπων φωλεοποίησης, που προσφέρονται από πλευράς μελισσοκομικής δραστηριότητας, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Προσφέρουν επίσης, τοπικά, προστατευόμενες περιοχές για τη μελισσοκομία.

Λόγω της απουσίας επιχειρήσεων βαριάς βιομηχανίας στην επαρχία Bingöl, το έδαφος και οι υδάτινοι πόροι παραμένουν καθαροί.

Ιδιαιτερότητα του προϊόντος

Η επαρχία Bingöl αποτελεί σημαντικό μέρος για μελισσοκομικές δραστηριότητες όσον αφορά την τοποθεσία, τις φυσικές συνθήκες και τις αξίες παραγωγής. Το Bingöl βρίσκεται στα ανατολικά της Διαγωνίου της Ανατολίας στην ιρανοτουρανική περιοχή χλωρίδας, με διακριτή τοπογραφία σε σύγκριση με την ευρύτερη περιοχή και χώρα, και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες μελισσοκομίας λόγω της πλούσιας χλωριδικής ποικιλομορφίας της και του ευρέος φάσματος περιόδων ανθοφορίας. Για τον λόγο αυτόν, η επαρχία Bingöl έχει πλούσια φυτική ποικιλομορφία και παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ενδημικών ειδών. Υπάρχουν περίπου 1 700 φυτικά είδη, εκ των οποίων τα 300 είναι ενδημικά στο Bingöl. Επιπλέον, περισσότερες από 200 φυτικές ταξινομικές ομάδες έχουν καταχωριστεί ως μελισσοκομικά φυτά με μελιτογυρεολογικές αναλύσεις. Οι κύριες οικογένειες φυτών που κυριαρχούν μεταξύ αυτών των μελισσοκομικών φυτών είναι οι Asteraceae (οικογένεια μαργαρίτας), Fabaceae (οικογένεια ψυχανθών) και Hypericaceae (οικογένεια βαλσαμόχορτου). Αυτή η ανθική ποικιλομορφία αντανακλάται σαφώς στη βοτανική προέλευση του «Bingöl Balı».

Από βοτανική άποψη, το «Bingöl Balı» χαρακτηρίζεται από την πλούσια περιεκτικότητά του σε γύρη, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας από τις σχετικές ταξινομικές ομάδες *Astragalus* sp. (αστράγαλος), *Centaurea* sp. (κενταύριο), *Hypericum* sp. (βαλσαμόχορτο), *Trifolium* sp. (τριφύλλι) και *Xeranthemum* sp. (αμάραντος), και ορισμένων από τα είδη γύρης που αναφέρονται στον πίνακα 2 του σημείου 3.2.

Ανθρώπινος παράγοντας

Οι μελισσοκομικές δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται επί πολλά έτη στην επαρχία Bingöl, αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τη γεωγραφική περιοχή.

Οι μελισσοκομικές δραστηριότητες ασκούνται ως επί το πλείστον με τη μορφή της εποχιακής μετακίνησης. Οι μελισσοκομικές δραστηριότητες ξεκινούν στις αρχές Μαρτίου, με τη φροντίδα και τη σίτιση των αποικιών μελισσών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και με τη διαχείριση των αναγκών της βασίλισσας. Η προετοιμασία αυτή συνεχίζεται έως τα μέσα Μαΐου. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να μεταφέρουν τις μέλισσες τους εντός της γεωγραφικής περιοχής τον Μάιο, ανάλογα με το ρυθμό της ροής του νέκταρος.

Η αλλαγή της θέσης των μελισσών εξαρτάται κυρίως από το υψόμετρο. Η βλάστηση μειώνεται σε περιοχές με υψόμετρο 1 100 m, οπότε οι μέλισσες μετακινούνται σε υψόμετρο 1 900 m και άνω, σε απόσταση 3-4 km από τους οικισμούς, κοντά σε φυσικές πηγές νερού και σε περιοχές με αφθονία ροής νέκταρος και γύρης.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

—