C/2024/1989

12.3.2024.

Objava zahtjeva za registraciju naziva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

(C/2024/1989)

Ova je objava temelj za podnošenje prigovora na zahtjev u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ([1]) u roku od tri mjeseca od datuma ove objave.

JEDINSTVENI DOKUMENT

„Bingöl Balı”

EU br.: PDO-TR-02886 – 5.1.2023

ZOI (x) ZOZP ( )

1. **Naziv**

„Bingöl Balı”

2. **Država članica ili treća zemlja**

Turska

3. **Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda**

3.1. *Vrsta proizvoda*

Razred 1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, mliječni proizvodi osim maslaca itd.)

3.2. *Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.*

„Bingöl Balı” poliflorni je med proizveden na zemljopisnom području opisanom u odjeljku 4. Boja može varirati od svijetlojantarne do tamnojantarne. Na tržište se stavlja kao med u saću i kao vrcani med. Med proizvode pčele vrsta *Apis mellifera anatoliaca, A. mellifera caucasica* i *A. mellifera meda*, kao i hibridne vrste.

Pelud meda „Bingöl Balı” ima sljedeća svojstva:

i. sadržava barem jedan od srodnih taksona *Astragalus* sp. (kozlinac), *Centaurea* sp. (zečina), *Hypericum* sp. (gospina trava), *Trifolium* sp. (djetelina) i *Xeranthemum* sp. (nepoven ili poljska metla);

ii. trebao bi biti i u skladu s peludnim spektrom iz tablice 2. (ne moraju biti prisutni svi navedeni peludni taksoni).

Tablica 1.

Fizikalno-kemijska svojstva meda „Bingöl Balı”

Obilježje	Vrijednost
Vlažnost (najviše %)	18 %
Saharoza (g/100 g; maks.)	3 g/100g
Fruktoza + glukoza (g/100 g; min.)	65 g/100 g
Fruktoza/glukoza	1,00 – 1,30
Maltoza (najviše %)	4 %

([1]) SL L 343, 14.12.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Tvari netopive u vodi (g/100 g; maks.)	0,1 g/100 g
Slobodna kiselost (meq/kg; maks.)	40 meq/kg
Električna vodljivost mS/cm; maks.)	0,8 mS/cm
Dijastazni broj (min.)	15
Sadržaj HMF (mg/kg; maks.)	20 mg/kg
$\delta^{13}C_{med}$	– 23 ili manje
$\delta^{13}C_{bjelančevina} - \delta^{13}C_{med}$	– 1,0 ili više
$C_{4\ šećeri}$(maks.)	7 %
Prolin (mg/kg; min.)	450

Tablica 2.

Melisopalinološka svojstva meda „Bingöl Balı"

	Takson	Porodica	Sadržaj peludi (prevladavajuća pelud: ≥ 45 %, sekundarna: 16 – 44 %, sporedna: 3 – 15 %, pelud u tragovima: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Sporedna, u tragovima
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Sporedna, u tragovima
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Sporedna, u tragovima
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Sporedna, u tragovima
5.	Apiaceae	Apiaceae	U tragovima
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	U tragovima
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Prevladavajuća, u tragovima
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Sporedna, u tragovima
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	U tragovima
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Sekundarna, u tragovima
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	U tragovima
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Sporedna, u tragovima
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Sekundarna, u tragovima
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Sporedna, u tragovima
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	U tragovima
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Prevladavajuća, sekundarna, sporedna, u tragovima
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	U tragovima
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	U tragovima
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	U tragovima
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	U tragovima

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Sporedna, u tragovima
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	U tragovima
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	U tragovima
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	U tragovima
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	U tragovima
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Sporedna, u tragovima
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Sporedna, u tragovima
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	U tragovima
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Sporedna, u tragovima
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Sporedna, u tragovima
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Sporedna, u tragovima
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	U tragovima
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	U tragovima
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	U tragovima
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Sporedna
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	U tragovima
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	U tragovima
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Sporedna, u tragovima
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Sekundarna, u tragovima
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	U tragovima
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Sporedna
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	U tragovima
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	U tragovima
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Sporedna, u tragovima
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	U tragovima
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Sporedna, u tragovima
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	U tragovima
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Prevladavajuća, sekundarna, sporedna, u tragovima
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Sporedna
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	U tragovima
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	U tragovima
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Sporedna
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	U tragovima

59.	Geranium sp.	Geraniaceae	U tragovima
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Sporedna, u tragovima
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Sekundarna, sporedna
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Prevladavajuća, sekundarna, sporedna, u tragovima
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	U tragovima
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	U tragovima
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	U tragovima
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Sporedna, u tragovima
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Sporedna, u tragovima
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	U tragovima
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Sporedna, u tragovima
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	U tragovima
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Sporedna, u tragovima
72.	*Alcea* sp.,	Malvaceae	U tragovima
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	U tragovima
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	U tragovima
75.	*Morus* sp.	Moraceae	U tragovima
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	U tragovima
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	U tragovima
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	U tragovima
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Sporedna, u tragovima
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Prevladavajuća, sekundarna, sporedna, u tragovima
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	U tragovima
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	U tragovima
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	U tragovima
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	U tragovima
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	U tragovima
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	U tragovima
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	U tragovima
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	U tragovima
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	U tragovima
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	U tragovima
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Sporedna, u tragovima
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	U tragovima
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	U tragovima
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	U tragovima
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Sporedna, u tragovima
97.	Rosaceae	Rosaceae	Sekundarna, sporedna, u tragovima
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	U tragovima
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	Sporedna, u tragovima
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Sporedna, u tragovima
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Sporedna, u tragovima
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Sporedna, u tragovima
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Prevladavajuća, sekundarna, sporedna, u tragovima
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	U tragovima

3.3. *Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)*

—

3.4. *Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području*

Sve faze proizvodnje, prerade i pripreme moraju se odvijati na definiranom zemljopisnom području.

3.5. *Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv*

Med se na tržište stavlja u staklenkama od najviše 1 kg.

Med u saću na tržište se stavlja u pravokutnim, kvadratnim ili lakiranim paketima od materijala prikladnih za dodir s hranom, zapremnine od 3 do 5 kg.

Med koji se stavlja na tržište mora se čuvati na tamnom, čistom i suhom mjestu bez mirisa na kojem unutarnja temperatura ne prelazi 20° C.

3.6. *Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv*

Na pakiranju proizvoda mora se nalaziti naziv „Bingöl Balı” i jedan od sljedećih logotipa „Bingöl Balı”.





4. **Sažeta definicija zemljopisnog područja**

Razgraničeno zemljopisno područje obuhvaća sva sela i gradove u pokrajini Bingöl u središnjoj Anatoliji u Turskoj.

5. **Povezanost sa zemljopisnim područjem**

Zahtjev za registraciju oznake izvornosti „Bingöl Balı” temelji se isključivo na posebnoj kvaliteti i svojstvima proizvoda koji proizlaze iz prirodnih i ljudskih čimbenika prisutnih na tom zemljopisnom području.

Posebnosti zemljopisnog područja

Pokrajina Bingöl okružena je planinama. Glavne morfološke karakteristike zemljopisnog područja vulkanske su visoravni na različitim nadmorskim visinama, doline oblikovane potocima koji su prodrli put kroz planine i teku u procjepima, kao i ravnice i bazeni formirani tektonskim pomicanjem planina. Topografija, klimatski uvjeti i vegetacija raznoliki su zbog različitih visinskih razlika i reljefnih oblika na malom području.

U pokrajini Bingöl flora zemljopisnog područja bogata je zbog količine godišnjih padalina i velikog broja sunčanih dana. Šumskim pokrovom prevladava hrast (*Quercus petraea subsp. pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky i *Quercus libani Oliv.*). Na stepama česte su vrste kozlinca *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. i *Astragalus gummifer Labill.*

Budući da se visoravni nalaze na prosječnoj visini od 1 500 do 2 000 m, ljeta su hladna, a razdoblje cvatnje dulje traje. Tako nastaju prirodna područja za gniježđenje pogodna za pčelarstvo od lipnja do listopada, a na raspolaganju su i zaštićena lokalna područja.

U pokrajini Bingöl nije prisutna teška industrija pa tlo i izvori vode nisu zagađeni.

Posebnosti proizvoda

Pokrajina Bingöl važna je za pčelarstvo zbog lokacije, prirodnih uvjeta i vrijednosti proizvodnje. Nalazi se na istočnom dijelu Anatolijske dijagonale i pripada Iransko-turanskoj regiji flore. Ima posebnu topografiju u usporedbi s ostatkom regije i zemlje, kao i znatan potencijal za pčelarstvo zbog velike cvjetne raznolikosti i razlike u razdoblju cvatnje. Zbog toga pokrajina Bingöl ima bogatu biljnu raznolikost i velik broj endemskih vrsta. Ondje raste oko 1 700 biljnih vrsta, od kojih je 300 endemsko za to područje. Osim toga, melisopalinološkim analizama utvrđeno je više od 200 biljnih taksona koji privlače pčele. Najzastupljenije porodice tih biljaka su *Asteraceae* (porodica glavočika), *Fabaceae* (porodica mahunarki) i *Hypericaceae* (porodica goračevki). Ta cvjetna raznolikost odražava se u botaničkom podrijetlu meda „Bingöl Balı".

S botaničkog aspekta, med „Bingöl Balı" karakterističan je po bogatom sadržaju peludi, koja uključuje najmanje jedan od srodnih taksona *Astragalus* sp. (kozlinac), *Centaurea* sp. (zečina), *Hypericum* sp. (gospina trava), *Trifolium* sp. (djetelina) i *Xeranthemum* sp. (nepoven ili poljska metla) i neke peludi iz tablice 2. iz odjeljka 3.2.

Ljudski čimbenik

Pčelarstvo je već godinama prisutno u pokrajini Bingöl i važan je izvor prihoda na zemljopisnom području.

Najčešći oblik je pokretno pčelarstvo. Pčelari početkom ožujka počinju s radom. Zimi skrbe za kolonije pčela i hrane ih te se brinu o matici. Ta se priprema nastavlja do sredine svibnja. Pčelari u svibnju mogu, ovisno o količini nektara, premjestiti svoje košnice unutar zemljopisnog područja.

Za preseljenje pčela najvažnija je nadmorska visina. Kada se vegetacija na nadmorskoj visini od 1 100 m prorijedi, pčele se sele na 1 900 m i više, na 3 – 4 km od naselja, bliže prirodnim izvorima vode i područjima s obilnim količinama nektara i peludi.

Upućivanje na objavu specifikacije

—