C/2024/1989

2024 3 12

Paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(C/2024/1989)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį ([1]) per tris mėnesius nuo šio paskelbimo dienos.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Bingöl Balı“

ES Nr.: PDO-TR-02886 – 5.1.2023

SKVN (x) SGN ( )

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Bingöl Balı“

2. **Valstybė narė arba trečioji šalis**

Turkija

3. **Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas**

3.1. *Produkto rūšis*

1.4 klasė. Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)

3.2. *Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas*

SKVN „Bingöl Bal“ žymimas produktas – tai įvairių augalų žiedų medus, gautas 4 skirsnyje nurodytoje geografinėje vietovėje. Jis gali būti nuo šviesaus gintaro iki tamsaus gintaro spalvos. Parduodami šio medaus koriai ir išsuktas medus. Šį medų neša veislių *Apis mellifera anatoliaca*, *A. mellifera caucasica*, *A. mellifera meda* bitės ir jų hibridai.

Žiedadulkių sudėtis SKVN „Bingöl Balı“ žymimame meduje yra ši:

i) žiedadulkės turi būti iš mažiausiai vieno augalo, priklausančio kuriam nors iš šių taksonų: *Astragalus* sp. (kulkšnės), *Centaurea* sp. (bajorės), *Hypericum* sp. (jonažolės), *Trifolium* sp. (dobilai) ir *Xeranthemum* sp. (sausiukų);

ii) žiedadulkės taip pat turi atitikti 2 lentelėje nurodytą žiedadulkių spektrą (nebūtina, kad būtų visų išvardytų taksonų žiedadulkių).

1 lentelė.

SKVN „Bingöl Balı“ žymimo medaus fizikinės ir cheminės savybės

Ypatybės	Vertės
Drėgmė (maks. %)	18 %
Sacharozė (g/100 g; maks.)	3 g/100 g
Fruktozė+gliukozė (g/100 g; min.)	65 g/100 g
Fruktozė/gliukozė	1,00–1,30
Maltozė (maks. %)	4 %

([1]) OL L 343, 2012 12 14, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Vandenyje netirpi medžiaga (g/100 g; maks.)	0,1g/100 g
Laisvųjų rūgščių kiekis (mekv/kg; maks.)	40 mekv/kg
Elektrinis laidumas (mS/cm; maks.)	0,8 mS/cm
Diastazių skaičius (min.)	15
HMF (mg/kg; maks.)	20 mg/kg
$\delta^{13}C_{medaus}$	– 23 ar mažiau
$\delta^{13}C_{baltymo-}\ \delta^{13}C_{medaus}$	– 1,0 arba didesnis
$C_{4\ cukrų}$ (maks.)	7 %
Prolinas (mg/kg; min.)	450

2 lentelė.

SKVN „Bingöl Balı“ žymimo medaus žiedadulkių savybės

	Taksonas	Šeima	Žiedadulkių kiekis (pirminis: ≥ 45 %, antrinis: 16–44 %, nežymus: 3–15 %, pėdsakas: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	akantiniai	nežymus, pėdsakas
2.	*Sambucus* sp.	ūksmininiai	nežymus, pėdsakas
3.	*Allium* sp.	amariliniai	nežymus, pėdsakas
4.	*Rhus* sp.	anakardiniai	nežymus, pėdsakas
5.	Apiaceae	salieriniai	pėdsakas
6.	*Chaerophyllum* sp.	salieriniai	pėdsakas
7.	*Eryngium campestre*	salieriniai	antrinis, nežymus, pėdsakas
8.	*Pimpinella* sp.	salieriniai	pirminis, pėdsakas
9.	*Achillea* sp.	astriniai	nežymus, pėdsakas
10.	*Anthemis* sp.	astriniai	pėdsakas
11.	*Artemisia* sp.	astriniai	antrinis, pėdsakas
12.	*Carduus* sp.	astriniai	pėdsakas
13.	*Cichorium* sp.	astriniai	antrinis, nežymus, pėdsakas
14.	*Cirsium* spp.	astriniai	nežymus, pėdsakas
15.	*Cirsium yildizianum*	astriniai	antrinis, pėdsakas
16.	*Crepis* sp.	astriniai	antrinis, nežymus, pėdsakas
17.	*Echinops* sp.	astriniai	nežymus, pėdsakas
18.	*Gundelia* sp.	astriniai	pėdsakas
19.	*Helichrysum* sp.	astriniai	pirminis, antrinis, nežymus, pėdsakas
20.	*Leontodon* sp.	astriniai	pėdsakas
21.	*Onopordum* sp.	astriniai	pėdsakas
22.	*Ptilostemon* sp.	astriniai	pėdsakas
23.	*Senecio* sp.	astriniai	pėdsakas

24.	*Taraxacum* sp.	astriniai	nežymus, pėdsakas
25.	*Xanthium* sp.	astriniai	pėdsakas
26.	*Alkanna* sp.	agurkliniai	pėdsakas
27.	*Anchusa* sp.	agurkliniai	pėdsakas
28.	*Cerinthe minor*	agurkliniai	pėdsakas
29.	*Echium* sp.	agurkliniai	nežymus, pėdsakas
30.	*Myosotis* sp.	agurkliniai	nežymus, pėdsakas
31.	*Onosma* sp.	agurkliniai	pėdsakas
32.	*Campanula* sp.	katilėliniai	nežymus, pėdsakas
33.	*Campanula* sp.	katilėliniai	nežymus, pėdsakas
34.	*Cephalaria* sp.	sausmediniai	nežymus, pėdsakas
35.	*Dipsacus* sp.	sausmediniai	pėdsakas
36.	*Scabiosa* spp.	sausmediniai	pėdsakas
37.	*Valeriana* sp.	sausmediniai	pėdsakas
38.	*Dianthus* sp.	gvazdikiniai	nežymus
39.	*Saponaria* sp.	gvazdikiniai	pėdsakas
40.	*Silene* sp.	gvazdikiniai	pėdsakas
41.	*Caryophyllaceae* /*Amaranthaceae*	*Caryophyllaceae* / burnotiniai	antrinis, nežymus, pėdsakas
42.	*Chenopodium* sp.	balandiniai	nežymus, pėdsakas
43.	*Convolvulus* sp.	vijokliniai	antrinis, pėdsakas
44.	*Cornus* sp.	seduliniai	pėdsakas
45.	*Sedum* sp.	storlapiniai	nežymus
46.	*Eleagnus* sp.	žilakrūminiai	pėdsakas
47.	*Euphorbia* sp.	karpažoliniai	pėdsakas
48.	*Coronilla* sp.	pupiniai	nežymus, pėdsakas
49.	*Genista* sp.	pupiniai	pėdsakas
50.	*Hedysarum* sp.	pupiniai	nežymus, pėdsakas
51.	*Lathyrus* sp.	pupiniai	pėdsakas
52.	*Lotus* sp.	pupiniai	pirminis, antrinis, nežymus, pėdsakas
53.	*Medicago* sp.	pupiniai	nežymus
54.	*Melilotus* sp.	pupiniai	antrinis, nežymus, pėdsakas
55.	*Onobrychis* sp.	pupiniai	pėdsakas
56.	*Robinia pseudoacacia*	pupiniai	pėdsakas
57.	*Securigera* sp.	pupiniai	nežymus
58.	*Vicia* spp.	pupiniai	pėdsakas

59.	*Geranium* sp.	snaputiniai	pėdsakas
60.	notreliniai, lūpažiedžiai	notreliniai, lūpažiedžiai	nežymus, pėdsakas
61.	*Lamium macrodon*	notreliniai, lūpažiedžiai	antrinis, nežymus
62.	*Lamium* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	pirminis, antrinis, nežymus, pėdsakas
63.	*Marrubium* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	pėdsakas
64.	*Mentha* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	pėdsakas
65.	*Nepeta* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	pėdsakas
66.	*Origanum* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	nežymus, pėdsakas
67.	*Phlomis* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	nežymus, pėdsakas
68.	*Salvia* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	pėdsakas
69.	*Teucrium* sp.	notreliniai, lūpažiedžiai	nežymus, pėdsakas
70.	*Thymus* spp.	notreliniai, lūpažiedžiai	pėdsakas
71.	*Lythrum salicaria*	raudokliniai	nežymus, pėdsakas
72.	*Alcea* sp.	dedešviniai	pėdsakas
73.	*Malva* sp.	dedešviniai	pėdsakas
74.	*Tilia* sp.	dedešviniai	pėdsakas
75.	*Morus* sp.	šilkmediniai	pėdsakas
76.	*Epilobium* sp.	nakvišiniai	pėdsakas
77.	*Corydalis* sp.	aguoniniai	pėdsakas
78.	*Papaver* sp.	aguoniniai	pėdsakas
79.	*Linaria* sp.	gyslotiniai	nežymus, pėdsakas
80.	*Plantago lanceolata*	gyslotiniai	pirminis, antrinis, nežymus, pėdsakas
81.	*Acantholimon* sp.	pliumbaginiai	pėdsakas
82.	*Polygala* sp.	putokšliniai	pėdsakas
83.	*Polygonum* sp.	rūgtiniai	pėdsakas
84.	*Rheum* sp.	rūgtiniai	pėdsakas
85.	*Rumex* sp.	rūgtiniai	pėdsakas
86.	*Portulaca* sp.	portulakiniai	pėdsakas
87.	*Lysimachia* sp.	raktažoliniai	pėdsakas
88.	*Ranunculus* sp.	vėdryniniai	pėdsakas
89.	*Paliurus spina christi*	šunobeliniai, šaltekšniniai	pėdsakas
90.	*Cerasus* sp.	erškėtiniai	pėdsakas
91.	*Filipendula* sp.	erškėtiniai	nežymus, pėdsakas
92.	*Fragaria* sp.	erškėtiniai	pėdsakas
93.	*Potentilla* sp.	erškėtiniai	antrinis, nežymus, pėdsakas

94.	*Prunus* sp.	erškėtiniai	pėdsakas
95.	*Pyrus* sp.	erškėtiniai	pėdsakas
96.	*Rosa canina*	erškėtiniai	nežymus, pėdsakas
97.	Rosaceae	erškėtiniai	antrinis, nežymus, pėdsakas
98.	*Rubus* sp.	erškėtiniai	pėdsakas
99.	*Sanguisorba* sp.	erškėtiniai	nežymus, pėdsakas
100.	*Galium* sp.	raudiniai	nežymus, pėdsakas
101.	*Citrus* sp.	rūtiniai	nežymus, pėdsakas
102.	*Salix* sp.	gluosniniai	nežymus, pėdsakas
103.	*Verbascum* spp.	bervidiniai	pirminis, antrinis, nežymus, pėdsakas
104.	*Eremurus* sp.	plėnūniniai	pėdsakas

3.3. *Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavinės medžiagos (taikoma tik perdirbtiems produktams)*

—

3.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

Visi gamybos, perdirbimo ir paruošimo etapai turi vykti nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.5. *Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės*

Medus parduodamas stikliniuose stiklainiuose, kurių masė ne didesnė kaip 1 kg.

Bičių korių medus parduodamas stačiakampėse, kvadratinėse arba lakuotuose 3–5 kg talpos pakuotėse, tinkamomis liestis su maistu.

Parduodamas medus turi būti saugomas nuo tiesioginių saulės spindulių ir laikomas švariose, sausose ir neturinčiose kvapų patalpose, kurių vidaus temperatūra neviršija 20 C.

3.6. *Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

Ant produkto pakuotės turi būti pavadinimas „Bingöl Balı“ ir vienas iš šių „Bingöl Balı“ logotipų:





4. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Nustatyta geografinė vietovė apima visus kaimus ir miestus, esančius Turkijos Rytų Anatolijos Bingelo provincijoje.

5. **Ryšys su geografine vietove**

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Bingöl Balı“ įregistravimo paraiška grindžiama tik specifine produkto kokybe ir savybėmis, kurias lemia geografinės vietovės gamtiniai ir žmogiškieji veiksniai.

Geografinės vietovės ypatumai

Bingelo provinciją supa kalnai. Pagrindiniai morfologiniai vienetai yra visoje provincijoje skirtinguose kalnų vietovių aukščiuose išsidėsčiusios vulkaninės plynaukštės, kalnuotas vietoves kertantys ir ant geologinių sprūdžių upelių suformuoti slėniai, lygumos ir įdubos, atsiradę dėl kalnų masių tektoninio aktyvumo. Nedideliais atstumais besikeičiantis aukštis ir reljefo formos lemia topografijos, klimato elementų ir augmenijos įvairovę.

Dėl metinio kritulių kiekio ir didelio saulėtų dienų skaičiaus Bingelo geografinėje vietovėje vyrauja labai įvairi augmenija. Miškuose daugiausiai auga ąžuolai (*Quercus petraea subsp. pinnatiloba* (K. Koch) *Menitsky* ir *Quercus libani Oliv.*). Stepių plotuose plačiai paplitusios šios kulkšnių rūšys: *Astragalus muschianus Kotschy & Boiss. ex Boiss.* ir *Astragalus gummifer Labill.*

Kadangi plynaukštės išsidėsčiusios vidutiniškai 1 500–2 000 m aukštyje, ten vasaros yra vėsios, o augalų žydėjimo laikotarpis ilgesnis. Tai sudaro sąlygas natūraliems lizdams, kurie gali būti naudojami nuo birželio iki spalio mėn. bitininkystės veiklai. Tai taip pat suteikia bitininkystei tinkamas apsaugotas vietines teritorijas.

Bingele nėra sunkiosios pramonės įmonių, todėl dirvožemis ir vandens ištekliai išliko švarūs.

Produkto ypatumai

Bingelo provincija yra svarbi vieta bitininkystei užsiimti dėl savo vietos, gamtinių sąlygų ir produkcijos vertės. Bingelas yra Irano ir Turkijos augalijos regione į rytus nuo Anatolijos diagonalės, kurios topografija skiriasi, palyginti su platesniu regionu ir šalimi, ir turi didelį bitininkystės potencialą dėl savo turtingos floristinės įvairovės ir įvairių žydėjimo laikotarpių. Dėl šios priežasties Bingelo provincija pasižymi labai įvairia augmenija ir dideliu endeminių rūšių skaičiumi. Joje yra apie 1 700 augalų rūšių, iš kurių 300 – endeminės. Be to, atlikus melisopalinologinę analizę, daugiau kaip 200 augalų taksonų buvo užregistruoti kaip bitėms tinkami augalai. Šių bitėms tinkamų augalų pagrindinės šeimos yra šios: astrinių (lot. *Asteraceae*), pupinių (lot. *Fabaceae*) ir jonažolinių (lot. *Hypericaceae*). Šią augalų įvairovę akivaizdžiai atspindi SKVN „Bingöl Balı“ žymimo medaus botaninė kilmė.

Botaniniu požiūriu „Bingöl Balı“ būdingas didelis žiedadulkių kiekis, įskaitant iš bent vieno toliau nurodyto susijusio taksono: *Astragalus sp.* (kulkšnės), *Centaurea sp.* (bajorės), *Hypericum sp.* (jonažolės), *Trifolium sp.* (dobilai) ir *Xeranthemum sp.* (sausiukai), taip pat iš kai kurių 2 lentelės 3.2 punkte nurodytų žiedadulkių.

Žmogiškieji veiksniai

Bitininkystė, kuria jau daugelį metų užsiimama Bingelo provincijoje, yra svarbus šios geografinės vietovės pajamų šaltinis.

Bitininkystės veikla dažniausiai vykdoma sezoniškai avilius perkeliant į naujas vietas. Bitininkų veikla prasideda kovo mėn. pradžioje, žiemą bičių šeimos yra globojamos ir maitinamos, taip pat prižiūrima bičių motinėlė. Šis pasirengimas sezonui tęsiasi iki gegužės vidurio. Gegužės mėnesį bitininkai gali perkelti savo bites į kitą geografinės vietovės vietą, priklausomai nuo susikaupusio nektaro kiekio.

Sprendimas keisti bičių vietą daugiausiai yra susijęs su vietovės aukštingumu. Augalija tampa skurdesnė 1 100 m ir didesniame aukštyje, todėl bitės skrenda į 1 900 m ir aukštesnes vietas, už 3–4 km nuo avilių, link natūralių vandens šaltinių, į vietas, kur gausu nektaro ir žiedadulkių.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

—