C/2024/1989

12.3.2024.

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

(C/2024/1989)

Šī publikācija dod tiesības trīs mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas pret pieteikumu izteikt iebildumus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 ([1]) 51. pantam.

VIENOTAIS DOKUMENTS

“Bingöl Balı”

ES Nr.: PDO-TR-02886 – 5.1.2023.

ACVN (x) AĢIN ( )

1. **Nosaukums vai nosaukumi**

“Bingöl Balı”

2. **Dalībvalsts vai trešā valsts**

Turcija

3. **Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts**

3.1. *Produkta veids*

1.4. grupa. Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu, u. c.)

3.2. *Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums*

“Bingöl Balı” ir dažādu ziedu medus, ko iegūst 4. punktā norādītajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Tas var būt gaišā līdz tumšā dzintarkrāsā. To tirgo šūnu medus un izsviesta medus veidā. Medu ievāc *Apis mellifera anatoliaca*, *A. mellifera caucasica* un *A. mellifera meda* šķirņu un to hibrīdu bites.

“Bingöl Balı” piemīt šādas palinoloģiskās īpašības:

i) ziedputekšņu sastāvā vajadzētu būt putekšņiem no vismaz viena no radniecīgajiem taksoniem *Astragalus* sp. (tragantzirņi), *Centaurea* sp. (dzelzenes), *Hypericum* sp. (asinszāles), *Trifolium* sp. (āboliņi) un *Xeranthemum* sp. (sausziedes),

ii) ziedputekšņiem būtu jāatbilst arī 2. tabulā uzskaitīto augu putekšņu spektram (medū nav vienmēr jābūt visu uzskaitīto taksonu ziedputekšņiem).

1. tabula.

“Bingöl Balı” fizikālķīmiskās īpašības

Īpašība	Vērtība
Mitrums (%, maks.)	18 %
Saharoze (g/100 g, maks.)	3 g/100 g
Fruktoze un glikoze kopā (g/100 g, min.)	65 g/100 g
Fruktozes un glikozes attiecība	1,00–1,30
Maltoze (%, maks.)	4 %

([1]) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Ūdenī nešķīstošas vielas (g/100 g, maks.)	0,1 g/100 g
Brīvās skābes (mekv./kg, maks.)	40 mekv./kg
Elektrovadītspēja (mS/cm, maks.)	0,8 mS/cm
Diastāžu skaits (min.)	15
Hidroksimetilfurfurols (HMF) (mg/kg, maks.)	20 mg/kg
$\delta^{13} C_{medus}$	– 23 vai zemāka
$\delta^{13} C_{proteīns} - \delta^{13} C_{medus}$	– 1,0 vai augstāka
$C_{4\ cukuri}$ (maks.)	7 %
Prolīns (mg/kg, min.)	450

2. tabula.

Bingöl Balı" melisopalinoloģiskās īpašības

	Taksons	Dzimta	Ziedputekšņu saturs (dominējoši: ≥ 45 %, sekundāri: 16–44 %, maz: 3–15 %, ļoti maz: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	maz, ļoti maz
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	maz, ļoti maz
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	maz, ļoti maz
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	maz, ļoti maz
5.	Apiaceae	Apiaceae	ļoti maz
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	ļoti maz
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	sekundāri, maz, ļoti maz
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	dominējoši, ļoti maz
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	maz, ļoti maz
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	ļoti maz
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	sekundāri, ļoti maz
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	ļoti maz
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	sekundāri, maz, ļoti maz
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	maz, ļoti maz
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	sekundāri, ļoti maz
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	sekundāri, maz, ļoti maz
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	maz, ļoti maz
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	ļoti maz
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	dominējoši, sekundāri, maz, ļoti maz
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	ļoti maz
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	ļoti maz
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	ļoti maz
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	ļoti maz

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	maz, ļoti maz
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	ļoti maz
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	ļoti maz
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	ļoti maz
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	ļoti maz
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	maz, ļoti maz
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	maz, ļoti maz
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	ļoti maz
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	maz, ļoti maz
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	maz, ļoti maz
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	maz, ļoti maz
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	ļoti maz
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	ļoti maz
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	ļoti maz
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	maz
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	ļoti maz
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	ļoti maz
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	sekundāri, maz, ļoti maz
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	maz, ļoti maz
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	sekundāri, ļoti maz
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	ļoti maz
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	maz
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	ļoti maz
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	ļoti maz
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	maz, ļoti maz
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	ļoti maz
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	maz, ļoti maz
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	ļoti maz
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	dominējoši, sekundāri, maz, ļoti maz
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	maz
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	sekundāri, maz, ļoti maz
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	ļoti maz
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	ļoti maz
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	maz
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	ļoti maz

59.	*Geranium* sp.	Geraniaceae	ļoti maz
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	maz, ļoti maz
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	sekundāri, maz
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	dominējoši, sekundāri, maz, ļoti maz
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	ļoti maz
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	ļoti maz
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	ļoti maz
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	maz, ļoti maz
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	maz, ļoti maz
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	ļoti maz
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	maz, ļoti maz
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	ļoti maz
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	maz, ļoti maz
72.	*Alcea* sp.	Malvaceae	ļoti maz
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	ļoti maz
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	ļoti maz
75.	*Morus* sp.	Moraceae	ļoti maz
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	ļoti maz
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	ļoti maz
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	ļoti maz
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	maz, ļoti maz
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	dominējoši, sekundāri, maz, ļoti maz
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	ļoti maz
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	ļoti maz
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	ļoti maz
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	ļoti maz
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	ļoti maz
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	ļoti maz
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	ļoti maz
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	ļoti maz
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	ļoti maz
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	ļoti maz
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	maz, ļoti maz
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	ļoti maz
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	sekundāri, maz, ļoti maz

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	ļoti maz
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	ļoti maz
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	maz, ļoti maz
97.	Rosaceae	Rosaceae	sekundāri, maz, ļoti maz
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	ļoti maz
99.	*Sanguisorba* maz	Rosaceae	maz, ļoti maz
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	maz, ļoti maz
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	maz, ļoti maz
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	maz, ļoti maz
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	dominējoši, sekundāri, maz, ļoti maz
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	ļoti maz

3.3. *Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)*

—

3.4. *Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā*

Visiem ražošanas, pārstrādes un sagatavošanas posmiem jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.5. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi*

Medu pārdod stikla burkās, kuru ietilpība nepārsniedz 1 kg.

Šūnu medu pārdod taisnstūrveida, kvadrātveida vai lakotā iepakojumā, kura ietilpība ir 3–5 kg un kurš piemērots saskarei ar pārtiku.

Pārdošanā laistais medus jāsargā no tiešiem saules stariem un jāuzglabā tīrā un sausā vietā, kurā temperatūra nepārsniedz 20 °C un nav smaku.

3.6. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi*

Uz produkta iepakojuma jābūt nosaukumam "Bingöl Balı" un vienam no zemāk redzamajiem "Bingöl Balı" logotipiem.





4. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals aptver visus ciematus un pilsētas, kas pieder pie Bingelas [*Bingöl*] ila, kurš atrodas Anatolijas austrumu daļā Turcijā.

5. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Cilmes vietas nosaukuma "Bingöl Balı" reģistrācijas pieteikumu pilnā mērā pamato produkta īpašā kvalitāte un īpašības, kas izriet no ģeogrāfiskā apgabala dabas faktoriem un cilvēkfaktoriem.

Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Bingelas ilu ieskauj kalni. Galvenie morfoloģiskie elementi ir dažādā augstumā esošās vulkānisko iežu plakankalnes, kas atrodas ila kalnainajos apvidos, ielejas, ko izveidojušas ūdensteces, kuras iegrauzušās kalnainajos apvidos un iegulušas dziļlūzumos, un līdzenumi un baseini, kas izveidojušies kalnu masīvu tektoniskās aktivitātes rezultātā. Augstums virs jūras līmeņa un reljefs, kas strauji mainās, rada atšķirības topogrāfijas, klimata un augāja ziņā.

Gada nokrišņu daudzums un lielais saulaino dienu skaits Bingelas ģeogrāfiskajā apgabalā nodrošina bagātīgu augu valsti. Meža platībās dominē ozoli (*Quercus petraea* subsp. *pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky un *Quercus libani* Oliv.). Stepēs vērojama *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. un *Astragalus gummifer* Labill. sugu tragantziņu pārpilnība.

Tā kā plakankaļņu vidējais augstums ir 1 500–2 000 m, vasaras periods ir vēss un ziedēšanas periods ir garāks. Tāpēc veidojas dabiskas ligzdošanas teritorijas, kuras no jūnija līdz oktobrim var izmantot biškopības darbībām. Tāpat biškopībai ir pieejamas arī pasargātas vietas.

Tā kā Bingelā nav smagās rūpniecības uzņēmumu, tajā ir saglabājusies tīra augsne un ūdens.

Produkta specifika

Bingelas ilam ir nozīmīga vieta biškopībā, ņemot vērā tā atrašanās vietu, dabas apstākļus un ražošanas apjomus. Bingela atrodas Anatolijas diagonāles austrumos, Irānas-Turānas augu valsts reģionā, tai raksturīgā topogrāfija atšķiras salīdzinājumā ar plašākā reģiona un valsts topogrāfiju, un, pateicoties tās lielajai augu valsts daudzveidībai un plašajam ziedēšanas laiku diapazonam, tai piemīt liels biškopības potenciāls. Šā iemesla dēļ Bingelas ilā ir ļoti daudzveidīga augu valsts, kas ir lielā mērā endēmiska. Bingelā ir aptuveni 1 700 augu sugu, no kurām 300 ir endēmiskas sugas. Turklāt pēc melisopalinoloģisko analīžu veikšanas kā "bišu augi" ir reģistrēti vairāk nekā 200 taksoni. Šie bišu augi lielākoties pieder pie *Asteraceae* (kurvjziežu), *Fabaceae* (tauriņziežu) un *Hypericaceae* (asinszāļu) dzimtas. Šo augu daudzveidību acīmredzami atspoguļo produkta "Bingöl Balı" botāniskā izcelsme.

No botāniskā aspekta raugoties, "Bingöl Balı" ir raksturīgs bagātīgs ziedputekšņu saturs, kuru veido ziedputekšņi no vismaz viena no šādiem radniecīgiem taksoniem: *Astragalus* sp. (tragantziņi), *Centaurea* sp. (dzelzenes), *Hypericum* sp. (asinszāles), *Trifolium* sp. (āboliņi) un *Xeranthemum* sp. (sausziedes), un dažu 3.2. punkta 2. tabulā uzskaitīto taksonu ziedputekšņi.

Cilvēkfaktori

Biškopības darbības, kas Bingelas ilā tiek veiktas jau daudzus gadus, ir nozīmīgs ģeogrāfiskā apgabala ienākumu avots.

Biškopība galvenokārt notiek ceļojošās dravniecības veidā. Ziemā biškopji aprūpē un piebaro bišu saimes un aprauga bišu māti, bet marta sākumā sāk sagatavošanas darbus. Šie sagatavošanas darbi turpinās līdz maija vidum. Maijā biškopji savas bites var pārvietot ģeogrāfiskā apgabala robežās atkarībā no nektāra daudzuma.

Stropu atrašanās vietas maiņa ir atkarīga galvenokārt no augstuma v. j. l. Kad vietās, kas atrodas 1 100 m v. j. l., veģetācijas daudzums samazinās, bites tiek pārvietotas uz vietām, kas atrodas 1 900 m v. j. l. un lielākā augstumā, 3–4 km attālumā no apdzīvotām vietām, tuvāk dabiskiem ūdens avotiem un apvidiem, kuros ir nektāra un ziedputekšņu pārpilnība.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

—