C/2024/1989

12.3.2024

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(C/2024/1989)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad [1] binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

"Bingöl Balı"

EU-nr.: PDO-TR-02886 – 5.1.2023

BOB (X) BGA ( )

1. **Naam/namen**

"Bingöl Balı"

2. **Lidstaat of derde land**

Turkije

3. **Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel**

3.1. *Productcategorie*

Categorie 1.4. Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten met uitzondering van boter enz.)

3.2. *Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is*

"Bingöl Balı" is bloemenhoning uit het in punt 4 omschreven geografische gebied. De honing is licht tot donker amberkleurig. Het product wordt in de handel gebracht als raathoning en slingerhoning. Voor de productie worden de bijenrassen *Apis mellifera anatoliaca*, *A. mellifera caucasica*, *A. mellifera meda* en hybriden daarvan gebruikt.

"Bingöl Balı" heeft de volgende melissopalinologische kenmerken:

i) de pollen moeten ten minste een van de verwante taxa *Astragalus* sp. (hokjespeul), *Centaurea* sp. (knoopkruid), *Hypericum* sp. (hertshooi), *Trifolium* sp. (klaver) en *Xeranthemum* sp. (immortelle of strobloem) bevatten;

ii) de pollen moeten ook voldoen aan het in tabel 2 vermelde pollenspectrum (niet alle in de lijst vermelde pollentaxa hoeven tegelijkertijd aanwezig te zijn).

Tabel 1

Fysisch-chemische kenmerken van "Bingöl Balı"

Kenmerk	Waarde
Vochtgehalte (%; max.)	18 %
Sacharosegehalte (g/100 g; max.)	3 g/100 g
Gehalte aan fructose en glucose (g/100 g; min.)	65 g/100 g
Fructose/glucose	1,00-1,30
Maltosegehalte (%; max.)	4 %

[1] PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Gehalte aan niet in water oplosbare stoffen (g/100 g; max.)	0,1 g/100 g
Vrije zuren (meq/kg; max.)	40 meq/kg
Elektrisch geleidingsvermogen (mS/cm; max.)	0,8 mS/cm
Aantal diastasen (min.)	15
Gehalte aan hydroxymethylfurfural (HMF) (mg/kg; max.)	20 mg/kg
$\delta^{13} C_{honing}$	- 23 of lager
$\delta^{13}C_{proteïne} - \delta^{13}C_{honing}$	– 1,0 of hoger
C4-suiker (max.)	7 %
Prolinegehalte (mg/kg; min.)	450

Tabel 2

Melissopalinologische kenmerken van "Bingöl Balı"

	Taxon	Familie	Stuifmeelgehalte (primair: ≥ 45 %, secundair: 16-44 %, gering: 3-15 %, sporen: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Gering, sporen
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Gering, sporen
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Gering, sporen
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Gering, sporen
5.	Apiaceae	Apiaceae	Sporen
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	Sporen
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Secundair, gering, sporen
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Primair, sporen
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Gering, sporen
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	Sporen
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Secundair, sporen
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	Sporen
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Secundair, gering, sporen
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Gering, sporen
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Secundair, sporen
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Secundair, gering, sporen
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Gering, sporen
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	Sporen
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Primair, secundair, gering, sporen
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	Sporen
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	Sporen
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	Sporen
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	Sporen

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Gering, sporen
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	Sporen
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	Sporen
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	Sporen
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	Sporen
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Gering, sporen
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Gering, sporen
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	Sporen
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Gering, sporen
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Gering, sporen
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Gering, sporen
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	Sporen
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	Sporen
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	Sporen
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Gering
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	Sporen
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	Sporen
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Secundair, gering, sporen
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Gering, sporen
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Secundair, sporen
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	Sporen
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Gering
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	Sporen
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Sporen
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Gering, sporen
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	Sporen
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Gering, sporen
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	Sporen
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Primair, secundair, gering, sporen
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Gering
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Secundair, gering, sporen
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	Sporen
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	Sporen
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Gering
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	Sporen

59.	*Geranium* sp.	Geraniaceae	Sporen
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Gering, sporen
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Secundair, gering
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Primair, secundair, gering, sporen
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	Sporen
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	Sporen
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	Sporen
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Gering, sporen
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Gering, sporen
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	Sporen
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Gering, sporen
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	Sporen
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Gering, sporen
72.	*Alcea* sp.,	Malvaceae	Sporen
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	Sporen
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	Sporen
75.	*Morus* sp.	Moraceae	Sporen
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	Sporen
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	Sporen
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	Sporen
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Gering, sporen
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Primair, secundair, gering, sporen
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	Sporen
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	Sporen
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	Sporen
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	Sporen
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	Sporen
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	Sporen
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	Sporen
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	Sporen
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	Sporen
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	Sporen
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Gering, sporen
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	Sporen
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Secundair, gering, sporen

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	Sporen
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	Sporen
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Gering, sporen
97.	Rosaceae	Rosaceae	Secundair, gering, sporen
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	Sporen
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	Gering, sporen
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Gering, sporen
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Gering, sporen
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Gering, sporen
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Primair, secundair, gering, sporen
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	Sporen

3.3. *Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)*

—

3.4. *Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden*

Alle stadia van de productie, de verwerking en de bereiding moeten in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

3.5. *Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

De honing wordt verkocht in glazen potten van maximaal 1 kg.

De raathoning wordt verkocht in een rechthoekige, vierkante of gelakte verpakking van 3-5 kg die geschikt is om met levensmiddelen in contact te komen.

De in de handel gebrachte honing moet beschermd zijn tegen direct zonlicht en worden opgeslagen op een schone, droge plaats met een binnentemperatuur van maximaal 20 °C, vrij van geuren.

3.6. *Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

De naam “Bingöl Balı” en een van de volgende logo’s van “Bingöl Balı” moeten op de verpakking van het product worden aangebracht.





4. **Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied**

Het afgebakende geografische gebied omvat alle dorpen en steden in de provincie Bingöl in Oost-Anatolië in Turkije.

5. **Verband met het geografische gebied**

De aanvraag tot registratie van de oorsprongsbenaming “Bingöl Balı” is louter gebaseerd op de bijzondere kwaliteit en kenmerken van het product, die het gevolg zijn van de natuurlijke en menselijke factoren in het geografische gebied.

Specificiteit van het geografische gebied

De provincie Bingöl is omringd door bergen. De belangrijkste morfologische eenheden zijn vulkanische plateaus op verschillende hoogten in de berggebieden in de hele provincie, valleien gevormd door stromen die de berggebieden doorsnijden en op breuklijnen liggen, en vlakten en bekkens gevormd door tektonische activiteit onder de bergmassieven. Doordat de hoogte en landvormen over korte afstanden variëren, is er sprake van verscheidenheid in topografie, klimaatelementen en vegetatie.

Door de jaarlijkse neerslag en het grote aantal zonnige dagen in Bingöl heeft het geografische gebied een rijke flora. De bosgebieden zijn overwegend bedekt met eiken (*Quercus petraea* subsp. *pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky en *Quercus libani* Oliv.). In steppegebieden zijn de hokjespeulsoorten *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. en *Astragalus gummifer* Labill. in overvloed aanwezig.

Omdat de gemiddelde hoogte van de plateaus 1 500-2 000 m bedraagt, is de zomerperiode koel en is de bloeiperiode lang. Daardoor zijn er natuurlijke nestplaatsen, die van juni tot oktober kunnen worden gebruikt voor de bijenteelt. Ook zijn daar beschutte lokale gebieden voor de bijenteelt.

Omdat er in Bingöl geen zware industrie is, blijven de bodem en de watervoorraden schoon.

Specificiteit van het product

De provincie Bingöl neemt voor de bijenteelt een belangrijke plaats in wat de ligging, de natuurlijke omstandigheden en de productiewaarden ervan betreft. Bingöl ligt in het oosten van de Anatolische diagonaal in de Iraans-Toeranische bloemenregio, heeft een topografie die zich onderscheidt van die elders in de regio en het land, en biedt grote mogelijkheden voor de bijenteelt vanwege de grote floristische diversiteit en uiteenlopende bloeiperioden. De provincie Bingöl heeft dan ook een rijke diversiteit aan planten en veel endemische soorten. Er komen ongeveer 1 700 plantensoorten voor, waarvan er 300 endemisch zijn in Bingöl. Daarnaast zijn bij melissopalinologische analysen meer dan 200 plantentaxa als drachtplanten geregistreerd. De voornaamste plantenfamilies bij deze drachtplanten zijn Asteraceae (composietenfamilie), Fabaceae (vlinderbloemenfamilie) en Hypericaceae (hertshooifamilie). Deze floristische diversiteit komt duidelijk tot uiting in de botanische oorsprong van "Bingöl Balı".

Botanisch gezien wordt "Bingöl Balı" gekenmerkt door een rijk pollengehalte, met ten minste een van de verwante taxa *Astragalus* sp. (hokjespeul), *Centaurea* sp. (knoopkruid), *Hypericum* sp. (hertshooi), *Trifolium* sp. (klaver) en *Xeranthemum* sp. (immortelle of strobloem) en enkele van de in tabel 2 van punt 3.2 vermelde pollen.

Menselijke factoren

De bijenteelt, die al vele jaren in de provincie Bingöl plaatsvindt, vormt een belangrijke bron van inkomsten voor het geografische gebied.

Bij deze vorm van bijenteelt worden de bijenkasten doorgaans verplaatst. Begin maart starten de bijenhouders met de verzorging en voedering van de bijenkolonies en met de werkzaamheden rond de bijenkoningin. Deze voorbereiding loopt tot medio mei. Bijenhouders kunnen hun bijen in mei naar een andere locatie binnen het geografische gebied overbrengen, afhankelijk van de hoeveelheid nectar die wordt aangemaakt.

De nieuwe locatie van de bijen hangt voornamelijk af van de hoogte. Omdat de vegetatie vanaf een hoogte van 1 100 m schaarser wordt, gaan de bijen naar 1 900 m en hoger, 3-4 km weg van de woongebieden, richting natuurlijke waterbronnen en gebieden waar volop nectar en stuifmeel worden aangemaakt.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

—