C/2024/1989

12.3.2024

Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

(C/2024/1989)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]), în termen de trei luni de la data prezentei publicări.

DOCUMENT UNIC

„Bingöl Balı”

Nr. UE: PDO-TR-02886 – 5.1.2023

DOP (x) IGP ( )

1. **Denumirea (Denumirile)**

„Bingöl Balı”

2. **Statul membru sau țara terță**

Turcia

3. **Descrierea produsului agricol sau alimentar**

3.1. *Tipul de produs*

Clasa 1.4. Alte produse de origine animală (ouă, miere, produse lactate cu excepția untului etc.)

3.2. *Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1*

Produsul „Bingöl Balı” este mierea polifloră obținută din aria geografică delimitată în secțiunea 4. Culoarea sa poate varia de la chihlimbariu-deschis la chihlimbariu-închis. Se comercializează sub formă de fagure și de miere extrasă. În procesul de producție, se utilizează rasele de albine *Apis mellifera* anatoliaca, *A. mellifera* caucasica, *A. mellifera* meda și hibrizii acestora.

Caracteristicile polenului din mierea „Bingöl Balı” sunt următoarele.

i) Polenul ar trebui să includă cel puțin unul dintre taxonii conecși *Astragalus* sp. (tragacant), *Centaurea* sp. (țintaură), *Hypericum* sp. (sunătoare), *Trifolium* sp. (trifoi) și *Xeranthemum* sp. (plevaiță);

ii) De asemenea, polenul ar trebui să respecte spectrul de polen indicat în tabelul 2 (nu este necesar să fie prezenți împreună toți taxonii din care se obține polenul enumerați).

Tabelul 1

Caracteristicile fizico-chimice ale mierii „Bingöl Balı”

Caracteristică	Valoare
Umiditate (% max.)	18 %
Zaharoză (g/100 g; max.)	3 g/100 g
Fructoză + glucoză (g/100 g; min.)	65 g/100 g
Fructoză/glucoză	1,00-1,30
Maltoză (% max.)	4 %

([1]) JO L 343, 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Substanță insolubilă în apă (g/100 g; max.)	0,1 g/100 g
Aciditate liberă (meq/kg; max.)	40 meq/kg
Conductivitate electrică (mS/cm; max.)	0,8 mS/cm
Număr de diastaze (min.)	15
HMF (mg/kg; max.)	20 mg/kg
$\delta^{13}C_{miere}$	cel mult - 23
$\delta^{13}C_{proteine} - \delta^{13}C_{miere}$	cel puțin – 1,0
$C_{4\ zaharuri}$ (max.)	7 %
Prolină (mg/kg; min.)	450

Tabelul 2

Caracteristicile melisopalinologice ale mierii „Bingöl Balı”

	Taxon	Familie	Conținut de polen (primar: ≥ 45 %, secundar: 16-44 %, minor: 3-15 %, urme: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Minor, urme
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Minor, urme
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Minor, urme
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Minor, urme
5.	Apiaceae	Apiaceae	Urme
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	Urme
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Secundar, minor, urme
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Primar, urme
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Minor, urme
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	Urme
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Secundar, urme
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	Urme
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Secundar, minor, urme
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Minor, urme
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Secundar, urme
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Secundar, minor, urme
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Minor, urme
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	Urme
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Primar, secundar, minor, urme
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	Urme
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	Urme
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	Urme
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	Urme

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Minor, urme
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	Urme
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	Urme
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	Urme
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	Urme
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Minor, urme
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Minor, urme
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	Urme
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Minor, urme
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Minor, urme
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Minor, urme
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	Urme
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	Urme
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	Urme
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Minor
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	Urme
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	Urme
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Secundar, minor, urme
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Minor, urme
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Secundar, urme
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	Urme
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Minor
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	Urme
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Urme
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Minor, urme
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	Urme
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Minor, urme
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	Urme
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Primar, secundar, minor, urme
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Minor
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Secundar, minor, urme
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	Urme
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	Urme
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Minor
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	Urme

59.	*Geranium* sp.	Geraniaceae	Urme
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Minor, urme
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Secundar, minor
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Primar, secundar, minor, urme
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	Urme
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	Urme
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	Urme
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Minor, urme
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Minor, urme
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	Urme
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Minor, urme
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	Urme
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Minor, urme
72.	*Alcea* sp.	Malvaceae	Urme
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	Urme
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	Urme
75.	*Morus* sp.	Moraceae	Urme
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	Urme
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	Urme
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	Urme
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Minor, urme
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Primar, secundar, minor, urme
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	Urme
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	Urme
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	Urme
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	Urme
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	Urme
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	Urme
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	Urme
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	Urme
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	Urme
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	Urme
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Minor, urme
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	Urme
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Secundar, minor, urme

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	Urme
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	Urme
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Minor, urme
97.	Rosaceae	Rosaceae	Secundar, minor, urme
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	Urme
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	Minor, urme
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Minor, urme
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Minor, urme
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Minor, urme
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Primar, secundar, minor, urme
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	Urme

3.3. *Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)*

—

3.4. *Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată*

Toate etapele de producție, de prelucrare și de pregătire trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată.

3.5. *Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. ale produsului la care se referă denumirea înregistrată*

Mierea este comercializată în borcane de sticlă de maximum 1 kg.

Fagurii cu miere sunt comercializați în ambalaje dreptunghiulare, pătrate sau lăcuite de 3-5 kg, adecvate pentru a veni în contact cu produsele alimentare.

Mierea pusă în vânzare trebuie să fie protejată împotriva luminii solare directe și depozitată în locuri curate și uscate, cu o temperatură de maximum 20 °C în interior și lipsite de mirosuri.

3.6. *Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată*

Denumirea „Bingöl Balı” și unul dintre următoarele logouri ale „Bingöl Balı” trebuie să figureze pe ambalajul produsului.





4. **Delimitarea concisă a ariei geografice**

Aria geografică delimitată acoperă toate satele și orașele care aparțin provinciei Bingöl din Anatolia de Est din Turcia.

5. **Legătura cu aria geografică**

Cererea de înregistrare a denumirii de origine „Bingöl Balı” se bazează exclusiv pe calitatea și pe caracteristicile specifice ale produsului, care sunt rezultatul factorilor naturali și umani prezenți în aria geografică.

Specificitatea ariei geografice

Provincia Bingöl este înconjurată de munți. Principalele unități morfologice sunt platourile vulcanice aflate la diferite altitudini în zonele montane din întreaga provincie, văile formate de râuri care străbat zonele montane și se așază în falii și câmpiile și bazinele formate ca urmare a activității tectonice între masele montane. Datorită faptului că altitudinile și formele de relief se schimbă la distanțe mici, topografia, elementele climatice și vegetația sunt caracterizate de diversitate.

Precipitațiile anuale și numărul mare de zile însorite din provincia Bingöl fac ca flora ariei geografice să fie bogată. Stejarii [*Quercus petraea subsp. pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky și *Quercus libani Oliv.]* reprezintă specia predominantă în zonele forestiere. În zonele de stepă, sunt abundente speciile de tragacant *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. și *Astragalus gummifer Labill.*

Deoarece altitudinea medie a platourilor este de 1 500-2 000 m, perioada verii este răcoroasă, iar perioada de înflorire este prelungită. Prin urmare, se formează zone naturale pentru construirea cuiburilor, care pot fi utilizate din iunie până în octombrie pentru a găzdui activitățile apicole. De asemenea, se obțin astfel zone locale adăpostite pentru apicultură.

Datorită absenței întreprinderilor din sectorul industriei grele în Bingöl, solul și resursele de apă rămân curate.

Specificitatea produsului

Provincia Bingöl ocupă un loc important pentru activitățile apicole din punctul de vedere al amplasării, al condițiilor naturale și al valorilor de producție. Bingöl se află la est de linia diagonală anatoliană, în regiunea de floră iraniano-turaniană, prezentând o topografie distinctă comparativ cu cea a regiunii în ansamblu și cea de la nivel național, și are un potențial uriaș pentru apicultură, datorită bogatei sale diversități floristice și gamei largi de perioade de înflorire. Din acest motiv, provincia Bingöl are o bogată diversitate vegetală și prezintă o rată ridicată de endemism. Sunt prezente aproximativ 1 700 de specii de plante, dintre care 300 sunt endemice pentru Bingöl. În plus, peste 200 de taxoni vegetali au fost înregistrați ca plante apicole cu analize melisopalinologice. Dintre aceste plante apicole, principalele familii de plante sunt Asteraceae (familia margaretelor), Fabaceae (familia leguminoaselor) și Hypericaceae (familia sunătoarelor). Această diversitate florală se reflectă în mod evident în originea botanică a mierii „Bingöl Balı".

Din punct de vedere botanic, mierea „Bingöl Balı" se caracterizează prin conținutul său bogat de polen, inclusiv prin prezența a cel puțin unuia dintre taxonii conecși *Astragalus* sp. (tragacant), *Centaurea* sp. (țintaură), *Hypericum* sp. (sunătoare), *Trifolium* sp. (trifoi) și *Xeranthemum* sp. (plevaiță) și a unora dintre tipurile de polen indicate în tabelul 2 de la punctul 3.2.

Factorul uman

Activitățile apicole desfășurate de mulți ani în provincia Bingöl reprezintă o sursă importantă de venit pentru aria geografică.

Activitățile apicole se desfășoară în cea mai mare parte sub forma transhumanței apicole. Activitățile apicultorilor încep în prima parte a lunii martie, cu îngrijirea și hrănirea coloniilor de albine în timpul iernii și controlarea mătcii. Această pregătire continuă până la jumătatea lunii mai. Apicultorii pot muta albinele într-o altă locație din aria geografică în luna mai, în funcție de rata fluxului de nectar.

Schimbarea locului în care se află albinele depinde în principal de altitudine. Întrucât vegetația se rărește de la o altitudine de 1 100 m, albinele se mută la cel puțin 1 900 m, la o distanță de 3-4 km de așezări, spre surse naturale de apă și zone cu fluxuri abundente de nectar și de polen.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

—