C/2024/1989

12.3.2024

Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2), točka (a), Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(C/2024/1989)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ([1]) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek v treh mesecih od dneva te objave.

ENOTNI DOKUMENT

„Bingöl Balı“

EU št.: PDO-TR-02886 – 5. 1. 2023

ZOP (x) ZGO ( )

1. **Ime**

„Bingöl Balı“

2. **Država članica ali tretja država:**

Turčija

3. **Opis kmetijskega proizvoda ali živila**

3.1. *Vrsta izdelka:*

Skupina 1.4 Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itn.)

3.2. *Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1*

„Bingöl Balı“ je mešani cvetlični med, ki izhaja z geografskega območja iz točke 4. Lahko je od svetlo do temno jantarne barve. Trži se kot satje in točeni med. Pridelujejo ga čebelje pasme *Apis mellifera anatoliaca*, *A. mellifera caucasica* in *A. mellifera meda* ter njihovi hibridi.

Lastnosti cvetnega prahu „Bingöl Balı“ so:

(i) cvetni prah bi moral vključevati najmanj enega od sorodnih taksonov *Astragalus* sp. (grahovec), *Centaurea* sp. (navadna tavžentroža), *Hypericum* sp. (šentjanževka), *Trifolium* sp. (detelja) in *Xeranthemum* sp. (letni suhocvet);

(ii) skladen bi moral biti tudi s spektrom cvetnega prahu iz preglednice 2 (prisotnost vseh navedenih taksonov cvetnega prahu se ne zahteva).

Preglednica 1

Fizikalno-kemijske lastnosti medu „Bingöl Balı“

Značilnost	Vrednost
Vlažnost (%, največ)	18 %
Saharoza (g/100 g, največ)	3 g/100 g
Fruktoza + glukoza (g/100 g, najmanj)	65 g/100 g
Fruktoza / glukoza	1,00–1,30
Maltoza (%, največ)	4 %

([1]) UL L 343, 14.12.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

V vodi netopna snov (g/100 g, največ)	0,1 g/100 g
Vsebnost prostih maščobnih kislin (meq/kg, največ)	40 meq/kg
Električna prevodnost (mS/cm, največ)	0,8 mS/cm
Diastazno število (najmanj)	15
HMF (mg/kg, največ)	20 mg/kg
$\delta^{13}C_{med}$	– 23 ali manj
$\delta^{13}C_{protein} - \delta^{13}C_{med}$	– 1,0 ali več
$C_{4\ sladkorji}$ (največ)	7 %
Prolin (mg/kg, najmanj)	450

Preglednica 2

Melisopalinološke lastnosti medu „Bingöl Balı“

	Takson	Družina	Vsebnost cvetnega prahu (primarni: ≥ 45 %, spremljajoči: 16–44 %, pomembnejši posamični: 3–15 %, sledi: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Akantovke	Pomembnejši posamični, sledi
2.	*Sambucus* sp.	Pižmičevke	Pomembnejši posamični, sledi
3.	*Allium* sp.	Narcisovke	Pomembnejši posamični, sledi
4.	*Rhus* sp.	Octovke	Pomembnejši posamični, sledi
5.	Apiaceae	Kobuljnice	Sledi
6.	*Chaerophyllum* sp.	Kobuljnice	Sledi
7.	*Eryngium campestre*	Kobuljnice	Spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
8.	*Pimpinella* sp.	Kobuljnice	Primarni, sledi
9.	*Achillea* sp.	Nebinovke	Pomembnejši posamični, sledi
10.	*Anthemis* sp.	Nebinovke	Sledi
11.	*Artemisia* sp.	Nebinovke	Spremljajoči, sledi
12.	*Carduus* sp.	Nebinovke	Sledi
13.	*Cichorium*sp.	Nebinovke	Spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
14.	*Cirsium* spp.	Nebinovke	Pomembnejši posamični, sledi
15.	*Cirsium yildizianum*	Nebinovke	Spremljajoči, sledi
16.	*Crepis* sp.	Nebinovke	spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
17.	*Echinops* sp.	Nebinovke	Pomembnejši posamični, sledi
18.	*Gundelia* sp.	Nebinovke	Sledi
19.	*Helichrysum* sp.	Nebinovke	Primarni, spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
20.	*Leontodon* sp.	Nebinovke	Sledi
21.	*Onopordum* sp.	Nebinovke	Sledi
22.	*Ptilostemon* sp.	Nebinovke	Sledi
23.	*Senecio* sp.	Nebinovke	Sledi

24.	*Taraxacum* sp.	Nebinovke	Pomembnejši posamični, sledi
25.	*Xanthium* sp.	Nebinovke	Sledi
26.	*Alkanna* sp.	Srhkolistovke	Sledi
27.	*Anchusa* sp.	Srhkolistovke	Sledi
28.	*Cerinthe minor*	Srhkolistovke	Sledi
29.	*Echium* sp.	Srhkolistovke	Pomembnejši posamični, sledi
30.	*Myosotis* sp.	Srhkolistovke	Pomembnejši posamični, sledi
31.	*Onosma* sp.	Srhkolistovke	Sledi
32.	*Campanula* sp.	Zvončičevke	Pomembnejši posamični, sledi
33.	*Campanula* sp.	Zvončičevke	Pomembnejši posamični, sledi
34.	*Cephalaria* sp.	Kovačnikovke	pomembnejši posamični, sledi
35.	*Dipsacus* sp.	Kovačnikovke	Sledi
36.	*Scabiosa* spp.	Kovačnikovke	Sledi
37.	*Valeriana* sp.	Kovačnikovke	Sledi
38.	*Dianthus* sp.	Klinčnice	Pomembnejši posamični
39.	*Saponaria* sp.	Klinčnice	Sledi
40.	*Silene* sp.	Klinčnice	Sledi
41.	Caryophyllaceae/ *Amaranthaceae*	Klinčnice/ ščirovke	Spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
42.	*Chenopodium* sp.	Metlikovke	Pomembnejši posamični, sledi
43.	*Convolvulus* sp.	Slakovke	Spremljajoči, sledi
44.	*Cornus* sp.	Drenovke	Sledi
45.	*Sedum* sp.	Tolstičevke	Pomembnejši posamični
46.	*Eleagnus* sp.	Oljčičevke	Sledi
47.	*Euphorbia* sp.	Mlečkovke	Sledi
48.	*Coronilla* sp.	Metuljnice	Pomembnejši posamični, sledi
49.	*Genista* sp.	Metuljnice	Sledi
50.	*Hedysarum* sp.	Metuljnice	Pomembnejši posamični, sledi
51.	*Lathyrus* sp.	Metuljnice	Sledi
52.	*Lotus* sp.	Metuljnice	Primarni, spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
53.	*Medicago* sp.	Metuljnice	Pomembnejši posamični
54.	*Melilotus* sp.	Metuljnice	Spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
55.	*Onobrychis* sp.	Metuljnice	Sledi
56.	*Robinia pseudoacacia*	Metuljnice	Sledi
57.	*Securigera* sp.	Metuljnice	Pomembnejši posamični
58.	*Vicia* spp.	Metuljnice	Sledi

59.	*Geranium* sp.	Krvomočničevke	Sledi
60.	Lamiaceae	Ustnatice	Pomembnejši posamični, sledi
61.	*Lamium macrodon*	Ustnatice	Spremljajoči, pomembnejši posamični
62.	*Lamium* sp.	Ustnatice	Primarni, spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
63.	*Marrubium* sp.	Ustnatice	Sledi
64.	*Mentha* sp.	Ustnatice	Sledi
65.	*Nepeta* sp.	Ustnatice	Sledi
66.	*Origanum* sp.	Ustnatice	Pomembnejši posamični, sledi
67.	*Phlomis* sp.	Ustnatice	Pomembnejši posamični, sledi
68.	*Salvia* sp.	Ustnatice	Sledi
69.	*Teucrium* sp.	Ustnatice	Pomembnejši posamični, sledi
70.	*Thymus* spp.	Ustnatice	Sledi
71.	*Lythrum salicaria*	Krvenkovke	Pomembnejši posamični, sledi
72.	*Alcea* sp.	Slezenovke	Sledi
73.	*Malva* sp.	Slezenovke	Sledi
74.	*Tilia* sp.	Slezenovke	Sledi
75.	*Morus* sp.	Murvovke	Sledi
76.	*Epilobium* sp.	Svetlinovke	Sledi
77.	*Corydalis* sp.	Makovke	Sledi
78.	*Papaver* sp.	Makovke	Sledi
79.	*Linaria* sp.	Trpotčevke	Pomembnejši posamični, sledi
80.	*Plantago lanceolata*	Trpotčevke	Primarni, spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
81.	*Acantholimon* sp.	Pečnikovke	Sledi
82.	*Polygala* sp.	Grebenuševke	Sledi
83.	*Polygonum* sp.	Dresnovke	Sledi
84.	*Rheum* sp.	Dresnovke	Sledi
85.	*Rumex* sp.	Dresnovke	Sledi
86.	*Portulaca* sp.	Tolščakovke	Sledi
87.	*Lysimachia* sp.	Jegličevke	Sledi
88.	*Ranunculus* sp.	Zlatičevke	Sledi
89.	*Paliurus spina christi*	Krhlikovke	Sledi
90.	*Cerasus* sp.	Rožnice	Sledi
91.	*Filipendula* sp.	Rožnice	Pomembnejši posamični, sledi
92.	*Fragaria* sp.	Rožnice	Sledi
93.	*Potentilla* sp.	Rožnice	Spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi

94.	*Prunus* sp.	Rožnice	Sledi
95.	*Pyrus* sp.	Rožnice	Sledi
96.	*Rosa canina*	Rožnice	Pomembnejši posamični, sledi
97.	Rosaceae	Rožnice	Spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
98.	*Rubus* sp.	Rožnice	Sledi
99.	*Sanguisorba* minor	Rožnice	Pomembnejši posamični, sledi
100.	*Galium* sp.	Broščevke	Pomembnejši posamični, sledi
101.	*Citrus* sp.	Rutičevke	Pomembnejši posamični, sledi
102.	*Salix* sp.	Vrbovke	Pomembnejši posamični, sledi
103.	*Verbascum* spp.	Črnobinovke	Primarni, spremljajoči, pomembnejši posamični, sledi
104.	*Eremurus* sp.	Zlatosokovke	Sledi

3.3. *Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)*

—

3.4. *Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju*

Vse faze proizvodnje, predelave in priprave morajo potekati na opredeljenem geografskem območju.

3.5. *Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime*

Med se prodaja v steklenih kozarcih, ki tehtajo največ 1 kg.

Satje v medu se prodaja pakirano v pravokotnih, kvadratnih ali lakiranih embalažah, ki tehtajo od 3 do 5 kg in so primerne za stik z živili.

Med, ki se prodaja, mora biti zaščiten pred neposredno sončno svetlobo, hraniti pa ga je treba v čistih in suhih prostorih z notranjo temperaturo do največ 20 °C in brez vonja.

3.6. *Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime*

Na embalaži proizvoda morata biti ime „Bingöl Balı“ in eden od naslednjih logotipov „Bingöl Balı“.





4. **Jedrnata opredelitev geografskega območja**

Razmejeno geografsko območje obsega vse vasi in mesta, ki spadajo v pokrajino Bingöl v vzhodni Anatoliji v Turčiji.

5. **Povezava z geografskim območjem**

Zahtevek za registracijo označbe porekla „Bingöl Balı“ temelji izključno na posebni kakovosti in značilnostih proizvoda, ki so rezultat naravnih in človeških dejavnikov, prisotnih na geografskem območju.

Posebnosti geografskega območja

Pokrajina Bingöl je obdana z gorami. Glavne morfološke enote so ognjeniške planote na različnih višinah gorskih območij po vsej pokrajini, doline, ki so jih oblikovali potoki, ki prepredajo gorska območja in se umestili na prelomih, ter ravnine in porečja, ki so nastali zaradi tektonskih premikov med gorskimi gmotami. Nadmorske višine in reliefne oblike, ki se spreminjajo na kratkih razdaljah, prispevajo k raznolikosti topografije, podnebnih elementov in vegetacije.

Rastlinstvo geografskega območja je zaradi letne količine padavin in velikega števila sončnih dni v pokrajini Bingöl bogato. Na gozdnih območjih prevladuje hrast (*Quercus petraea* subsp. *pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky in *Quercus libani Oliv.*) Na stepskih območjih rastejo obilne količine vrst grahovcev, tj. *Astragalus muschianus Kotschy & Boiss.* ex Boiss. in *Astragalus gummifer Labill.*

Ker je povprečna višina planot 1 500–2 000 m, so poletja sveža, obdobje cvetenja pa daljše. To omogoča oblikovanje naravnih gnezdišč, ki se za čebelarske dejavnosti lahko uporabljajo od junija do oktobra. Omogoča tudi zaščitena lokalna območja za čebelarstvo.

V pokrajini Bingöl ni težke industrije, zato tla in vodni viri ostajajo čisti.

Posebnosti proizvoda

Pokrajina Bingöl je pomembno območje za čebelarske dejavnosti zaradi svoje lege, naravnih pogojev in vrednosti pridelave. Leži na vzhodu anatolijske diagonale v iransko-turanski rastlinski regiji, ima značilno topografijo v primerjavi s širšo regijo in državo, zaradi svoje bogate rastlinske raznovrstnosti in različnih obdobij cvetenja pa velik potencial za čebelarstvo. Zato ima zelo raznoliko rastlinstvo in visoko stopnjo endemizma. Tu raste približno 1 700 vrst rastlin, od katerih je 300 endemičnih za pokrajino Bingöl. Poleg tega je več kot 200 taksonov rastlin registriranih kot medonosne rastline na podlagi melisopalinoloških analiz. Glavne družine rastlin med temi medonosnimi rastlinami so nebinovke (marjetice), metuljnice (stročnice) in krčničevke (šentjanževka). Ta rastlinska raznolikost se očitno kaže v botaničnem izvoru medu „Bingöl Balı“.

Z botaničnega vidika je za med „Bingöl Balı“ značilna bogata vsebnost cvetnega prahu, vključno z vsaj enim od sorodnih taksonov, tj. *Astragalus* sp. (grahovec), *Centaurea* sp. (navadna tavžentroža), *Hypericum* sp. (šentjanževka), *Trifolium* sp. (detelja) in *Xeranthemum* sp. (letni suhocvet), ter nekaterimi vrstami cvetnega prahu iz preglednice 2 v točki 3.2.

Človeški dejavnik

Čebelarske dejavnosti, ki se v pokrajini Bingöl izvajajo že vrsto let, so pomemben vir dohodka na tem geografskem območju.

Večinoma se izvajajo v obliki sezonske selitve panjev. Dejavnosti čebelarjev se začnejo v začetku marca z nego in hranjenjem kolonij čebel, kar se začne že pozimi, in preverjanjem čebelje matice. Te priprave se nadaljujejo do sredine maja. Čebelarji lahko maja selijo svoje čebele znotraj geografskega območja, odvisno od stopnje medenja.

Sprememba lokacije čebel je predvsem odvisna od nadmorske višine. Vegetacija postaja redkejša od nadmorske višine 1 100 m, zato se čebele selijo na višino 1 900 m in višje, tri do štiri kilometre od naselij, k naravnim vodnim virom in na območja z večjim medenjem in večjim sproščanjem cvetnega prahu.

Sklic na objavo specifikacije

—