C/2024/1989
12.3.2024

Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(C/2024/1989)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 ([1]) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Bingöl Balı”

EU-nr: PDO-TR-02886 – 5 januari 2023

SUB (x) SGB ( )

1. **Namn**

”Bingöl Balı”

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Turkiet

3. **Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet**

3.1. *Produkttyp*

Klass 1.4 Andra produkter av animaliskt ursprung (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör osv.)

3.2. *Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt*

”Bingöl Balı” är en blandhonung som erhålls från det geografiska område som beskrivs i avsnitt 4. Färgen varierar mellan ljus bärnsten och mörk bärnsten. Produkten saluförs som honung i vaxkaka och slungad honung. Vid framställningen används biraserna *Apis mellifera* anatoliaca, *A. mellifera* caucasica, *A. mellifera* meda samt hybridraser av dessa.

”Bingöl Balı” har följande pollenegenskaper:

i) Pollen bör innehålla minst en av följande taxa: *Astragalus* sp. (vedlar), *Centaurea* sp. (klintsläktet), *Hypericum* sp. (johannesört), *Trifolium* sp. (klöver) och *Xeranthemum* sp. (pappersblomstersläktet).

ii) Pollen bör också stämma överens med det pollenspektrum som anges i tabell 2 (det krävs inte att alla förtecknade pollentaxa förekommer).

Tabell 1

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos ”Bingöl Balı”

Egenskap	Värde
Fukt (max. %)	18 %
Sackaros (g/100 g, max)	3 g/100 g
Fruktos + glukos (g/100 g, min)	65 g/100 g
Fruktos/glukos	1,00–1,30
Maltos (max. %)	4 %

([1]) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Ej vattenlösliga ämnen (g/100 g, max)	0,1 g/100 g
Fria syror (mekv/kg, max)	40 mekv/kg
Elektrisk konduktivitet (mS/cm, max)	0,8 mS/cm
Antal diastaser (min.)	15
HMF (mg/kg, max)	20 mg/kg
$\delta^{13}C_{honung}$	- 23 eller lägre
$\delta^{13}C_{protein} - \delta^{13}C_{honung}$	– 1,0 eller högre
$C_{4\ socker}$ (max.)	7 %
Prolin (mg/kg, max)	450

Tabell 2

Pollenegenskaper hos ”Bingöl Balı”

	Taxon	Familj	Pollenhalt (primär: ≥ 45 %, sekundär: 16–44 %, mindre andel: 3–15 %, spårhalt: < 3)
1.	*Acanthus* sp.	Acanthaceae	Mindre andel, spårhalt
2.	*Sambucus* sp.	Adoxaceae	Mindre andel, spårhalt
3.	*Allium* sp.	Amaryllidaceae	Mindre andel, spårhalt
4.	*Rhus* sp.	Anacardiaceae	Mindre andel, spårhalt
5.	Apiaceae	Apiaceae	Spårhalt
6.	*Chaerophyllum* sp.	Apiaceae	Spårhalt
7.	*Eryngium campestre*	Apiaceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt
8.	*Pimpinella* sp.	Apiaceae	Primär, spårhalt
9.	*Achillea* sp.	Asteraceae	Mindre andel, spårhalt
10.	*Anthemis* sp.	Asteraceae	Spårhalt
11.	*Artemisia* sp.	Asteraceae	Sekundär, spårhalt
12.	*Carduus* sp.	Asteraceae	Spårhalt
13.	*Cichorium* sp.	Asteraceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt
14.	*Cirsium* spp.	Asteraceae	Mindre andel, spårhalt
15.	*Cirsium yildizianum*	Asteraceae	Sekundär, spårhalt
16.	*Crepis* sp.	Asteraceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt
17.	*Echinops* sp.	Asteraceae	Mindre andel, spårhalt
18.	*Gundelia* sp.	Asteraceae	Spårhalt
19.	*Helichrysum* sp.	Asteraceae	Primär, sekundär, mindre andel, spårhalt
20.	*Leontodon* sp.	Asteraceae	Spårhalt
21.	*Onopordum* sp.	Asteraceae	Spårhalt
22.	*Ptilostemon* sp.	Asteraceae	Spårhalt
23.	*Senecio* sp.	Asteraceae	Spårhalt

24.	*Taraxacum* sp.	Asteraceae	Mindre andel, spårhalt
25.	*Xanthium* sp.	Asteraceae	Spårhalt
26.	*Alkanna* sp.	Boraginaceae	Spårhalt
27.	*Anchusa* sp.	Boraginaceae	Spårhalt
28.	*Cerinthe minor*	Boraginaceae	Spårhalt
29.	*Echium* sp.	Boraginaceae	Mindre andel, spårhalt
30.	*Myosotis* sp.	Boraginaceae	Mindre andel, spårhalt
31.	*Onosma* sp.	Boraginaceae	Spårhalt
32.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Mindre andel, spårhalt
33.	*Campanula* sp.	Campanulaceae	Mindre andel, spårhalt
34.	*Cephalaria* sp.	Caprifoliaceae	Mindre andel, spårhalt
35.	*Dipsacus* sp.	Caprifoliaceae	Spårhalt
36.	*Scabiosa* spp.	Caprifoliaceae	Spårhalt
37.	*Valeriana* sp.	Caprifoliaceae	Spårhalt
38.	*Dianthus* sp.	Caryophyllaceae	Mindre andel
39.	*Saponaria* sp.	Caryophyllaceae	Spårhalt
40.	*Silene* sp.	Caryophyllaceae	Spårhalt
41.	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Caryophyllaceae/ Amaranthaceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt
42.	*Chenopodium* sp.	Chenopodiaceae	Mindre andel, spårhalt
43.	*Convolvulus* sp.	Convolvulaceae	Sekundär, spårhalt
44.	*Cornus* sp.	Cornaceae	Spårhalt
45.	*Sedum* sp.	Crassulaceae	Mindre andel
46.	*Eleagnus* sp.	Eleagnaceae	Spårhalt
47.	*Euphorbia* sp.	Euphorbiaceae	Spårhalt
48.	*Coronilla* sp.	Fabaceae	Mindre andel, spårhalt
49.	*Genista* sp.	Fabaceae	Spårhalt
50.	*Hedysarum* sp.	Fabaceae	Mindre andel, spårhalt
51.	*Lathyrus* sp.	Fabaceae	Spårhalt
52.	*Lotus* sp.	Fabaceae	Primär, sekundär, mindre andel, spårhalt
53.	*Medicago* sp.	Fabaceae	Mindre andel
54.	*Melilotus* sp.	Fabaceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt
55.	*Onobrychis* sp.	Fabaceae	Spårhalt
56.	*Robinia pseudoacacia*	Fabaceae	Spårhalt
57.	*Securigera* sp.	Fabaceae	Mindre andel
58.	*Vicia* spp.	Fabaceae	Spårhalt

59.	Geranium sp.	Geraniaceae	Spårhalt
60.	Lamiaceae	Lamiaceae	Mindre andel, spårhalt
61.	*Lamium macrodon*	Lamiaceae	Sekundär, mindre andel
62.	*Lamium* sp.	Lamiaceae	Primär, sekundär, mindre andel, spårhalt
63.	*Marrubium* sp.	Lamiaceae	Spårhalt
64.	*Mentha* sp.	Lamiaceae	Spårhalt
65.	*Nepeta* sp.	Lamiaceae	Spårhalt
66.	*Origanum* sp.	Lamiaceae	Mindre andel, spårhalt
67.	*Phlomis* sp.	Lamiaceae	Mindre andel, spårhalt
68.	*Salvia* sp.	Lamiaceae	Spårhalt
69.	*Teucrium* sp.	Lamiaceae	Mindre andel, spårhalt
70.	*Thymus* spp.	Lamiaceae	Spårhalt
71.	*Lythrum salicaria*	Lythraceae	Mindre andel, spårhalt
72.	*Alcea* sp.,	Malvaceae	Spårhalt
73.	*Malva* sp.	Malvaceae	Spårhalt
74.	*Tilia* sp.	Malvaceae	Spårhalt
75.	*Morus* sp.	Moraceae	Spårhalt
76.	*Epilobium* sp.	Onagraceae	Spårhalt
77.	*Corydalis* sp.	Papaveraceae	Spårhalt
78.	*Papaver* sp.	Papaveraceae	Spårhalt
79.	*Linaria* sp.	Plantaginaceae	Mindre andel, spårhalt
80.	*Plantago lanceolata*	Plantaginaceae	Primär, sekundär, mindre andel, spårhalt
81.	*Acantholimon* sp.	Plumbaginaceae	Spårhalt
82.	*Polygala* sp.	Polygalaceae	Spårhalt
83.	*Polygonum* sp.	Polygonaceae	Spårhalt
84.	*Rheum* sp.	Polygonaceae	Spårhalt
85.	*Rumex* sp.	Polygonaceae	Spårhalt
86.	*Portulaca* sp.	Portulacaceae	Spårhalt
87.	*Lysimachia* sp.	Primulaceae	Spårhalt
88.	*Ranunculus* sp.	Ranunculaceae	Spårhalt
89.	*Paliurus spina christi*	Rhamnaceae	Spårhalt
90.	*Cerasus* sp.	Rosaceae	Spårhalt
91.	*Filipendula* sp.	Rosaceae	Mindre andel, spårhalt
92.	*Fragaria* sp.	Rosaceae	Spårhalt
93.	*Potentilla* sp.	Rosaceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt

94.	*Prunus* sp.	Rosaceae	Spårhalt
95.	*Pyrus* sp.	Rosaceae	Spårhalt
96.	*Rosa canina*	Rosaceae	Mindre andel, spårhalt
97.	Rosaceae	Rosaceae	Sekundär, mindre andel, spårhalt
98.	*Rubus* sp.	Rosaceae	Spårhalt
99.	*Sanguisorba* minor	Rosaceae	Mindre andel, spårhalt
100.	*Galium* sp.	Rubiaceae	Mindre andel, spårhalt
101.	*Citrus* sp.	Rutaceae	Mindre andel, spårhalt
102.	*Salix* sp.	Salicaceae	Mindre andel, spårhalt
103.	*Verbascum* spp.	Scrophulariaceae	Primär, sekundär, mindre andel, spårhalt
104.	*Eremurus* sp.	Xanthorrhoeaceae	Spårhalt

3.3. *Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)*

–

3.4. *Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området*

Alla steg i produktionen, bearbetningen och beredningen måste ske inom det avgränsade geografiska området.

3.5. *Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser*

Honungen säljs i glasburkar på högst 1 kg.

Honung i vaxkaka säljs i rektangulära, kvadratiska eller lackerade förpackningar som väger 3–5 kg och lämpar sig för kontakt med livsmedel.

Honungen som ska säljas måste skyddas mot direkt solljus och förvaras på rena och torra platser som inte luktar, med en temperatur på högst 20 °C.

3.6. *Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser*

Namnet ”Bingöl Balı” och en av följande logotyper måste synas på produktförpackningen.





4. **Kort beskrivning av det geografiska området**

Det avgränsade geografiska området omfattar alla orter i provinsen Bingöl i östra Anatolien i Turkiet.

5. **Samband med det geografiska området**

Ansökan om registrering av ursprungsbeteckningen ”Bingöl Balı” baseras enbart på produktens särskilda kvalitet och egenskaper, som är ett resultat av de naturliga och mänskliga faktorerna i det geografiska området.

Det geografiska områdets särskilda egenskaper

Provinsen Bingöl är omgiven av berg. De huvudsakliga morfologiska enheterna utgörs av vulkaniska platåer på olika höjd i provinsens bergområden, dalar som bildats av vattendrag som löper genom bergsområden och ligger på förkastningssprickor samt slätter och sänkor som bildats genom tektonisk aktivitet i bergsmassiven. Höjdskillnader och föränderliga landformer inom små områden ger upphov till mångskiftande topografi, klimatförhållanden och växtlighet.

Den årliga nederbörden och det höga antalet soldagar i Bingöl gör att det geografiska området har en rik flora. Ek (*Quercus petraea* ssp. *pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky & Quercus libani Oliv.) dominerar i skogsområdena. I stäppområdena är vedelarterna *Astragalus muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. och *Astragalus gummifer* Labill rikt förekommande.

Eftersom platåns genomsnittliga höjd är 1 500–2 000 m är sommarperioden sval och blomningsperioden lång. Detta leder till bildandet av naturliga logianläggningar som kan användas mellan juni och oktober i samband med biodling. Det ger också skyddade lokala områden där man kan bedriva biodling.

Eftersom det inte finns någon tung industri i Bingöl är marken och vattenresurserna rena.

Produktens särskilda egenskaper

Provinsen Bingöl utgör ett viktigt område för biodling på grund av var det ligger samt dess naturförhållanden och produktionsvärde. Bingöl ligger i östra Turkiet och ingår i den iransk-turanska floraregionen. Området har en särskild topografi jämfört med den större regionen och landet och har stor biodlingspotential tack vare den rika floran och de olika blomningsperioderna. På grund av detta har provinsen Bingöl en rik och mångskiftande växtlighet och hög endemism. Det finns omkring 1 700 arter, varav 300 är endemiska i Bingöl. Dessutom har över 200 växttaxa registrerats som dragväxter genom pollenanalyser. De huvudsakligen växtfamiljerna bland dessa dragväxter är Asteraceae (korgblommiga växter), Fabaceae (ärtväxter) och Hypericaceae (johannesörtsväxter). Mångfalden av blommor återspeglas tydligt i det botaniska ursprunget för ”Bingöl Balı”.

Botaniskt kännetecknas ”Bingöl Balı” av den rika pollenhalten samt förekomsten av minst en av följande taxa: *Astragalus* sp. (vedlar), *Centaurea* sp. (klintsläktet), *Hypericum* sp. (johannesört), *Trifolium* sp. (klöver) och *Xeranthemum* sp. (pappersblomstersläktet) samt några av de typer av pollen som anges i tabell 2 i punkt 3.2.

Mänskliga faktorer

Biodling har bedrivits i många år i provinsen Bingöl och är en viktig inkomstkälla i det geografiska området.

Biodlingen bedrivs främst i form av flyttning av bisamhällen. Biodlarna inleder vinterns skötsel och utfodring av bikolonierna samt kontroll av drottningen i början av mars. Dessa förberedelser fortsätter fram till mitten av maj. I maj kan biodlarna flytta sina bin inom det geografiska området, beroende på hur mycket nektar de samlat in.

Flytt av bina beror i huvudsak på höjden. När mängden vegetation minskar på platser som ligger högre än 1 100 m flyttar bina till platser på minst 1 900 meters höjd, 3–4 km från bosättningarna, till områden där de har nära till naturliga vattenkällor och riklig tillgång på nektar och pollen.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

–