C/2024/2893

25.4.2024

**Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin**

(C/2024/2893)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ([1]) do tří měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

**„Söke Pamuğu“**

**EU č.: PGI-TR-03016 – 2.10.2023**

**CHOP ( ) CHZO (X)**

1. **Název (názvy)**

„Söke Pamuğu“

2. **Členský stát nebo třetí země**

Turecko

3. **Popis zemědělského produktu nebo potraviny**

3.1 *Druh produktu*

Třída 2.14 Bavlna

3.2 *Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1*

„Söke Pamuğu“ je surové bavlněné vlákno pěstované v okrese Söke. Získává se z těchto odrůd: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa a Nazilli 84.

*Tabulka 1*

**Charakteristické vlastnosti produktu „Söke Pamuğu“**

| VLASTNOSTI | HODNOTA |
|---|---|
| Výnos bavlny (kg/ha) | 460–550 |
| Délka vlákna (mm) | 28–32 |
| Hodnota micronaire | 3,9–4,7 |
| Pevnost vlákna v tahu (g/tex) | 29–37 |
| Zralost vláken (%) | 0,86–0,87 |
| Stejnoměrnost délky vláken (%) | 84–86 |
| Hodnota žlutosti vláken (+b) | 7–10 |
| Barevná třída | (21-1) – (41-1) |
| Množství nečistot ve vláknech (TrCnt) | 9–63 |

([1]) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

| | |
|---|---|
| Obsah krátkých vláken (%) | 6–8 |
| Obsah dlouhých vláken (%) | 83–87 |
| Stupeň jasu vláken (Rd) | 76–87 |
| Pokrytí nopky (%) | 3–6 |
| Index pružnosti | 125–185 |
| Obsah vlhkosti (%) | 7–8,5 |

3.3 *Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)*

3.4 *Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti*

Kroky, které se musí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti pro produkci produktu „Söke Pamuğu“, jsou uvedeny níže:

— výběr a získání osiva

— příprava půdy

— výsadba

— zavlažování a hnojení

— péče o rostliny (kromě sklizně)

— sklizeň

3.5 *Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název*

—

3.6 *Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název*

Na obalu produktu musí být vytištěno logo CHZO. Pokud jej nelze umístit na obal, musí být logo CHZO viditelné na prodejní ploše.

4. **Stručné vymezení zeměpisné oblasti**

Zeměpisnou oblastí produkce produktu „Söke Pamuğu“ je celé území okresu Söke v turecké provincii Aydın.

5. **Souvislost se zeměpisnou oblastí**

Pro pěstování bavlny Söke Pamuğu v okrese Söke se využívá rozmanitá škála bavlníkových semen (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa a Nazilli 84). Bavlna Söke Pamuğu má menší tendenci žloutnout a má lesklý vzhled a prodloužená vlákna. Výsledná příze z této bavlny je jemná a robustní.

V oblastech, kde se v Turecku pěstuje bavlna, dosahují teploty maxim v červnu a červenci. Na bavlníky pěstované v jiných oblastech mají vysoké teploty nepříznivý vliv. Převládající letní větry „Meltem“, které vanou v okrese Söke, urychlují procesy odpařování a transpirace v rostlinách. Tyto větry snižují vlhkost půdy, čímž snižují riziko napadení rostlin chorobami a podporují jejich růst. Větrné podmínky v okrese Söke jsou obecně popisovány jako mírné a příznivé. Vzhledem k tomu, že se daný okres nachází ve vnitrozemí, je ve srovnání s pobřežními oblastmi méně ovlivněn působením moře. V důsledku toho jsou větry v Söke typicky mírné a nedosahují vysokých rychlostí. Větry Meltem často vanou v letních měsících, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Tyto větry mají ochlazující účinek, mírně snižují teploty a zabraňují problémům spojeným s tepelným stresem rostlin.

Občasné mrazy v okresu Söke rostliny nepoškozují, a tudíž nesnižují výnos produkce bavlny. Bavlna pěstovaná v Egejském moři, oblasti Çukurova a jihovýchodních oblastech Anatolie je ovlivněna nízkou vlhkostí a vysokými teplotami. Bavlna pěstovaná v okrese Söke Pamuğu dosahuje proto lepších parametrů, pokud jde o délku vlákna, hodnotu micronaire, pevnost vlákna v tahu, zralost vlákna, stejnoměrnost délky vláken, hodnotu žlutosti vláken (+b) a barevnou třídu, než bavlna pěstovaná v jiných oblastech.

Bavlna Söke Pamuğu je úzce spjata se strukturou půdy v okresu Söke. Struktura půdy je významným faktorem, který ovlivňuje vlastnosti bavlníku. Dobře odvodněná, úrodná půda zadržující vlhkost podporuje zakořenění bavlníku a zajišťuje jeho zdravý růst. PH půdy činí 6,5 až 7,55. Vysoký obsah makroživin, jako je dusík, fosfor a draslík, v půdě zvyšuje výnos z vyzrňování bavlny Söke Pamuğu a zabraňuje jejímu nežádoucímu žloutnutí.

Výsadba osiva bavlníku Söke Pamuğu se uskutečňuje v posledním dubnovém týdnu. Sklizeň probíhá o 150–155 dnů později, během prvního říjnového týdne. Sklizeň v říjnu zajišťuje, že se barva bavlny Söke Pamuğu bude pohybovat v rozmezí 21–1 a 41–1. Díky tomu se získá vysoce kvalitní bavlněná příze vynikající barvy a jakosti.

Průměrná roční teplota v okrese Söke dosahuje 17,4 °C. V červnu (kdy se tvoří tobolky) se teploty pohybují nad 20 °C, v červenci (kdy bavlník kvete) nad 25 °C a v srpnu (kdy tobolky dozrávají) nad 30 °C. Bavlník Söke Pamuğu není nepříznivě ovlivněn tepelným stresem. Tobolky se zcela otevírají během období sklizně, když teplota klesne na 15 °C. Úplné otevření tobolek během sklizně vede k nízkým hodnotám žlutosti bavlny Söke Pamuğu.

Roční úhrn srážek v okrese Söke se pohybuje mezi 450 mm a 575 mm. Tento objem srážek zajišťuje optimální růst a výnos bavlny Söke Pamuğu. Pro dostatečnou závlahu bavlníku má proto zásadní význam řízení zavlažování a monitorování dešťových srážek. Během fáze růstu Söke Pamuğu (v červnu) se kořeny zapustí až 15 cm hluboko do půdy. V tomto období s nízkým úhrnem srážek je potřeba přibližně 40–60 mm vody. Producenti v tomto období zavlažují 2–3krát. Je třeba zajistit, aby voda během zavlažování nebyla v přímém kontaktu s rostlinami, protože to přispívá k ochraně rostlin před chorobami. V případě produkce bavlny se má obecně za to, že nadměrné zavlažování vede ke snížení kvality produktů. Pečlivým řízením zavlažovacích postupů a zohledněním výše srážek mohou zemědělci bavlníku Söke Pamuğu zajistit dostatek vlhkosti pro jeho růst a rozvoj. Díky tomu nedojde ke snížení kvality produktu. Tyto praktiky zvyšují kvalitu bavlny, a v důsledku toho i kvalitu výsledné příze. V červenci a srpnu je v okresu Söke obvykle málo srážek, což kvalitu bavlny dále zvyšuje.

Vlákna dosahují nejvyšší délky, je-li noční teplota 18–20 °C (v závislosti na genotypu). V okrese Söke se bavlna začíná utvářet mezi 70–75 dnem a bavlněná vlákna se tvoří v červnu a v červenci, kdy se průměrné noční teploty pohybují mezi 19–23 °C. Průměrné denní teploty v červenci a v srpnu se pohybují mezi 30–35 °C. Tyto podmínky vedou k tomu, že vlákna Söke Pamuğu jsou delší, než je turecký průměr. Jemnost vláken je úměrná jejich délce a s rostoucí délkou se zvětšuje. Délka vláken poskytuje informace o tom, jak lze bavlnu použít v textilním průmyslu. Míra dopadu na kvalitu se liší v závislosti na metodách spřádání použitých pro danou délku vlákna. Bavlna Söke Pamuğu má maximální délku vlákna 32 mm a jemnost 3,9–4,7 mikrometrů. Délku bavlněného vlákna lze na základě klasifikace podle délkové třídy zařadit do třídy „poměrně dlouhé vlákno“.

Parametry jakosti bavlny, jako je barva a hodnota micronaire, jsou více ovlivněny environmentálními podmínkami a pěstitelskými technikami než genetickou strukturou odrůdy. Na barvu a jemnost vláken má velký dopad zejména okolní prostředí.

Jemnost je hned po délce jednou z nejžádanějších vlastností bavlny. S rostoucí jemností se zvyšuje počet získaných přízí a snižuje se nejednotnost. Příze vyrobené z jemných vláken mají větší pevnost a jsou stejnorodější než příze vyrobené z tlustých vláken. Jemnost bavlny Söke Pamuğu je 3,9–4,7 µg/palec.

Produkce bavlny se v okrese Söke stala tradicí. Bavlna se zde pěstuje od roku 1700. Ve třicátých letech 19. století se z přízí z bavlny „Söke Pamuğu“ tkaly plachty osmanských lodí.

V letech 1950 až 1980 došlo v Turecku k významné migraci z venkova do měst, což vedlo k rychlému poklesu počtu obyvatel vesnic. Úroveň příjmů v okrese Söke však zůstala díky produkci bavlny stabilní a nedošlo k žádnému významnému odlivu obyvatelstva.

V okrese Söke se každoročně koná tradiční festival Söke Pamuk, a to obvykle od 1. do 6. října. Tato akce oslavuje tradici produkce bavlny v Söke, spojuje producenty bavlny a zdůrazňuje kulturní bohatství regionu.

Provází ji různé aktivity, včetně exkurzí na bavlníková pole, ukázek sklízení bavlny, koncertů, výstav, ochutnávek místních pokrmů, lidových tanců a dalších kulturních akcí. Tento festival je místem setkávání producentů bavlny, místních obyvatel a návštěvníků a ukazuje místní průmysl a kulturu spojené s pěstováním bavlny.

**Odkaz na zveřejnění specifikace**

—