C/2024/2893

25.4.2024

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(C/2024/2893)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 ([1]), senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

ENHEDSDOKUMENT

»Söke Pamuğu«

EU-nr.: PGI-TR-03016 — 2.10.2023

BOB ( ) BGB (X)

1. **Betegnelse**

»Söke Pamuğu«

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Tyrkiet

3. **Beskrivelse af landbrugsprodukter eller fødevaren**

3.1. *Produkttype*

Kategori 2.14. Bomuld

3.2. *Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1*

»Söke Pamuğu« er den råbomuldsfiber, der dyrkes i Söke-regionen. Produktet fremstilles af følgende sorter: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa og Nazilli 84.

Tabel 1

De særlige karakteristika ved »Söke Pamuğu«

KARAKTERISTIKA	VÆRDI
Bomuldsudbytte (kg/ha)	460-550
Fiberlængde (mm)	28-32
Micronaire-værdi	3,9-4,7
Fibrenes trækstyrke (g/tex)	29-37
Fibermodenhed (%)	0,86-0,87
Fiberlængdeensartethed (%)	84-86
Værdi for gul tone i fibrene (+ b)	7-10
Farveskala	(21-1)-(41-1)
Antal urenheder i fibrene (TrCnt)	9-63

([1]) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Indhold af korte fibre (%)	6-8
Indhold af lange fibre (%)	83-87
Graden af fibrenes glans (Rd)	76-87
Bomuldshår i overfladen (%)	3-6
Fleksibilitetsindeks	125-185
Vandindhold (%)	7-8,5

3.3. *Foder (kun for animalske produkter) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)*

3.4. *Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område*

Følgende trin skal finde sted inden for det afgrænsede geografiske område ved produktionen af »Söke Pamuğu«:

— Udvælgelse og anskaffelse af frø

— Jordbearbejdning

— Plantning

— Vanding og gødskning

— Plantepleje (ikke høst)

— Høst.

3.5 *Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til*

–

3.6 *Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til*

BGB-symbolet skal være påtrykt på emballagen. Hvis BGB-symbolet ikke kan anbringes på emballagen, skal det være synligt i salgsområdet.

4. Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Det geografiske produktionsområde for »Söke Pamuğu« er hele Söke-distriktets område i provinsen Aydın i Tyrkiet.

5. Tilknytning til det geografiske område

Söke Pamuğu dyrkes i Söke-regionen, og der anvendes en bred vifte af bomuldsfrø (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa og Nazilli 84). Produktet har en lav gulningsfaktor, et blankt udseende og længere fibre. Garn fremstillet fra Söke Pamuğu har fine og solide egenskaber.

I de regioner i Tyrkiet, hvor der dyrkes bomuld, ses de højeste temperaturer i juni og juli. Bomuldsplanter i andre regioner påvirkes negativt af høje temperaturer. De dominerende meltemi-vinde om sommeren i Söke-distriktet fremskynder fordampningen og transpirationen i planterne. Disse vinde reducerer jordfugtigheden og mindsker derved risikoen for plantesygdomme og fremmer plantevæksten. Vindforholdene i Söke-distriktet betegnes generelt som milde og skånsomme. Da området ligger i den indre del af landet, er det sammenlignet med kystområderne mindre påvirket af havet. Vindene i Söke er derfor typisk svage og når ikke høje hastigheder. Meltemi-vindene mærkes ofte i sommermånederne, særligt om eftermiddagen og om aftenen. Disse vinde har en kølende virkning og lidt lavere temperaturer og forebygger temperaturrelateret stress hos planterne.

Den sjældent forekomne frost i Söke-regionen skader ikke planterne og reducerer derfor ikke udbyttet af bomuldsproduktionen. Bomuld, der dyrkes i regionerne Aegean, Çukurova og det sydøstlige Anatolien, påvirkes af lave fugtighedsniveauer og høje temperaturer. Derfor er fiberlængden, mikronaire-værdien, fibrenes trækstyrke, fibermodenheden, fiberlængdeensartetheden, værdien for gul tone i fibrene (+ b) og farveskalaværdierne højere i Söke Pamuğu end i andre regioner.

Söke Pamuğu er tæt forbundet med jordbundsstrukturen i Söke-distriktet. Jordbundens struktur er en væsentlig faktor, som påvirker bomuldsplantens karakteristika. En veldrænet, fugtighedsbevarende og frugtbar jordbund understøtter rodudviklingen i bomuldsplanten og sikrer en sund vækst. Jordbundens pH-værdi varierer fra 6,5 til 7,55. Det høje indhold af makronæringsstoffer såsom kvælstof, fosfor og kalium i jordbunden øger egreneringsudbyttet af Söke Pamuğu og forebygger dannelsen af en uønsket gul farve i bomulden.

Såningen af frø til Söke Pamuğu finder sted i den sidste uge af april. Høstperioden finder sted 150-155 dage senere, i løbet af den første uge af oktober. Høsten i oktober sikrer, at farveskalaen for Söke Pamuğu ligger inden for 21-1 og 41-1. Dette resulterer i bomuldsgarn af høj kvalitet med en meget flot farve.

Den årlige gennemsnitstemperatur i Söke-distriktet er 17,4 °C. Temperaturerne ligger over 20 °C i juni (her dannes frøkapslerne), over 25 °C i juli (blomstringsperioden) og over 30 °C i august (perioden, hvor frøkapslerne udvikles). Söke Pamuğu påvirkes ikke negativt af temperaturene. Frøkapslerne åbner sig helt i løbet af høstperioden, når temperaturen falder til 15 °C. Den fuldstændige åbning af frøkapslerne i høstperioden bidrager til den lave værdi for gul tone Söke Pamuğu.

Den årlige nedbør varierer mellem 450 mm og 575 mm i Söke-distriktet. Denne nedbørsmængde giver Söke Pamuğu optimal vækst og produktivitet. Forvaltning af vandingen og overvågning af nedbøren er derfor afgørende for at opfylde plantens vandbehov. I løbet af vækstfasen for Söke Pamuğu (i juni) strækker rodlængden sig ned i jorden til en dybde på 15 cm. I denne periode med reduceret nedbørsmængde er den krævede vandmængde ca. 40-60 mm. Producenterne vander 2-3 gange i denne periode. Der passes på, at vandet ikke rører planterne direkte under vandingen, da dette bidrager til at beskytte planterne mod sygdomme. Derudover er det en almindelig opfattelse, at overdreven vanding i bomuldsproduktionen kan føre til en forringelse af produktkvaliteten. Ved omhyggeligt at styre vandingen og tage hensyn til nedbørsmængderne kan landbrugerne sikre, at Söke Pamuğu får tilstrækkelig fugtighed til sin vækst og udvikling. På denne måde forringes produktkvaliteten ikke. Denne erfaring forbedrer bomulden og dermed garnkvaliteten. Der falder normalt kun lidt nedbør i Söke i juli og august. Dette forbedrer produktkvaliteten på grund af nedsat luftfugtighed.

Fibrene når deres maksimale længde, når nattemperaturen er 18-20 °C (afhængigt af genotypen). I Söke-distriktet opnås bomuldsdannelsen omkring dag 70-75, og bomuldsfibrene dannes i juni og juli, når gennemsnitstemperaturen om natten er omkring 19-23 °C. Gennemsnitstemperaturen om dagen er 30-35 °C i juli og august. Dette gør, at Söke Pamuğu har længere fibre end gennemsnittet for andre bomuldsplanter i Tyrkiet. Fibrenes finhed er proportional med længden og øges, når længden øges. Fiberlængden giver en indikation af, hvordan bomulden kan anvendes i tekstilindustrien. Påvirkningen af kvaliteten varierer alt efter den spindemetode, der anvendes som følge af fiberlængden. Söke Pamuğu har en fiberlængde på højst 32 mm og en finhed på 3,9-4,7 mikrometer. Bomuldsfiberlængden kan klassificeres som »ret lang«.

Kvalitetsparametrene for bomuld såsom farve og mikronaire-værdier påvirkes mere af miljøforhold og dyrkningsmetoder end af sortens genetiske struktur. Navnlig er miljøets indvirkning på farvekvaliteten og fibrenes finhed betydeligt høj.

Efter længden er finheden et af de mest efterspurgte karakteristika i bomuld. Efterhånden som finheden stiger, øges garnnummeret, og uregelmæssighederne mindskes. Garn fremstillet af fine fibre er stærkere og mere ensartede end garn fremstillet af tykke fibre. Söke Pamuğus finhed er 3,9-4,7 µg pr. tomme.

Bomuldsproduktion er blevet en tradition i Söke-distriktet. Der er blevet dyrket bomuld i distriktet siden år 1700. I 1830'erne blev ottomanske skibes sejl fremstillet af garn af »Söke Pamuğu«.

Mellem 1950 og 1980 var der en betydelig migration fra land til by i Tyrkiet, hvilket førte til et hurtigt fald i landsbyernes indbyggertal. Indkomstniveauet er dog forblevet stabilt i Söke-distriktet takket være bomuldsproduktionen, og der har ikke været nogen betydelig befolkningsmobilitet.

Söke Pamuk-festivalen er en årlig traditionel begivenhed i Söke-distriktet. Festivalen finder typisk sted mellem den 1. og den 6. oktober. Ved dette arrangement fejres Söke's tradition for bomuldsproduktion, bomuldsproducenterne samles, og regionens kulturelle rigdom tydeliggøres.

Ved Söke Pamuk-festivalen kan der opleves flere forskellige aktiviteter, herunder udflugter til bomuldsmarker, demonstrationer i bomuldshøst, koncerter, udstillinger, prøvesmagninger af lokale retter, folkedans og andre kulturelle arrangementer. Festivalen er et mødested for bomuldsproducenter, lokale beboere og besøgende og er en fremvisning af regionens bomuldsindustri og kultur.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

—