C/2024/2893

25.4.2024

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(C/2024/2893)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Söke Pamuğu»

Αριθ. ΕΕ: PGI-TR-03016 — 2.10.2023

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)

1. **Ονομασία/-ες**

«Söke Pamuğu»

2. **Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα**

Τουρκία

3. **Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τρόφιμου**

3.1. *Τύπος προϊόντος*

Κλάση 2.14. Βαμβάκι

3.2. *Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία*

Το «Söke Pamuğu» είναι η ακατέργαστη ίνα βαμβακιού που καλλιεργείται στην περιοχή Söke. Λαμβάνεται από τις ακόλουθες ποικιλίες: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa και Nazilli 84.

Πίνακας 1

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «Söke Pamuğu»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Απόδοση βαμβακιού (kg/ha)	460-550
Μήκος ινών (mm)	28-32
Τιμή μικροναίρ	3,9-4,7
Εφελκυστική αντοχή των ινών (g/tex)	29-37
Ωριμότητα ινών (%)	0,86-0,87
Ομοιομορφία μήκους των ινών (%)	84-86
Τιμή κιτρινίσματος των ινών (+b)	7-10
Χρωματική κλίμακα	(21-1) – (41-1)
Αριθμός ξένων υλών στην ίνα (TrCnt)	9-63

([1]) ΕΕ L 343, 14.12.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Περιεκτικότητα σε βραχείες ίνες (%)	6-8
Περιεκτικότητα σε μακρές ίνες (%)	83-87
Βαθμός φωτεινότητας της ίνας (Rd)	76-87
Κάλυψη από χνούδι (%)	3-6
Δείκτης ευελιξίας	125-185
Περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	7-8,5

3.3. *Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)*

3.4. *Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής*

Τα στάδια που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής για την παραγωγή του προϊόντος «Söke Pamuğu» παρατίθενται κατωτέρω:

— Επιλογή και προμήθεια σπόρων

— Προετοιμασία εδάφους

— Φύτευση

— Άρδευση και λίπανση

— Συντήρηση φυτών (εξαιρουμένης της συγκομιδής)

— Συγκομιδή

3.5 *Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία*

-

3.6 *Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία*

Ο λογότυπος της ΠΓΕ πρέπει να τυπώνεται επί της συσκευασίας. Εάν δεν μπορεί να τυπώνεται επί της συσκευασίας, ο λογότυπος της ΠΓΕ πρέπει να είναι ορατός στον χώρο πώλησης.

4. **Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής**

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του «Söke Pamuğu» είναι το σύνολο του εδάφους της περιφέρειας Söke στην επαρχία Αϊδινίου της Τουρκίας.

5. **Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή**

Το «Söke Pamuğu» καλλιεργείται στην περιοχή Söke, με τη χρήση ποικίλων σπόρων βαμβακιού (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa και Nazilli 84). Εμφανίζει περιορισμένο βαθμό κιτρινίσματος, ενώ έχει στιλπνή όψη και μακρές ίνες. Τα νήματα που προκύπτουν από το «Söke Pamuğu» είναι λεπτά και ανθεκτικά.

Στις περιοχές της Τουρκίας όπου το βαμβάκι καλλιεργείται, οι θερμοκρασίες φθάνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οι βαμβακοφυτείες σε άλλες περιοχές επηρεάζονται δυσμενώς από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα θερινά μελτέμια που επικρατούν στην περιφέρεια Söke επιταχύνουν την εξάτμιση και τη διαπνοή στα φυτά. Οι άνεμοι αυτοί μειώνουν την υγρασία του εδάφους, με αποτέλεσμα τον μετριασμό του κινδύνου ασθενειών των φυτών και την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών. Οι συνθήκες ανέμου στην περιφέρεια Söke περιγράφονται γενικά ως ήπιες και χαμηλής έντασης. Δεδομένου ότι η περιφέρεια Söke βρίσκεται στην ενδοχώρα, επηρεάζεται λιγότερο από τη θάλασσα σε σύγκριση με τις παράκτιες περιοχές. Κατά συνέπεια, οι άνεμοι στο Söke είναι συνήθως ασθενείς και δεν φθάνουν σε υψηλές ταχύτητες. Τα μελτέμια γίνονται συχνά αισθητά κατά τους θερινούς μήνες, ιδίως το απόγευμα και το βράδυ. Οι άνεμοι αυτοί έχουν ψυκτική επίδραση και προκαλούν ελαφρά πτώση των θερμοκρασιών, αποτρέποντας έτσι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση των φυτών.

Οι σπάνιοι παγετοί στην περιοχή Söke δεν βλάπτουν τα φυτά και, ως εκ τούτου, δεν μειώνουν την απόδοση παραγωγής του βαμβακιού. Το βαμβάκι που καλλιεργείται στις περιοχές Αιγαίου, Τσουκούροβας και Νοτιοανατολικής Ανατολίας επηρεάζεται από χαμηλά επίπεδα υγρασίας και υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, το μήκος των ινών, η τιμή μικροναίρ, η εφελκυστική αντοχή των ινών, η ωριμότητα των ινών, η ομοιομορφία μήκους των ινών, η τιμή κιτρινίσματος των ινών (+b) και οι τιμές χρωματικής κλίμακας του «Söke Pamuğu» είναι υψηλότερα σε σύγκριση με το βαμβάκι άλλων περιοχών.

Το «Söke Pamuğu» συνδέεται στενά με τη δομή του εδάφους της περιφέρειας Söke. Η δομή του εδάφους αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του βαμβακιού. Η καλή αποστράγγιση, η συγκράτηση της υγρασίας και η γονιμότητα των εδαφών στηρίζουν την ανάπτυξη των ριζών του βαμβακιού και εξασφαλίζουν υγιή ανάπτυξη. Το pH του εδάφους κυμαίνεται από 6,5 έως 7,55. Η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε μακροθρεπτικά στοιχεία, όπως το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο, αυξάνει την εκκοκκιστική απόδοση του «Söke Pamuğu» και αποτρέπει τον σχηματισμό ανεπιθύμητου κίτρινου χρώματος στο βαμβάκι.

Η φύτευση σπόρων του «Söke Pamuğu» πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Η συγκομιδή πραγματοποιείται 150-155 ημέρες αργότερα, κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η συγκομιδή τον Οκτώβριο διασφαλίζει ότι η χρωματική κλίμακα του «Söke Pamuğu» κυμαίνεται μεταξύ 21-1 και 41-1. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε νήματα από βαμβάκι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικού χρώματος.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία στην περιφέρεια Söke είναι 17,4 °C. Οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 20 °C τον Ιούνιο (κατά τον σχηματισμό των καψών), τους 25 °C τον Ιούλιο (περίοδος ανθοφορίας) και τους 30 °C τον Αύγουστο (περίοδος ανάπτυξης των καψών). Το «Söke Pamuğu» δεν επηρεάζεται δυσμενώς από τη θερμική καταπόνηση. Οι κάψες ανοίγουν πλήρως κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής, όταν η θερμοκρασία μειώνεται στους 15 °C. Το πλήρες άνοιγμα των καψών κατά τη συγκομιδή επηρεάζει τη χαμηλή τιμή κιτρινίσματος του «Söke Pamuğu».

Οι ετήσιες βροχοπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 450 mm και 575 mm στην περιφέρεια Söke. Αυτό το ύψος βροχοπτώσεων εξασφαλίζει βέλτιστη ανάπτυξη και παραγωγικότητα για το «Söke Pamuğu». Ως εκ τούτου, η διαχείριση της άρδευσης και η παρακολούθηση των βροχοπτώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών του φυτού σε νερό. Κατά το στάδιο ανάπτυξης του «Söke Pamuğu» (τον Ιούνιο), το μήκος της ρίζας εκτείνεται σε βάθος 15 cm στο έδαφος. Σε αυτή την περίοδο μειωμένων βροχοπτώσεων, η απαιτούμενη ποσότητα νερού είναι περίπου 40-60 mm. Οι παραγωγοί αρδεύουν 2-3 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το νερό να μην αγγίζει άμεσα τα φυτά κατά την άρδευση, διότι αυτό συμβάλλει στην προστασία των φυτών από ασθένειες. Επιπλέον, στην παραγωγή βαμβακιού, η υπερβολική άρδευση θεωρείται γενικά ότι οδηγεί σε μείωση της ποιότητας του προϊόντος. Με την προσεκτική διαχείριση των πρακτικών άρδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα βροχοπτώσεων, οι γεωργοί μπορούν να διασφαλίζουν ότι το «Söke Pamuğu» λαμβάνει επαρκή υγρασία για την καλλιέργεια και την ανάπτυξή του. Με τον τρόπο αυτό, η ποιότητα του προϊόντος δεν μειώνεται. Η εμπειρία αυτή ενισχύει την ποιότητα του βαμβακιού και, κατά συνέπεια, την ποιότητα των νημάτων. Συνήθως, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή Söke είναι ελάχιστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την ποιότητα του προϊόντος λόγω της μειωμένης υγρασίας.

Το μήκος των ινών φθάνει στο μέγιστο σημείο του όταν η θερμοκρασία της νύχτας είναι μεταξύ 18 °C και 20 °C (ανάλογα με τον γονότυπο). Στην περιφέρεια Söke, ο σχηματισμός βαμβακιού επιτυγχάνεται περίπου την 70η έως 75η ημέρα και οι ίνες βαμβακιού σχηματίζονται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όταν η μέση θερμοκρασία της νύχτας είναι περίπου 19-23 °C. Οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 30 °C και 35 °C τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το «Söke Pamuğu» να έχει μεγαλύτερο μήκος ινών από τον μέσο όρο της Τουρκίας. Η λεπτότητα των ινών είναι ανάλογη προς το μήκος και αυξάνεται όσο αυξάνεται το μήκος. Το μήκος των ινών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βαμβακιού στην κλωστοϋφαντουργία. Τα επίπεδα επίπτωσης στην ποιότητα ποικίλλουν ανάλογα με τις μεθόδους νηματοποίησης που εφαρμόζονται στο μήκος των ινών. Το «Söke Pamuğu» έχει μέγιστο μήκος ινών 32 mm και λεπτότητα 3,9-4,7 μικρόμετρα. Αν ληφθεί ως σημείο αναφοράς το μήκος των ινών του βαμβακιού, μπορεί να χαρακτηριστεί ως βαμβάκι με «αρκετά μακρές ίνες» με βάση την κατηγορία μήκους.

Οι ποιοτικές παράμετροι του βαμβακιού, όπως το χρώμα και η τιμή μικροναίρ, επηρεάζονται περισσότερο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές τεχνικές παρά από τη γενετική δομή της ποικιλίας. Ειδικότερα, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος στη χρωματική κλίμακα και τη λεπτότητα των ινών είναι σημαντικά υψηλός.

Μετά το μήκος, η λεπτότητα είναι ένα από τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά του βαμβακιού. Καθώς αυξάνεται η λεπτότητα, ο αριθμός των νημάτων αυξάνεται και οι ατέλειες μειώνονται. Τα νήματα από λεπτές ίνες έχουν μεγαλύτερη αντοχή και ομοιομορφία από εκείνα που παράγονται από χονδρές ίνες. Η λεπτότητα του «Söke Pamuğu» κυμαίνεται από 3,9 έως 4,7 μg/ίντσα.

Η παραγωγή βαμβακιού έχει καταστεί παράδοση στην περιφέρεια Söke. Στην περιφέρεια αυτή καλλιεργείται βαμβάκι από το 1700. Κατά τη δεκαετία του 1830, τα ιστία των οθωμανικών πλοίων ήταν υφασμένα από νήματα παραγόμενα από το «Söke Pamuğu».

Μεταξύ του 1950 και του 1980, σημειώθηκε σημαντική μετανάστευση πληθυσμών από αγροτικές σε αστικές περιοχές στην Τουρκία, με αποτέλεσμα την ταχεία μείωση του πληθυσμού των χωριών. Ωστόσο, το επίπεδο εισοδήματος παρέμεινε σταθερό στην περιφέρεια Söke, χάρη στην παραγωγή βαμβακιού, και δεν υπήρξε σημαντική κινητικότητα του πληθυσμού.

Το φεστιβάλ Söke Pamuk είναι μια ετήσια παραδοσιακή εκδήλωση στην περιφέρεια Söke. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται συνήθως από την 1η έως τις 6 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση αυτή γιορτάζει την παράδοση βαμβακιού της περιοχής Söke, φέρνει σε επαφή βαμβακοπαραγωγούς και αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Το φεστιβάλ Söke Pamuk μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες δραστηριότητες, όπως επιτόπιες επισκέψεις σε βαμβακοκαλλιέργειες, επιδείξεις συγκομιδής βαμβακιού, συναυλίες, εκθέσεις, γευσιγνωσία τοπικών εδεσμάτων, παραδοσιακοί χοροί και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ αποτελεί σημείο συνάντησης για τους βαμβακοπαραγωγούς, τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες και παρουσιάζει τη βαμβακοβιομηχανία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

—