C/2024/2893

2024 4 25

Paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(C/2024/2893)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 [1] 51 straipsnį per tris mėnesius nuo šio paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Söke Pamuğu“

ES Nr.: PGI-TR-03016 – 2.10.2023

SKVN ( ) SGN (X)

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Söke Pamuğu“

2. **Valstybė narė arba trečioji šalis**

Turkija

3. **Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas**

3.1. *Produkto rūšis*

2.14 klasė. Medvilnė

3.2. *Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas*

SGN „Söke Pamuğu“ žymima Sekės regione užauginta medvilnės pluošto žaliava. Ji išgaunama iš šių veislių: „Gloria“, „Claudia“, „Carmen“, „Deltapine“, „Julia“, „Lydia“, „Beyaz Altın“, „DP396“, „Famosa“ ir „Nazilli 84“.

1 lentelė.

SGN „Söke Pamuğu“ žymimai medvilnei būdingos savybės

SAVYBĖS	VERTĖ
Medvilnės derlius (kg/ha)	460–550
Pluošto ilgis (mm)	28–32
Mikronerio rodiklis	3,9–4,7
Pluošto stipris tempiant (g/tex)	29–37
Pluošto branda (%)	0,86–0,87
Pluošto ilgio vienodumas (%)	84–86
Pluošto geltonumo rodiklis (+b)	7–10
Spalvos skalė	(21–1)–(41–1)
Priemaišų kiekis pluošte (TrCnt)	9–63

[1] OL L 343, 2012 12 14, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Trumpų pluoštų (%)	6–8
Ilgų pluoštų (%)	83–87
Pluošto blizgumo laipsnis (Rd)	76–87
Pūkelių kiekis (%)	3–6
Lankstumo indeksas	125–185
Drėgmės kiekis (%)	7–8,5

3.3. *Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavinės medžiagos (taikoma tik perdirbtiems produktams)*

3.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės auginimo etapai, kurie turi būti atlikti nustatytoje geografinėje vietovėje, yra šie:

— sėklų atranka ir įsigijimas;

— dirvos paruošimas;

— sodinimas;

— drėkinimas ir tręšimas;

— augalų priežiūra (išskyrus derliaus nuėmimą);

— derliaus nuėmimas.

3.5 *Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės*

—

3.6 *Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

Ant pakuotės turi būti atspausdintas SGN logotipas. Jei ant pakuotės negalima naudoti SGN logotipo, jis turi būti matomas prekybos vietoje.

4. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Geografinė SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės auginimo vietovė yra visa Turkijos Aidino provincijos Sekės rajono teritorija.

5. **Ryšys su geografine vietove**

SGN „Söke Pamuğu“ žymima medvilnė auginama Sekės regione iš įvairių medvilnės veislių sėklų („Gloria“, „Claudia“, „Carmen“, „Deltapine“, „Julia“, „Lydia“, „Beyaz Altın“, „DP396“, „Famosa“ ir „Nazilli 84“). Šios medvilnės gelsvėjimo koeficientas mažesnis, ji yra blizgi ir ilgesnių pluoštų. Iš SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės gauti verpalai yra ploni ir tvirti.

Turkijos regionuose, kuriuose auginama medvilnė, aukščiausia temperatūra būna birželio ir liepos mėnesiais. Aukšta temperatūra daro neigiamą poveikį kituose regionuose auginamai medvilnei. Sekės rajone vyraujantys kasmetiniai vasaros vėjai paspartina augalų drėgmės išgarinimą ir transpiraciją. Dėl šių vėjų mažėja dirvožemio drėgmė, todėl mažėja ir augalų ligų rizika ir paspartėja jų augimas. Sekės rajone vyraujantys vėjai paprastai apibūdinami kaip švelnūs ir silpni. Šis regionas yra labiau nutolęs nuo jūros, todėl čia jos įtaka mažesnė. Dėl šios priežasties Sekės vėjai paprastai būna lengvi ir nepasiekia didelio greičio. Kasmetiniai vėjai dažnai jaučiami vasarą, ypač po vidurdienio ir vakare. Šie vėjai vėsina ir šiek tiek sumažina temperatūrą, taip pat padeda išvengti problemų, susijusių su temperatūros sukeltu stresu augalams.

Nedažnos šalnos Sekės regione nepažeidžia augalų, todėl medvilnės derlingumas nesumažėja. Žemas drėgmės lygis ir aukšta temperatūra daro įtaką Egėjo, Čukurovos ir Pietryčių Anatolijos regionuose auginamai medvilnei. Todėl geografinėje SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės auginimo vietovėje pluošto ilgio, mikronerio rodiklio, pluošto stiprio tempiant, pluošto brandumo, pluošto ilgio vienodumo, pluošto geltonumo rodiklio (+b) ir spalvų skalės vertės yra didesnės nei kituose regionuose.

SGN „Söke Pamuğu“ žymimai medvilnei didelę įtaką daro Sekės rajono dirvožemio struktūra. Dirvožemio struktūra yra svarbus veiksnys, darantis įtaką vilnamedžio savybėms. Gerai drenuojami, išlaikantys drėgmę ir derlingi dirvožemiai padeda vilnamedžio šaknims vystytis ir užtikrinti sveiką augimą. Dirvožemio pH svyruoja nuo 6,5 iki 7,55. Dėl didelio maistinių makromedžiagų, tokių kaip azotas, fosforas ir kalis, kiekio dirvožemyje padidėja džinuotos SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės išeiga ir medvilnė neįgyja nepageidaujamos geltonos spalvos.

Sėklos, iš kurių auginama SGN „Söke Pamuğu“ žymima medvilnė, sėjamos paskutinę balandžio savaitę. Derliaus nuėmimo laikotarpis prasideda po 150–155 dienų, pirmąją spalio savaitę. Nuimant derlių spalio mėnesį užtikrinama, kad SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės spalvos skalė būtų 21–1 ir 41–1. Todėl šios medvilnės verpalai yra aukštos kokybės ir puikios spalvos.

Vidutinė metinė temperatūra Sekės rajone yra 17,4 °C. Birželio mėn. temperatūra yra aukštesnė nei 20 °C (kai susiformuoja vilnamedžio sėklų dėžutė), liepos mėn. – aukštesnė kaip 25 °C (žydėjimo laikotarpiu) ir rugpjūčio mėn. – aukštesnė kaip 30 °C (dėžutės brendimo laikotarpiu). Temperatūros sukeltas stresas SGN „Söke Pamuğu“ žymimai medvilnei neigiamo poveikio neturi. Derliaus nuėmimo laikotarpiu, kai temperatūra nukrenta iki 15 °C, sėklų dėžutės visiškai atsiveria. Tai, kad derlius nuimamas dėžutėms visiškai atsivėrus, lemia žemą SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės geltonumo vertę.

Sekės rajone metinis kritulių kiekis svyruoja nuo 450 mm iki 575 mm. Toks kritulių kiekis užtikrina optimalų SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės augimą ir derlingumą. Todėl siekiant patenkinti augalo vandens poreikius labai svarbu valdyti drėkinimą ir stebėti kritulius. Augimo etape (birželio mėn.) vilnamedžių, iš kurių gaunama SGN „Söke Pamuğu“ žymima medvilnė, šaknų ilgis dirvožemyje siekia 15 cm. Šiuo kritulių kiekio sumažėjimo laikotarpiu reikia apie 40–60 mm vandens. Šiuo laikotarpiu augintojai dirvą drėkina 2–3 kartus. Stengiamasi užtikrinti, kad drėkinant vanduo tiesiogiai nesiliestų su augalais – tai padeda apsaugoti augalus nuo ligų. Be to, manoma, kad auginant medvilnę dėl pernelyg didelio drėkinimo suprastėja produktų kokybė. Kruopščiai valdydami drėkinimo praktiką ir atsižvelgdami į kritulių kiekį, ūkininkai gali užtikrinti, kad SGN „Söke Pamuğu“ žymimai medvilnei pakaktų drėgmės augti ir vystytis. Todėl produkto kokybė nesuprastėja. Ši patirtis gerina medvilnės, taigi ir verpalų kokybę. Paprastai liepą ir rugpjūtį Sekėje iškrenta nedaug kritulių. Dėl tokių sąlygų pagerėja produkto kokybė, nes sumažėja drėgmė.

Ilgiausi medvilnės pluoštai užauga tada, kai nakties temperatūra yra 18–20 °C (priklausomai nuo genotipo). Sekės rajone medvilnės formavimosi procesas baigiasi maždaug 70–75 dieną, o medvilnės pluoštas susiformuoja birželio ir liepos mėn., kai vidutinė nakties temperatūra yra apie 19–23 °C. Vidutinė dienos temperatūra liepos ir rugpjūčio mėn. yra 30–35 °C. Dėl šių sąlygų SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės pluoštai yra ilgesni nei Turkijoje nustatytas vidurkis. Pluošto plonumas yra proporcingas ilgiui – kuo pluoštas ilgesnis, tuo jis plonesnis. Iš pluošto ilgio galima nuspręsti, kaip medvilnę galima panaudoti tekstilės pramonėje. Poveikio kokybei lygiai skiriasi priklausomai nuo pagal pluošto ilgį taikomų verpimo metodų. SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės pluošto ilgis ne didesnis kaip 32 mm, o plonumas – 3,9–4,7 mikrometro. Jei medvilnės pluoštą klasifikuotume pagal ilgį, jį būtų galima priskirti gana ilgų pluoštų klasei.

Medvilnės kokybės rodikliams, tokiems kaip spalva ir mikronerio rodiklis, didesnę įtaką daro aplinkos sąlygos ir auginimo metodai, o ne veislės genetinė struktūra. Visų pirma, aplinkos poveikis daro labai didelę įtaką spalvos skalei ir pluošto plonumui.

Plonumas yra antra iš labiausiai pageidaujamų medvilnės savybių, po pluošto ilgio. Kuo pluoštas plonesnis, tuo daugiau verpalų išgaunama ir tuo mažiau nevienodumų. Iš plonų pluoštų gauti verpalai tvirtesni ir vienodesni nei pagaminti iš storų pluoštų. SGN „Söke Pamuğu“ žymimos medvilnės plonumas yra 3,9–4,7 µg viename colyje.

Sekės rajone auginti medvilnę tapo tradicija. Medvilnė šiame rajone auginama nuo 1700 m. XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje iš medvilnės „Söke Pamuğu“ verpalų būdavo audžiamos Osmanų imperijos laivų burės.

1950–1980 m. Turkijoje vyko didelio masto urbanizacija, todėl sparčiai mažėjo kaimo gyventojų skaičius. Tačiau dėl medvilnės gamybos Sekės rajone pajamų lygis išliko stabilus, taip pat nėra didelio gyventojų judumo.

Sekės rajone kasmet organizuojamas tradicinis renginys – festivalis „Söke Pamuk“. Jis paprastai vyksta spalio 1–6 d. Šis renginys skirtas Sekės medvilnės gamybos tradicijai, jame susiburia medvilnės augintojai ir atkreipiamas dėmesys į turtingą regiono kultūrą.

Festivalyje „Söke Pamuk“ organizuojama įvairi veikla, pavyzdžiui, ekskursijos į medvilnės laukus, medvilnės derliaus nuėmimo demonstracijos, koncertai, parodos, vietos patiekalų degustacijos, tautiniai šokiai ir kiti kultūriniai renginiai. Šis festivalis yra medvilnės augintojų, vietos gyventojų ir lankytojų susitikimo vieta, kurioje pristatoma regiono medvilnės pramonė ir kultūra.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

—