C/2024/2893

25.4.2024.

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

(C/2024/2893)

Šī publikācija dod tiesības trīs mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas pret pieteikumu izteikt iebildumus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 ([1]) 51. pantam.

VIENOTAIS DOKUMENTS

“Söke Pamuğu”

ES Nr.: PGI-TR-03016 – 2.10.2023.

ACVN ( ) AĢIN (X)

1. **Nosaukums vai nosaukumi**

“Söke Pamuğu”

2. **Dalībvalsts vai trešā valsts**

Turcija

3. **Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts**

3.1. *Produkta veids*

2.14. grupa. Kokvilna

3.2. *Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums*

“Söke Pamuğu” ir neapstrādātas kokvilnas šķiedras, ko iegūst no Sekes [*Söke*] reģionā audzētiem kokvilnas augiem. Tās iegūst no šādām šķirnēm: “Gloria”, “Claudia”, “Carmen”, “Deltapine”, “Julia”, “Lydia”, “Beyaz Altın”, “DP396”, “Famosa” un “Nazilli 84”.

1. tabula

“Söke Pamuğu” raksturiezīmes

ĪPAŠĪBAS	ROBEŽVĒRTĪBAS
Kokvilnas ražība (kg/ha)	460–550
Šķiedru garums (mm)	28–32
Mikronārais indekss	3,9–4,7
Šķiedru stiepes stiprība (g/tex)	29–37
Šķiedru briedums (%)	0,86–0,87
Šķiedru garuma viendabīgums (%)	84–86
Šķiedru dzeltenīgums (+b)	7–10
Krāsas pakāpe	(21-1)–(41-1)
Piemaisījumi šķiedrās (TrCnt)	9–63

([1]) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Īsšķiedru saturs (%)	6–8
Garšķiedru saturs (%)	83–87
Šķiedru spilgtuma pakāpe (Rd)	76–87
Plūksnu īpatsvars (%)	3–6
Elastības indekss	125–185
Mitruma saturs (%)	7–8,5

3.3. *Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)*

3.4. *Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā*

Noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā noris šādi produkta "Söke Pamuğu" ražošanas posmi:

— sēklu selekcija un ieguve

— augsnes sagatavošana

— sēja

— apūdeņošana un mēslošana

— augu kopšana (izņemot ražas novākšanu)

— ražas novākšana

3.5 *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi*

-

3.6 *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi*

AĢIN logotipam jābūt uzdrukātam uz iepakojuma. Ja AĢIN logotipu norādīt uz iepakojuma nav iespējams, tam jābūt redzamam vietā, kur produktu pārdod.

4. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

"Söke Pamuğu" ražošanas ģeogrāfiskais apgabals ir visa Sekes reģiona teritorija, kas pieder pie Ajdinas ilčes Turcijā.

5. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

"Söke Pamuğu" ražo Sekes reģionā, izmantojot tādu dažādu kokvilnas šķirņu sēklas kā "Gloria", "Claudia", "Carmen", "Deltapine", "Julia", "Lydia", "Beyaz Altın", "DP396", "Famosa" un "Nazilli 84". Produktu raksturo samazināts dzeltenīguma rādītājs, spīdīgs izskats un garas šķiedras. No "Söke Pamuğu" iegūtie diegi ir smalki un izturīgi.

Turcijas reģionos, kuros audzē kokvilnu, jūnijs un jūlijs ir viskarstākie mēneši. Citos reģionos augošos kokvilnas augus nelabvēlīgi ietekmē gaisa augsta temperatūra. Sekes reģionā valdošais vasaras vējš *meltem* paātrina ūdens iztvaikošanu no augiem. Šis vējš samazina mitrumu augsnē, tādējādi mazinot augu slimību risku un veicinot augu attīstību. Sekes reģionā vēja apstākļi parasti tiek raksturoti kā mēreni un maigi. Tā kā apgabals atrodas iekšzemē, salīdzinājumā ar piekrastes zonām jūra to ietekmē mazāk. Tāpēc Sekes reģionā valdošie vēji parasti ir viegli un nesasniedz lielu ātrumu. *Meltem* pārsvarā pūš vasaras mēnešos, jo īpaši pēcpusdienās un vakaros. Šiem vējiem ir dzesējošs efekts, tie nedaudz samazina gaisa temperatūru un novērš problēmas, kas saistītas ar karstuma iedarbību uz augiem.

Retās salnas Sekes reģionā augiem nekaitē un tādējādi kokvilnas ražu nesamazina. Savukārt Egejas jūras, Čukurovas [*Çukurova*] un Dienvidaustrumu Anatolijas reģionos audzētos kokvilnas augus ietekmē zems mitruma līmenis un gaisa augsta temperatūra. Taču "Söke Pamuğu" gadījumā tādi parametri kā šķiedru garums, mikronārais indekss, šķiedru stiepes stiprība, šķiedru briedums, šķiedru garuma viendabīgums, šķiedru dzeltenīgums (+b) un krāsas pakāpes ir augstāki nekā kokvilnai, kas ražota citos reģionos.

"Söke Pamuğu" īpašības ir cieši saistītas ar Sekes reģiona augsnes struktūru. Augsnes struktūra ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē kokvilnas augu īpašības. Labi drenēta, mitrumu noturoša un auglīga augsne veicina kokvilnas augu sakņu attīstību un nodrošina veselīgu augšanu. Augsnes pH ir no 6,5 līdz 7,55. Pateicoties tam, ka augsne ir bagāta tādiem makroelementiem kā slāpeklis, fosfors un kālijs, kokvilnas "Söke Pamuğu" lietderīgais iznākums ir lielāks, turklāt kokvilnas pogaļas neiegūst nevēlamu dzeltenīgumu.

"Söke Pamuğu" sēšana noris aprīļa pēdējā nedēļā. Ražas novākšanas periods sākas 150–155 dienas vēlāk, proti, oktobra pirmajā nedēļā. Ražas novākšana, kas noris oktobrī, nodrošina, ka "Söke Pamuğu" krāsa atbilst 21-1 un 41-1. Tas ļauj iegūt augstas kvalitātes un izcilas krāsas kokvilnas diegus.

Gada vidējā temperatūra Sekes reģionā ir 17,4 °C. Jūnijā (pogaļu veidošanās laiks) temperatūra ir virs 20 °C, jūlijā (ziedēšanas periods) – virs 25 °C un augustā (pogaļu attīstības periods) – virs 30 °C augustā. Kokvilnas "Söke Pamuğu" augi nav pakļauti karstuma ietekmei. Ražas novākšanas laikā, kad temperatūra nokrītas līdz 15 °C, pogaļas ir pilnībā atvērušās. "Söke Pamuğu" zemo dzeltenīguma pakāpi nosaka tas, ka pogaļu pilnīgā atvēršanās notiek ražas novākšanas laikā.

Sekes reģionā gada nokrišņu daudzums svārstās no 450 līdz 575 mm. Šāds nokrišņu daudzums nodrošina optimālu "Söke Pamuğu" augšanu un ražīgumu. Tādēļ apūdeņošanas pārvaldībai un nokrišņu uzraudzībai ir izšķiroša nozīme, lai augiem nodrošinātu vajadzīgo ūdens apjomu. "Söke Pamuğu" augšanas posmā (jūnijā) saknes augsnē sniedzas līdz 15 cm dziļumam. Šajā periodā, kad nokrišņu daudzums samazinās, vajadzīgais ūdens daudzums ir aptuveni 40–60 mm. Šajā laikā ražotāji kultūras apūdeņo 2–3 reizes. Tie gādā, lai apūdeņošanas laikā ūdens tieši neskartu augus, un tas palīdz aizsargāt augus no slimībām. Turklāt kokvilnas ražošanā kopumā tiek uzskatīts, ka pārmērīga apūdeņošana izraisa produktu kvalitātes pasliktināšanos. Rūpīgi pārvaldot apūdeņošanu un ņemot vērā nokrišņu daudzumu, lauksaimniekiem ir iespēja kokvilnas "Söke Pamuğu" augiem nodrošināt to augšanai un attīstībai piemērotu mitrumu. Tādējādi produktu kvalitāte nepasliktinās. Šāda prakse uzlabo kokvilnas augu un līdz ar to arī kokvilnas diegu kvalitāti. Jūlijā un augustā nokrišņu daudzums Sekē parasti ir neliels. Šie apstākļi, kad mitruma līmenis ir zemāks, palielina produkta kvalitāti.

Šķiedras kļūst garākas, kad temperatūra naktī ir 18–20 °C (atkarībā no genotipa). Sekes reģionā kokvilnas pogaļas pilnībā izveidojas aptuveni 70.–75. dienā, kokvilnas šķiedras veidojas jūnijā un jūlijā, kad nakts vidējā temperatūra ir aptuveni 19–23 °C. Jūlijā un augustā dienas vidējā temperatūra ir 30–35 °C. Pateicoties šiem laikapstākļiem, "Söke Pamuğu" šķiedras ir garākas par citviet Turcijā ražoto šķiedru vidējo garumu. Šķiedru smalkums ir proporcionāls garumam, un tas pieaug atkarībā no garuma. Šķiedru garums nosaka to, kā kokvilnu varēs izmantot tekstilrūpniecībā. Ietekme uz kvalitāti ir atkarīga no vērpšanas metodēm, ko izmanto attiecīgajam šķiedru garumam. Maksimālais "Söke Pamuğu" šķiedras garums ir 32 mm un smalkums ir 3,9–4,7 mikrometri. Pamatojoties uz šķiedru garuma klasifikāciju, kokvilnas šķiedru garumu var klasificēt kategorijā "samērā garas šķiedras".

Kokvilnas kvalitātes parametrus, piemēram, krāsu un mikronāro indeksu, vairāk ietekmē vides apstākļi un audzēšanas paņēmieni, nevis šķirnes ģenētiskā struktūra. Šķiedru krāsas pakāpi un smalkumu visvairāk ietekmē vides apstākļi.

Pēc garuma nākamā vispieprasītākā kokvilnas īpašība ir šķiedras smalkums. Jo smalkākas šķiedras, jo lielāks diega numurs un mazāks neviendabīgums. No smalkām šķiedrām izgatavoti diegi ir izturīgāki un viendabīgāki nekā tie, kas izgatavoti no biezām šķiedrām. "Söke Pamuğu" smalkums ir 3,9–4,7 µg/collas.

Sekes reģionā kokvilnas ražošana ir kļuvusi par tradicionālu nozari. Kokvilnu šeit audzē kopš 1700. gada. 19. gadsimta 30. gados osmaņu kuģu buras tika austas no diegiem, kas izgatavoti no "Söke Pamuğu".

Turcijā no 1950. līdz 1980. gadam lauku iedzīvotāji masveidā migrēja uz pilsētām, kā rezultātā strauji samazinājās ciematu skaits. Tomēr, pateicoties kokvilnas ražošanai ienākumu līmenis Sekes reģionā ir saglabājies stabils un iedzīvotāju mobilitāte nav bijusi pārāk liela.

Festivāls "Söke Pamuk" ir ikgadējs tradicionāls pasākums Sekes reģionā. Parasti tas notiek no 1. līdz 6. oktobrim. Šis pasākums godina Sekes kokvilnas ražošanas tradīcijas, apvieno kokvilnas ražotājus un iepazīstina apmeklētājus ar reģiona kultūras mantojumu.

Festivālā "Söke Pamuk" tiek piedāvāti dažādi pasākumi, tostarp ekskursijas uz kokvilnas laukiem, kokvilnas ražas novākšanas demonstrēšana, koncerti, izstādes, vietējo ēdienu degustēšana, tautas dejas un citi kultūras pasākumi. Festivāls ir vieta, kurā tiekas kokvilnas ražotāji, reģiona vietējie iedzīvotāji un apmeklētāji, un tas iepazīstina ar kokvilnas nozari un kultūru reģionā.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

—