C/2024/2893

25.4.2024

Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2), točka (a), Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(C/2024/2893)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ([1]) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek v treh mesecih od datuma te objave.

ENOTNI DOKUMENT

„Söke Pamuğu“

EU št.: PGI-TR-03016 – 2. oktober 2023

ZOP ( ) ZGO (X)

1. **Ime**

„Söke Pamuğu“

2. **Država članica ali tretja država**

Turčija

3. **Opis kmetijskega proizvoda ali živila**

3.1. *Vrsta proizvoda*

Skupina 2.14 Bombaž

3.2. *Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1*

„Söke Pamuğu“ je surovo bombažno vlakno, ki se prideluje v regiji Söke. Pridobiva se iz naslednjih sort: gloria, claudia, carmen, deltapine, julia, lydia, beyaz altın, DP396, famosa in nazilli 84.

Preglednica 1

Značilnosti „Söke Pamuğu“

ZNAČILNOSTI	VREDNOST
Donos bombaža (kg/ha)	460–550
Dolžina vlakna (mm)	28–32
Mikronerska vrednost	3,9–4,7
Natezna trdnost vlaken (g/tex)	29–37
Zrelost vlaken (%)	0,86–0,87
Izenačenost dolžine vlaken (%)	84–86
Vrednost porumenelosti vlaken (+b)	7–10
Barvni razred	(21-1)–(41-1)
Količina nečistoč v vlaknih (TrCnt)	9–63

([1]) UL L 343, 14.12.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Vsebnost kratkih vlaken (%)	6–8
Vsebnost dolgih vlaken (%)	83–87
Stopnja svetlosti vlaken (Rd)	76–87
Prekritost s kosmi (%)	3–6
Indeks prožnosti	125–185
Delež vlage (%)	7–8,5

3.3. *Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)*

3.4. *Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju*

Faze, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju za proizvodnjo bombaža „Söke Pamuğu“, so navedene v nadaljevanju:

— izbor in nabava semen,

— priprava tal,

— sajenje,

— namakanje in gnojenje,

— vzdrževanje rastlin (razen pobiranja),

— pobiranje.

3.5 *Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime*

–

3.6 *Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime*

Logotip ZGO mora biti natisnjen na embalaži. Če ga ni mogoče uporabiti na embalaži, mora biti viden na prodajnem mestu.

4. Jedrnata opredelitev geografskega območja

Geografsko območje za proizvodnjo bombaža „Söke Pamuğu“ je celotno ozemlje okrožja Söke v provinci Aydın v Turčiji.

5. Povezava z geografskim območjem

Bombaž „Söke Pamuğu“ se prideluje v regiji Söke z uporabo različnih semen bombaža (gloria, claudia, carmen, deltapine, julia, lydia, beyaz altın, DP396, famosa in nazilli 84). Je manj dovzeten za porumenitev, ima bleščeč videz in podaljšana vlakna. Preja, pridobljena iz bombaža „Söke Pamuğu“, je fina in trdna.

V regijah Turčije, kjer se prideluje bombaž, so temperature najvišje junija in julija. V drugih regijah visoke temperature škodijo bombaževcem. Prevladujoči poletni vetrovi „meltemi“ v okrožju Söke pospešujejo izhlapevanje in transpiracijo pri rastlinah. Zaradi teh vetrov je vlaga v tleh manjša, kar zmanjšuje tveganje za bolezni rastlin in spodbuja njihovo rast. Vetrne razmere v okrožju Söke na splošno veljajo za blage in nežne. Ker v primerjavi z obalnimi območji leži bolj v notranjosti, ima morje manjši vpliv nanj. Zato so vetrovi v okrožju Söke običajno šibki in ne dosegajo visokih hitrosti. Vetrovi „meltemi“ se pogosto pojavijo v poletnih mesecih, zlasti popoldne in zvečer. Ti vetrovi imajo hladilni učinek in nekoliko nižajo temperature ter preprečujejo težave, povezane z vročinskim stresom pri rastlinah.

Redke zmrzali v regiji Söke ne škodujejo rastlinam, zato se donos proizvodnje bombaža zaradi njih ne zmanjša. Na bombaž, ki se prideluje v regijah Egej, Çukurova in Jugovzhodna Anatolija, vplivajo nizke stopnje vlažnosti in visoke temperature. Zato so dolžina vlaken, mikronerska vrednost, natezna trdnost vlaken, zrelost vlaken, izenačenost dolžine vlaken, vrednost porumenelosti vlaken (+b) in barvni razred bombaža „Söke Pamuğu“ boljši kot pri bombažu iz drugih regij.

Bombaž „Söke Pamuğu“ je tesno povezan s strukturo tal v okrožju Söke. Struktura tal je pomemben dejavnik, ki vpliva na značilnosti bombaževca. Dobro odcedna in rodovitna tla, ki zadržujejo vlago, podpirajo razvoj korenin bombaževca in zagotavljajo zdravo rast. Vrednost pH tal sega od 6,5 do 7,55. Zaradi visoke vsebnosti makrohranil, kot so dušik, fosfor in kalij, v tleh je donos pri odzrnjevanju bombaža „Söke Pamuğu“ večji, poleg tega pa to preprečuje nastanek nezaželene rumene barve bombaža.

Semena za bombaž „Söke Pamuğu“ se sejejo v zadnjem tednu aprila. Pridelek se pobira 150–155 dni pozneje, tj. prvi teden v oktobru. S tem se zagotovi, da se bombaž „Söke Pamuğu“ uvršča v barvni razred med 21–1 in 41–1. Posledično je bombažna preja visoke kakovosti in odlične barve.

Povprečna letna temperatura v okrožju Söke je 17,4 °C. Temperature so junija (ko nastanejo semenski mešički) višje od 20 °C, julija (med cvetenjem) višje od 25 °C, avgusta (v obdobju razvoja semenskih mešičkov) pa višje od 30 °C. Temperaturni stres ne škoduje bombažu „Söke Pamuğu“. V obdobju pobiranja, ko temperatura pade na 15 °C, se semenski mešički popolnoma odprejo. Popolno odprtje vpliva na nizko vrednost porumenelosti bombaža „Söke Pamuğu“.

Letna količina padavin v okrožju Söke se giblje med 450 mm in 575 mm. Ta količina padavin zagotavlja optimalno rast in produktivnost za bombaž „Söke Pamuğu“. Upravljanje namakanja in spremljanje padavin sta zato ključna za zadovoljitev potreb rastline po vodi. V fazi rasti bombaža „Söke Pamuğu“ (junija) dolžina korenin sega do globine 15 cm v tla. V tem obdobju manjše količine padavin potrebna količina vode znaša približno 40–60 mm. Proizvajalci v tem obdobju namakajo dva- do trikrat. Zagotoviti je treba, da voda med namakanjem ne pride v neposreden stik z rastlinami, saj jih to pomaga zaščititi pred boleznimi. Poleg tega pri proizvodnji bombaža na splošno velja, da se zaradi čezmernega namakanja zmanjša kakovost proizvoda. Kmetje lahko s skrbnim upravljanjem namakalnih praks in upoštevanjem količin padavin zagotovijo ustrezno vlago za rast in razvoj bombaža „Söke Pamuğu“. Tako se kakovost proizvoda ne zmanjša. S temi izkušnjami se izboljšata kakovost bombaža in posledično kakovost preje. Julija in avgusta je v okrožju Söke običajno malo padavin. V teh razmerah manjše vlage se izboljša kakovost proizvoda.

Vlakna dosežejo največjo dolžino, ko je nočna temperatura 18–20 °C (odvisno od genotipa). V okrožju Söke se bombažna vlakna razvijejo med 70. in 75. dnem, tj. junija in julija, ko je povprečna nočna temperatura približno 19–23 °C. Julija in avgusta je povprečna dnevna temperatura 30–35 °C. Zaradi teh razmer ima bombaž „Söke Pamuğu“ daljša vlakna od turškega povprečja. Finost vlaken je sorazmerna z dolžino, kar pomeni, da je večja ob večji dolžini. Dolžina vlaken kaže, kako se lahko bombaž uporablja v tekstilni industriji. Stopnje vpliva na kakovost se razlikujejo glede na metode predenja, ki se uporabljajo za dolžino vlaken. Dolžina vlaken „Söke Pamuğu“ je največ 32 mm, finost pa znaša 3,9–4,7 mikrometra. Dolžino bombažnih vlaken je mogoče uvrstiti v razred „precej dolgih“ vlaken.

Na parametre kakovosti bombaža, kot sta barva in mikronerska vrednost, bolj vplivajo okoljski pogoji in tehnike pridelave kot genetska struktura sorte. Okolje ima zlasti velik vpliv na barvni razred in finost vlaken.

Finost je za dolžino ena najbolj iskanih značilnosti bombaža. Čim večja je finost, tem večja je dolžinska masa preje in tem manjše je število nepravilnosti. Preje iz finih vlaken so močnejše in enakomernejše od prej iz debelih vlaken. Finost bombaža „Söke Pamuğu“ je 3,9–4,7 µg/inč.

Proizvodnja bombaža je v okrožju Söke postala tradicija. Bombaž se v okrožju prideluje od leta 1700. V tridesetih letih 19. stoletja so bile jadra otomanskih ladij izdelana iz preje, proizvedene iz bombaža „Söke Pamuğu“.

Med letoma 1950 in 1980 se je v Turčiji veliko ljudi preselilo s podeželja v mesta, zato se je število prebivalcev v vaseh hitro zmanjšalo. Vendar je raven dohodka v okrožju Söke zaradi proizvodnje bombaža ostala stabilna, večjih migracij prebivalcev pa ni bilo.

Festival Söke Pamuk je vsakoletni tradicionalni dogodek v okrožju Söke. Običajno poteka med 1. in 6. oktobrom. Ta dogodek je posvečen tradiciji proizvodnje bombaža v okrožju Söke, združuje proizvajalce bombaža, na njem pa se poudarja kulturno bogastvo regije.

Na festivalu Söke Pamuk lahko potekajo različne dejavnosti, vključno z izleti na bombažna polja, predstavitvami pobiranj bombaža, koncerti, razstavami, degustacijami lokalnih jedi, ljudskim plesom in drugimi kulturnimi prireditvami. Festival je stičišče proizvajalcev bombaža, krajanov in obiskovalcev, na njem se predstavljata industrija in kultura bombaža v regiji.

Sklic na objavo specifikacije

–