C/2025/4398

1.8.2025

**Offentliggörande av en ansökan om registrering av en geografisk beteckning i enlighet med artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1143**

(C/2025/4398)

I enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1143 ([1]) får myndigheterna i en medlemsstat eller ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med ett berättigat intresse och som är etablerad eller bosatt i ett tredjeland lämna in en invändning till kommissionen inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

Den produktspecifikation som avses i artikel 49 i förordning (EU) 2024/1143 finns i unionsregistret över geografiska beteckningar

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

**”Yenice Ihlamur Balı”**

**EU-nr: PDO-TR-03362 – 25.10.2024**

**SUB (X) SGB ( )**

1. **Namn**

”Yenice Ihlamur Balı”

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Turkiet

3. **Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet**

3.1 *Klassificering av jordbruksprodukten*

KN-nummer. 04

3.2 *Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt*

”Yenice Ihlamur Balı” är en blomsterhonung som produceras av bin som samlar nektar från silverlind (*Tilia tomentosa Moench*) och kaukasisk lind (*Tilia rubra* DC. subsp. *caucasica*), som växer naturligt i distriktet Yenice i provinsen Karabük. ”Yenice Ihlamur Balı” ingår i kategorin blomsterhonung grundat på dess källa, och den klassificeras som en underrepresenterad sorthonung med lågt polleninnehåll.

De primära nektarkällorn som kännetecknar ”Yenice Ihlamur Balı” inbegriper *Tilia* (lind), *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi, Erica* och taxa från *Rosaceae* (familjen rosväxter), till exempel *Rubus*, *Crataegus* och *Rosa*. ”Yenice Ihlamur Balı” måste innehålla pollen från *Tilia*-arter tillsammans med pollen från minst två av dessa sju taxa. Dessutom bör den övergripande pollenprofilen för ”Yenice Ihlamur Balı” överensstämma med taxonförteckningen som redovisas i tabell 1 (men alla taxa måste inte finnas i honungen samtidigt).

”Yenice Ihlamur Balı” varierar i färg från gul till bärnstensfärgad. Dess smak och arom är typiska för den flora från vilken den erhålls. Den är flytande och ger ingen bitter smak i mun eller svalg när den konsumeras. Vid korrekta lagringsförhållanden kristalliserar den långsamt, vilket leder till en måttlig nivå av kristallisation. Vid kristallisationen bildar den mjuka kristaller som inte lämnar någon oangenäm smak på tungan. Den särpräglade doften av lindblommor uppfattas tydligt när bikupans lock öppnas eller när honung som utvunnits ur vaxkakorna tas ur sin förpackning. De kvalitetsparameter som ger ”Yenice Ihlamur Balı” dess särskilda egenskaper redovisas i tabell 2.

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1143 av den 11 april 2024 om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt garanterade traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbegrepp för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2019/787 och (EU) 2019/1753 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012 (EUT L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

*Tabell 1*

**Pollenprofilen hos ”Yenice Ihlamur Balı”**

| Taxa | Taxa | Taxa |
|---|---|---|
| *Agrimonia* sp. | *Fragaria vesca* | Pinaceae |
| Amaranthaceae | *Galium* sp. | *Plantago lanceolata* |
| *Anagallis* sp. | *Genista* sp. | Poacaea |
| *Anthyllis* sp. | Gentianaceae | *Portulaca* sp. |
| Apiacaea | *Helianthemum* sp. | Ranunculaceae |
| *Artemisia* sp. | *Helianthus annus* | *Ranunculus* sp. |
| Asteraceae | *Hypericum* sp. | *Rhododendron* sp. |
| *Betula* sp. | Lamiaceae | *Rosa canina* |
| Boraginaceae | *Lamium* sp. | Rosaceae |
| Brassicaceae | *Lathyrus* sp. | *Rubus* sp. |
| *Campanula* sp. | *Laurus nobilis* | *Rumex* sp. |
| Caryophyllaceae | *Ligustrum* sp. | *Salix* sp. |
| *Castanea sativa* | Liliaceae | *Sambucus* sp. |
| *Centaurea* sp. | *Limonium* sp. | *Scabiosa* sp. |
| *Centaurium* sp. | *Linaria* sp. | *Silene* sp. |
| *Cichorium* sp. | *Lotus* sp. | *Symphytum* sp. |
| *Cirsium arvense* | Malvaceae | *Taraxacum* sp. |
| *Cistus creticus* | *Melilotus* sp. | *Teucrium* sp. |
| *Clematis vitalba* | *Myosotis* sp. | *Thymus* sp. |
| *Cornus sanguinea* | *Nepeta* sp. | *Tilia* sp. |
| *Coronilla* sp. | *Nigella* sp. | *Trifolium pratense* |
| *Crataegus* sp. | Oleaceae | *Trifolium repens* |
| *Cynoglossum* sp. | *Onobrychis* sp. | *Trifolium resupinatum* |
| *Echium vulgare* | *Onosma* sp. | *Trifolium* sp. |
| *Erica* sp. | *Origanum* sp. | *Trifolium speciosum* |
| *Eryngium* sp. | *Paliuris spina-christi* | *Verbascum* sp. |
| *Euphorbia* sp. | Papaveraceae | *Vicia* sp. |
| Fabaceae | *Phlomis* sp. | *Xanthium* sp. |
| *Filipendula* sp. | *Pilosella* sp. | *Zea mays* |

*Tabell 2*

**Fysikalisk-kemiska egenskaper hos ”Yenice Ihlamur Balı”**

| Parametrar | Värden |
|---|---|
| Prolin (mg/kg, min.) | 300 mg/kg. |
| Fruktos + glukos (g/100 g, min.) | 60g/100 g |
| Antal diastaser (min.) | 8 |

| Parametrar | Värden |
|---|---|
| HMF (mg/kg, max.) | 18 mg/kg. |
| Fruktos/glukos | 0,9 – 1,4 |
| Fukt (max. %) | 20 % |
| Sackaros (g/100 g, max.) | 4g/100 g |
| Maltos (max. %) | 4 % |
| Fria syror (mekv/kg, max.) | 50 mekv/kg |
| Ej vattenlösliga ämnen (g/100 g, max.) | 0,1 g/100 g |

3.3 *Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)*

–

3.4 *Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området*

Alla steg i produktionsprocessen måste äga rum i det avgränsade geografiska området.

3.5 *Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser*

–

3.6 *Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser*

Följande logotyp är obligatorisk för alla produkter som bär namnet ”Yenice Ihlamur Balı”




4. **Kort beskrivning av det geografiska området**

Provinsen Karabük är belägen i den västra delen av Svartahavsområdet. Det geografiska området där ”Yenice Ihlamur Balı” produceras består av distriktet Yenice i provinsen Karabük i Turkiet.

5. **Samband med det geografiska området**

*Specifika uppgifter om produkten*

”Yenice Ihlamur Balı” kännetecknas av den särpräglade och mångskiftande flora i vilken den har sitt ursprung, trots att den produceras inom ett geografiskt begränsat skogsområde. Pollenanalys bekräftar att honungen måste innehålla pollen från *Tilia*-arter tillsammans med minst två taxa valda från *Sambucus*, *Clematis vitalba*, *Paliurus spina-christi*, *Erica* och medlemmar i familjen Rosaceae (rosväxter), särskilt *Rubus*, *Crataegus* och *Rosa*. Vidare måste pollenspektrumet innehålla företrädare för den bredare floristiska profil som redovisas i tabell 1. Sammanlagt har pollen från 86 taxa av växter som är inhemska i regionen identifierats, vilket bidrar till honungens komplexa botaniska ursprung. Denna unika sammansättning, som formas av distriktet Yenices rika och ostörda skogsekosystem, ger en särpräglad doftprofil och särskilda organoleptiska egenskaper som skiljer ”Yenice Ihlamur Balı” från andra sort- och blandhonungar som är blomsterhonungar.

*Naturliga faktorer*

I en studie från 1999 fastställde Världsnaturfonden (WWF) att skogarna i Yenice är bland Europas 100 biologiskt rikaste, som snabbt måste skydda, och ett av de 122 viktiga naturområdena i Turkiet. Enligt undersökningar genomförda av forskare kännetecknas sådana viktiga områden av att de är rika på endemiska arter, att de innehåller skogstyper som är specifika för Europa och att de omfattar ett betydande landområde med hög risk för förlust av livsmiljöer. Yeniceskogarna är ett av nio sådana områden. Klimatet i Yenice påverkas delvis av Svartahavsklimatet, men även effekterna av ett kontinentalt klimat märks i inlandsområdena. Genom att regionen utgör ett övergångsområde mellan dessa klimattyper har det varierade klimatet bidragit till områdets rika flora. En mikroklimateffekt märks i dalgången längs Yenicefloden, som löper genom distriktet. Området får nederbörd under alla årstider. Det har kalla vintrar, svala somrar och ett klimat som allmänt präglas av fukt, regn och dimma.

87 % av distriktet Yenice är skogbeklätt. I skogarna i Yenice finns 312 växttaxa, vara 51 är endemiska. Lindar utgör ett betydande inslag i den rika växtligheten. Inom de geografiska gränserna växer lindarna i en kuperat område, vilket gör det svårt att samla in blad och blommor från träden. Detta gör att lindarna i stället blir en potentiell källa till nektar för honungsbin. Den kuperade terrängen i området har dessutom förhindrat utbyggnad av bostadsområden och utveckling av industri. Att regionen i stort sett är opåverkad av mänsklig verksamhet har bidragit till att bevara dess orörda ekosystem och skydda den från olika föroreningsfaktorer. Detta återspeglas även i kvaliteten på ”Yenice Ihlamur Balı”.

*Orsakssamband*

På grund av den kuperade terrängen i den centrala delen av distriktet Yenice och dess skogar har bebodda områden förblivit begränsade, vilket har låtit lindar sprida sig över vidsträckta områden. Det finns inga tunga industriföretag i distriktet, och lokalbefolkningens inkomstkälla är skogen.

Honungens rika sammansättning beror på det stora antalet lindar och mångfalden av inhemska växter i Yeniceskogarna, som är de primära och sekundära nektarkällorna och ger ”Yenice Ihlamur Balı” en smak och doft som är speciell för den flora i vilken den har sitt ursprung.

**Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen**

Denna geografisk beteckning har registrerats för skydd från och med den 14 december 2022 i Turkiets patent- och varumärkesverks e-bulletin nr 1456 och registrerades officiellt den 22.8.2023.