KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 17. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2006/784/EK, ar ko nosaka metodes cūku liemeņu klasificēšanai Francijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3419)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2007/510/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1984. gada 13. novembra Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai [1], un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Lēmumu 2006/784/EK [2] ir apstiprinātas trīs metodes cūku liemeņu klasificēšanai Francijā.

(2) Francijas valdība ir lūgusi Komisiju apstiprināt divas jaunas cūku liemeņu klasificēšanas metodes un ir nosūtījusi secēšanas procesa aprakstu, iesniedzot protokola otro daļu, kā paredzēts 3. panta 3. punktā Komisijas 1985. gada 24. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2967/85, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai [3].

(3) No šā pieprasījuma novērtējuma izriet, ka ir izpildīti minēto klasificēšanas metožu apstiprināšanas nosacījumi.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/784/EK 1. panta pirmajai daļai pievieno šādus d) un e) apakšpunktus:

"d) *Autofom* aparātu un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru apraksts sniegts pielikuma 4. daļā;

e) *UltraFom 300* aparātu un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru apraksts sniegts pielikuma 5. daļā."

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 17. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL

---

[1] OV L 301, 20.11.1984., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3513/93 (OV L 320, 22.12.1993., 5. lpp.).

[2] OV L 318, 17.11.2006., 27. lpp.

[3] OV L 285, 25.10.1985., 39. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1197/2006 (OV L 217, 8.8.2006., 6. lpp.).

PIELIKUMS

Lēmuma 2006/784/EK pielikumu papildina ar šādu 4. un 5. daļu:

"4. DAĻA

AUTOFOM

1. Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu *Autofom*.

2. Aparāts ir aprīkots ar sešpadsmit 2 MHz ultraskaņas devējiem (*SFK Technology, K2KG*), kur darbības attālums starp ultraskaņas devējiem ir 25 milimetri.

   Ultraskaņas dati ietver muguras tauku slāņa un muskuļu slāņa biezuma mērījumu.

   Mērījumu rezultātus ar galvenā aparāta palīdzību izsaka kā liesās gaļas procentuālā satura aprēķinu.

3. Liemeņa liesās gaļas procentuālo daudzumu aprēķina, pamatojoties uz 23 mērpunktiem saskaņā ar šādu formulu:

   $\hat{Y}$ = 69,4808 – 0,09178*X0 – 0,08778*X7 – 0,02047*X9 – 0,06525*X19 – 0,03135*X21 – 0,01352*X26 – 0,01257*X29 + 0,00660*X31 + 0,00726*X36 – 0,11207*X48 – 0,31733*X60 – 0,12530*X64 – 0,03016*X83 – 0,28903*X88 – 0,15229*X91 – 0,03713*X92 + 0,09666*X100 – 0,08611*X101 + 0,01797*X113 + 0,03736*X115 + 0,03356*X116 + 0,01313*X121 + 0,01547*X123,

   kur:

   $\hat{Y}$ = aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais daudzums,

   X0, X7 … X123 ir mainīgie lielumi, kuri noteikti ar *Autofom*.

4. Mērpunktu apraksts un statistikas metode iekļauta Francijas iesniegtā protokola II daļā, kas nosūtīta Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2967/85 3. panta 3. punktu.

   Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 45 līdz 125 kilogramiem.

5. DAĻA

ULTRAFOM 300

1. Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu *UltraFom 300*.

2. Aparāts ir aprīkots ar 3,5 MHz ultraskaņas zondi (*SFK Technology 3,5 64LA*), kuras garums ir 5 cm un kura sastāv no 64 ultraskaņas devējiem. Ultraskaņas signālu mikroprocesors pārvērš ciparu formātā, saglabā un apstrādā.

   Mērījumu rezultātus *UltraFom* aparāts izsaka kā liesās gaļas procentuālā daudzuma aprēķinu.

3. Liemeņa liesās gaļas procentuālo daudzumu aprēķina pēc šādas formulas:

   $\hat{Y}$ = 66,49 – 0,891 G + 0,104 M,

   kur:

   $\hat{Y}$ = aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais daudzums,

   G = tauku kārtas biezums (ieskaitot ādu), kas mērīts starp otro un trešo pēdējo ribu 7 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas, perpendikulāri ādai (milimetros),

   M = muskuļu biezums, kas mērīts starp otro un trešo pēdējo ribu 7 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas, perpendikulāri ādai (milimetros).

   Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 45 līdz 125 kilogramiem."