A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1794 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 22.)

a „Boumatic Iodine product family” biocidtermék-család uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2015. augusztus 21-én a Boumatic Gascoigne Melotte az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be egy, a rendelet V. melléklete szerinti 3. terméktípushoz tartozó, „Boumatic Iodine product family” nevű biocidtermék-család engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes holland hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-PG019260-52 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2) A „Boumatic Iodine product family” elnevezésű termékcsalád jódot tartalmaz hatóanyagként, amely szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében. Tekintettel a hatóanyag lényegi tulajdonságaira, valamint az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([2]) foglalt, az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumokra, a Bizottság mérlegelni fogja a jód, többek között a poli(vinil-pirrolidon) jód jóváhagyása felülvizsgálatának szükségességét az 528/2012/EU rendelet 15. cikkének megfelelően. A Bizottság a felülvizsgálat eredményétől függően határoz arról, hogy az 528/2012/EU rendelet 48. cikkével összhangban felül kell-e vizsgálni a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó termékek uniós engedélyeit.

(3) 2018. április 10-én az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség).

(4) 2019. április 4-én az ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt ([3]) nyújtott be a Bizottsághoz, amely tartalmazta a „Boumatic Iodine product family” termékcsaládhoz tartozó biocid termék jellemzői összefoglalójának tervezetét (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója) és a biocidtermék-családra vonatkozó végleges értékelési jelentést. Véleményében az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a „Boumatic Iodine product family” az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének s) pontja szerinti biocidtermék-család, amelynek az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és amely – feltéve, hogy megfelel a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesíti a rendelet 19. cikkének (1) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(5) 2019. június 20-án az ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.

(6) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, vagyis úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni a „Boumatic Iodine product family” termékcsaládnak.

(7) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Boumatic Gascoigne Melotte EU-0020541-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „Boumatic Iodine product family” biocidtermék-családnak a biocid termék jellemzőire vonatkozó, a mellékletben szereplő összefoglalóval összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

([2]) A Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 4.) az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumoknak az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 301., 2017.11.17., 1. o.)

([3]) Az ECHA 2019. február 27-i véleménye a „Boumatic Iodine product family” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/220/2019).

Az uniós engedély 2019. november 18-tól 2029. október 31-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

Boumatic Iodine product family

3. terméktípus – Állat-egészségügy (Fertőtlenítőszerek)

Engedélyszám: EU-0020541-0000

R4BP eszközszám: EU-0020541-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1. **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Termékcsalád neve**

Név	Boumatic Iodine product family

1.2. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)

1.3. **Engedélyes**

Az engedélyes neve és címe	Név	Boumatic Gascoigne Melotte
	Cím	31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgium
Engedélyszám	EU-0020541-0000	
R4BP eszközszám	EU-0020541-0000	
Az engedélyezés dátuma	2019. november 18.	
Az engedély léjáratának dátuma	2029. október 31.	

1.4. **Biocid termékek gyártója/gyártói**

A gyártó neve	Christeyns n.v.
A gyártó címe	Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgium
Gyártási helyek	Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgium

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Jód
A gyártó neve	Christeyns n.v.
A gyártó címe	Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgium

Gyártási helyek	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Chile

2. **TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **Termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,5
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Formuláció típusa(i)**

Formuláció(k)	AL – Egyéb folyadék

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

META-SPC 1

1. **META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV ADATAI**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosítója**

Azonosító	meta SPC 1

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-1

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 1 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 1 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,44	0,5
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **A meta-SPC 1 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	AL – Egyéb folyadék

3. **A META-SPC 1 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	A használatot követően a(z) kezet-t alaposan meg kell mosni. szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 1 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

1 táblázat. # 1 használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszerek manuális bemerítéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítőszerek fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális bemerítéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemerítés fejés előtt: min. 1 perc behatási idő fejés után: min. 5 perc behatási idő
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, kezelésenként legfeljebb 10 ml-t – A termék használatra kész naponta 2-szer
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni, bemerítéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t.

Töltse meg a tőgybimbó-mosó csészét a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. Minden kezelésnél ügyelni kell a termék mennyiségére. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és szemvédő eszközt.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.2. **A felhasználás leírása**

2 táblázat. # 2 használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszerek manuális permetezéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítőszerek fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális permetezéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás fejés előtt: min. 1 perc behatási idő, fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t – A termék használatra kész naponta 2-szer
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.2.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni permetezéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t.

Töltse meg a permetezőedényt a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.2.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben), védőruhát, a vegyi anyagoknak ellenálló lábbelit és szemvédő eszközt.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3. **A felhasználás leírása**

3 táblázat. # 3 használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszerek automata bemerítéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgy automata merítéses kezelése
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemerítés fejés előtt: min. 1 perc behatási idő, fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t – A termék használatra kész naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.3.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni bemerítéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.3.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4. **A felhasználás leírása**

4 táblázat. # 4 használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszerek automata permetezéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata permetezéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás fejés előtt: min. 1 perc behatási idő, fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t – A termék használatra kész naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.4.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni permetezéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.4.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS [1] A META-SPC 1-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1. Használati utasítások

A termék használat előtt legyen 20 °C-nál melegebb.

Fejés előtti kezelés: kezelje a tehéntőgybimbó teljes felületét a termékkel, hagyja hatni 60 másodpercig, majd egyszer használatos törlőkkel törölje szárazra a tőgybimbót a tej szennyeződésének megakadályozására.

Fejés utáni kezelés: A tőgybimbókat a fejés után minél hamarabb kezelni kell a termékkel. Ügyeljen arra, hogy az anyag a tőgybimbó teljes felületét bevonja. A tőgybimbókat hagyja levegőn megszáradni. A szarvasmarháknak álló helyzetben kell megvárniuk, hogy a termék teljesen megszáradjon (ez legalább 5 percet vesz igénybe).

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Fejés előtti és utáni kombinált fertőtlenítés esetén egy másik, jódot nem tartalmazó biocid termék használatát kell megfontolni a fejés előtti vagy utáni fertőtlenítéshez.

Gyermekektől elzárva tartandó.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Általános elsősegélynyújtási információk: azonnal vesse le a termékkel szennyezett ruhadarabot

Belélegzés után: biztosítson friss levegőt; panasz esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezést követően: Alaposan mossa le a bőrét. Általánosságban a termék nem bőrizgató hatású.

[1] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 1 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Szembe kerülést követően: nyitott szemmel néhány percen keresztül tartó vizes öblítést kell végezni. Ha visel kontaktlencsét, távolítsa el ha könnyen megoldható, majd folytassa az öblítés.

Lenyelést követően: Öblítse ki a száját, majd igyon vizet. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

A terméket nem szabad a lefolyókba, illetve a felszíni vizekbe vagy talajvízbe engedni.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A kezelés végén a fel nem használt terméket és csomagolását a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A használt terméket a települési szennyvíztisztító telepre vagy a trágyalerakó helyre kell juttatni a helyi követelményektől függően. Kerülje az egyedi szennyvízkezelő rendszerbe történő kibocsátást.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Fagytól védendő. Hűvös, száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve, gyermekektől elzárva tárolandó.

Lejárati idő: 2 év

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 1-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Udder Dip Udder Dip Max Udder D Max Udderdine Dip Uddine Dip Udderdine DP Uddine DP Udderdine DS
Engedélyszám	EU-0020541-0001 1-1

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,5
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	2,99

META-SPC 2

1. **META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV ADATAI**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosítója**

Azonosító	meta SPC 2

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 2 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 2 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,38
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **A meta-SPC 2 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	AL – Egyéb folyadék

3. **A META-SPC 2 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	A használatot követően a(z) kezet-t alaposan meg kell mosni. szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 2 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

5 táblázat. # 1 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek manuális bemerítéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgy manuális bemerítéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemerítés Fejés után: min. 5 perc behatási idő
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, kezelésenként legfeljebb 10 ml-t – A termék használatra kész naponta 2-szer
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni bemerítéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

Töltse meg a tőgybimbómosó csészét a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. Minden kezelésnél ugyelni kell a termék mennyiségére. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Szemvédő használata kötelező.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.2. **A felhasználás leírása**

6 táblázat. # 2 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek manuális permetezéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális permetezéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás Fejés után: min. 5 perc behatási idő
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t – A termék használatra kész naponta 2-szer
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.2.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni permetezéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t.

Töltse meg a permetezőedényt a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.2.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és szemvédő eszközt.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3. **A felhasználás leírása**

7 táblázat. # 3 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek automata bemerítéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata merítéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemerítés Fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t – A termék használatra kész. naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.3.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni bemerítéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.3.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4. **A felhasználás leírása**

8 táblázat. # 4 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek automata permetezéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata permetezéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás Fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t – A termék használatra kész naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.4.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni permetezéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.4.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS [2] A META-SPC 2-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1. Használati utasítások

A termék használat előtt legyen 20 °C-nál melegebb.

Fejés utáni kezelés: A tőgybimbókat a fejés után minél hamarabb kezelni kell a termékkel. Ügyeljen arra, hogy az anyag a tőgybimbók teljes felületét bevonja. A tőgybimbókat hagyja levegőn megszáradni. A szarvasmarháknak álló helyzetben kell megvárniuk, hogy a termék teljesen megszáradjon (ez legalább 5 percet vesz igénybe).

[2] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 2 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Fejés előtti és utáni kombinált fertőtlenítés esetén egy másik, jódot nem tartalmazó biocid termék használatát kell megfontolni a fejés előtti fertőtlenítéshez.

Gyermekektől elzárva tartandó.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Általános elsősegélynyújtási információk: azonnal vesse le a termékkel szennyezett ruhadarabot

Belélegzés után: biztosítson friss levegőt; panasz esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezést követően: Alaposan mossa le a bőrét. Általánosságban a termék nem bőrizgató hatású.

Szembe kerülést követően: nyitott szemmel néhány percen keresztül tartó vizes öblítést kell végezni. Ha visel kontaktlecsét, távolítsa el, ha könnyen megoldható, majd folytassa az öblítést.

Lenyelést követően: Öblítse ki a száját, majd igyon vizet. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

A terméket nem szabad a lefolyókba, illetve a felszíni vizekbe vagy talajvízbe engedni.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A kezelés végén a fel nem használt terméket és csomagolását a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A használt terméket a települési szennyvíztisztító telepre vagy a trágyalerakó helyre kell juttatni a helyi követelményektől függően. Kerülje az egyedi szennyvízkezelő rendszerbe történő kibocsátást.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Fagytól védendő. Hűvös, száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve, gyermekektől elzárva tárolandó.

Lejárati idő: 1 év

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 2-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Gladiator RTU Udder Max Barrier Gladiator Max Barrier Udderdine BARRIER Uddine BARRIER Udderdine RTU Uddine RTU Udderdine BR
Engedélyszám	EU-0020541-0002 1-2

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,26
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	1,2

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Udder Star Spray Udder Spray Max Udderdine Spray Uddine Spray Udderdine SP Uddine SP
Engedélyszám	EU-0020541-0003 1-2

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,29
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	2,99

META-SPC 3

1. **META-SPC 3 ADMINISZTRATÍV ADATAI**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosítója**

Azonosító	meta SPC 3

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 3 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 3 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,43	0,5

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **A meta-SPC 3 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	AL – Egyéb folyadék

3. **A META-SPC 3 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	A használatot követően a(z) kezet-t alaposan meg kell mosni. szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 3 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

9 táblázat. # 1 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek manuális bemerítéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális bemerítéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemerítés Fejés után: min. 5 perc behatási idő
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, kezelésenként legfeljebb 10 ml-t – A termék használatra kész naponta 2-szer

Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni bemerítéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

Töltse meg a tőgybimbómosó csészét a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. Minden kezelésnél ügyelni kell a termék mennyiségére. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és szemvédő eszközt.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.2. **A felhasználás leírása**

10 táblázat. # 2 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek manuális permetezéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális permetezéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás Fejés után: min. 5 perc behatási idő
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t – A termék használatra kész naponta 2-szer

Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.2.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni permetezéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t.

Töltse meg a permetezőedényt a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.2.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben), védőruhát, a vegyi anyagoknak ellenálló lábbelit és szemvédő eszközt.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.3. **A felhasználás leírása**

11 táblázat. # 3 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek automata bemerítéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Éleszetőgombák
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata merítéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemerítés Fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t – A termék használatra kész. naponta 3-szor

Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.3.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó bemerítéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék, fejés után.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéses kezelésenként legfeljebb 10 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.3.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.4. **A felhasználás leírása**

12 táblázat. # 4 használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszerek automata permetezéses kezeléshez használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	—
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Baktériumok
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata permetezéses kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás Fejés után: min. 5 perc behatási idő.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	15 ml permetezéses kezelésenként – A termék használatra kész naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1 000 kg-os HDPE IBC tartály

4.4.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tehéntőgybimbó fejés utáni permetezéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéses kezelésenként legfeljebb 15 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.4.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS [3] A META-SPC 3-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1. Használati utasítások

A termék használat előtt legyen 20 °C-nál melegebb.

Fejés utáni kezelés: A tőgybimbókat a fejés után minél hamarabb kezelni kell a termékkel. Ügyeljen arra, hogy az anyag a tőgybimbók teljes felületét bevonja. A tőgybimbókat hagyja levegőn megszáradni. A szarvasmarháknak álló helyzetben kell megvárniuk, hogy a termék teljesen megszáradjon (ez legalább 5 percet vesz igénybe).

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Fejés előtti és utáni kombinált fertőtlenítés esetén egy másik, jódot nem tartalmazó biocid termék használatát kell megfontolni a fejés előtti fertőtlenítéshez.

Gyermekektől elzárva tartandó.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Általános elsősegélynyújtási információk: azonnal vesse le a termékkel szennyezett ruhadarabot

Belélegzés után: biztosítson friss levegőt; panasz esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezést követően: Alaposan mossa le a bőrét. Általánosságban a termék nem bőrizgató hatású.

Szembe kerülést követően: nyitott szemmel néhány percen keresztül tartó vizes öblítést kell végezni. Ha visel kontaktlencsét, távolítsa el ha könnyen megoldható, majd folytassa az öblítést.

Lenyelést követően: Öblítse ki a száját, majd igyon vizet. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

[3] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 3 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

A terméket nem szabad a lefolyókba, illetve a felszíni vizekbe vagy talajvízbe engedni.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A kezelés végén a fel nem használt terméket és csomagolását a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A használt terméket a települési szennyvíztisztító telepre vagy a trágyalerakó helyre kell juttatni a helyi követelményektől függően. Kerülje az egyedi szennyvízkezelő rendszerbe történő kibocsátást.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Fagytól védendő. Hűvös, száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve, gyermekektől elzárva tárolandó.

Lejárati idő: 2 év.

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 3-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Udder Star Udder Star Max Udder S Max Udderdine Star Uddine Star Udderdine ST Uddine ST
Engedélyszám	EU-0020541-0004 1-3

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,5
Zsíralkohol-etoxilát		Nem-hatóanyag	69011-36-5	500-241-6	2,5