UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1794 VAN DE COMMISSIE

van 22 oktober 2019

tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Boumatic Iodine product family"

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden [1], en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 21 augustus 2015 heeft Boumatic Gascoigne Melotte overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een aanvraag ingediend voor de toelating van een biocidefamilie met als naam "Boumatic Iodine product family", behorende tot productsoort 3 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Nederland ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-PG019260-52.

(2) De "Boumatic Iodine product family" bevat jood als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012. Rekening houdend met de intrinsieke eigenschappen van de werkzame stof en de wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen als vastgesteld in haar Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 [2], zal de Commissie overwegen of het nodig is om de goedkeuring van jood, met inbegrip van polyvinylpyrrolidonjood, overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 528/2012 te herzien. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek zal de Commissie vervolgens nagaan of de toelatingen van de Unie voor producten die de werkzame stof bevatten overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) nr. 528/2012 moeten worden herzien.

(3) Op 10 april 2018 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het agentschap") ingediend.

(4) Op 4 april 2019 heeft het agentschap bij de Commissie een advies [3] ingediend, dat in overeenstemming met artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor de "Boumatic Iodine product family" en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat. In het advies wordt geconcludeerd dat de "Boumatic Iodine product family" een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder s), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, leden 1 en 6, van die verordening gestelde voorwaarden.

(5) Op 20 juni 2019 heeft het agentschap overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(6) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor de "Boumatic Iodine product family" een toelating van de Unie te verlenen.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Boumatic Gascoigne Melotte wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0020541-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "Boumatic Iodine product family", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

---

[1] PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

[2] Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 301 van 17.11.2017, blz. 1).

[3] Advies van het agentschap van 27 februari 2019 over de toelating van de Unie voor "Boumatic Iodine product family" (ECHA/BPC/220/2019).

De toelating van de Unie is geldig van 18 november 2019 tot en met 31 oktober 2029.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Boumatic Iodine product family

Productsoort 3 — Dierhygiëne (Desinfecteermiddelen)

Toelatingsnummer: EU-0020541-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0020541-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Familienaam**

Naam	Boumatic Iodine product family

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Boumatic Gascoigne Melotte
	Adres	31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, België
Toelatingsnummer	EU-0020541-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0020541-0000	
Toelatingsdatum	18 november 2019	
Vervaldatum	31 oktober 2029	

1.4. **Fabrikant(en) van de biociden**

Naam van de fabrikant	Christeyns n.v.
Adres van de fabrikant	Afrikalaan 182, 9000 Gent België
Productielocatie	Afrikalaan 182, 9000 Gent België

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	Christeyns n.v.
Adres van de fabrikant	Afrikalaan 182, 9000 Gent België

Productielocatie	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Chili

2. **SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,5
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Soort(en) formulering**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC(S)

META-SPC 1

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1**

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 1**

Identificatiecode	meta SPC 1

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,44	0,5
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 1**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Na het werken met dit product handen grondig wassen. oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1**

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 1. Gebruik # 1 — Handmatige dippen van speendesinfectiemiddel voor of na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectiemiddelen voor handmatig dippen van koeienspenen voor of na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen voor het melken: min. 1 minuut contacttijd na het melken: min. 5 minuten contacttijd
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per behandeling — Gebruiksklare formulering 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen door middel van dipbehandeling, voor of na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dip.

Vul de dompelbeker met de aangegeven hoeveelheid onverdund product direct uit de oorspronkelijke verpakking. Bij elke behandeling moet het volume van het product in de dompelbeker nauwkeurig worden afgemeten. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Beschermende chemisch bestendige handschoenen (handschoenmateriaal in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder) en oogbescherming dragen.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 2. Gebruik # 2 — Speendesinfectiemiddelen voor handmatig sprayen voor of na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectiemiddelen voor handmatige spraybehandeling van koeienspenen voor of na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open Systeem: sprayen voor het melken: min. 1 minuut contacttijd, na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per spray — Gebruiksklare formulering 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen door sprayen, voor of na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per behandeling.

Vul de sprayflacon met de aangegeven hoeveelheid onverdund product direct uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Beschermende chemisch bestendige handschoenen (handschoenmateriaal in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder), beschermende kleding, chemisch bestendige laarzen en oogbescherming dragen.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 3. Gebruik # 3 — Automatische dippen, speendesinfectiemiddel voor of na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectiemiddelen voor automatisch dippen van koeienspenen voor of na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen voor het melken: min. 1 minuut contacttijd, na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dip — Gebruiksklare formulering 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksklaar product voor desinfectie van koeienspenen door middel van dipbehandeling, voor of na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dip.

Gebruik het onverdunde product rechtstreeks uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 4. Gebruik # 4 — Speendesinfectiemiddelen door automatisch sprayen voor of na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectiemiddelen voor automatisch sprayen van koeienspenen voor of na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: sprayen voor het melken: min. 1 minuut contacttijd, na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per spray — gebruiksklare formulering 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen met een spray, voor of na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per behandeling.

Gebruik het onverdunde product rechtstreeks uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING** [1] **VAN DE META-SPC 1**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

De producten moeten voor gebruik op een temperatuur hoger dan 20 °C worden gebracht.

Behandeling voor het melken: behandel de gehele speen met het product, laat 60 seconden inwerken en veeg de spenen droog met wegwerpdoekjes om besmetting van melk te voorkomen.

Behandeling na het melken: De spenen moeten zo snel mogelijk na het melken zodanig worden behandeld dat de spenen geheel bedekt zijn. Laat de spenen aan de lucht drogen. De koeien moeten blijven staan totdat het product volledig gedroogd is (minstens 5 minuten).

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Wanneer een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, moet het gebruik van een ander biocide zonder jodium worden overwogen voor desinfectie ofwel voor, ofwel na het melken.

Buiten bereik van kinderen houden.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Eerste hulp: algemene informatie: kleding die met het product is verontreinigd onmiddellijk uittrekken

Na inademing: Voor frisse lucht zorgen, een arts raadplegen bij klachten.

Na contact met de huid: De huid grondig wassen. Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.

[1] De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 1.

Na contact met de ogen: Open oog met stromend water spoelen gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Na inslikken: De mond uitspoelen en vervolgens water drinken. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Voorkom afspoeling naar de riolering en oppervlaktewater en voorkom verontreiniging van grondwater.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Tegen vorst beschermen. Bewaren op een koele, droge plek, verwijderd van direct zonlicht en buiten het bereik van kinderen.

Houdbaarheid: 2 jaar

6. **OVERIGE INFORMATIE**

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Udder Dip Udder Dip Max Udder D Max Udderdine Dip Uddine Dip Udderdine DP Uddine DP Udderdine DS
Toelatingsnummer	EU-0020541-0001 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alcoholethoxylaat		Gist	69011-36-5	500-241-6	2,99

META-SPC 2

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2**

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 2**

Identificatiecode	meta SPC 2

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,38
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 2**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Na het werken met dit product handen grondig wassen. oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2**

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 5. Gebruik # 1 — Handmatig dippen van speendesinfectiemiddelen na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist

Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie voor handmatig dippen van koeienspenen na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per behandeling — Gebruiksklare formulering 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen door middel van dippen, na het melken.

Vul de dompelbeker met de aangegeven hoeveelheid onverdund product direct uit de oorspronkelijke verpakking. Bij elke behandeling moet het volume van het product in de dompelbeker nauwkeurig worden afgemeten. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Oogbescherming dragen.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 6. Gebruik # 2 — Handmatig sprayen van speendesinfectiemiddelen na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist

Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie voor handmatig sprayen van koeienspenen na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: Sprayen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per spraybehandeling — Gebruiksklare forumlering 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen met een spray, na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per behandeling.

Vul de sprayflacon met de aangegeven hoeveelheid onverdund product direct uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Beschermende chemisch bestendige handschoenen (handschoenmateriaal in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder) en oogbescherming dragen.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 7. Gebruik # 3 — Automatisch dippen van speendesinfectiemiddel na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist

Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie na het melken, voor automatisch dippen van koeienspenen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dipbehandeling — Gebruiksklare formulering 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen door middel van dipbehandeling, na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dip.

Gebruik het onverdunde product rechtstreeks uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 8. Gebruik # 4 — Speendesinfectiemiddelen voor automatisch sprayen na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist

Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie na het melken, voor automatisch sprayen van koeienspenen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: sprayen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per spraybehandeling — Gebruiksklare formulering 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen met een spray, na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per behandeling

Gebruik het onverdunde product rechtstreeks uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING** [2] **VAN DE META-SPC 2**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

De producten moeten voor gebruik op een temperatuur hoger dan 20 °C worden gebracht.

Behandeling na het melken: De spenen moeten zo snel mogelijk na het melken zodanig worden behandeld dat de spenen geheel bedekt zijn. Laat de spenen aan de lucht drogen. De koeien moeten blijven staan totdat het product volledig gedroogd is (minstens 5 minuten).

[2] De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 2.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Wanneer een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, moet het gebruik van een ander biocide zonder jodium worden overwogen voor desinfectie voor het melken.

Buiten bereik van kinderen houden.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Eerste hulp: algemene informatie: kleding die met het product is verontreinigd onmiddellijk uittrekken

Na inademing: Voor frisse lucht zorgen, een arts raadplegen bij klachten.

Na contact met de huid: De huid grondig wassen. Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.

Na contact met de ogen: Open oog met stromend water spoelen gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Na inslikken: De mond uitspoelen en vervolgens water drinken. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Voorkom afspoeling naar de riolering en oppervlaktewater en voorkom verontreiniging van grondwater.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Tegen vorst beschermen. Bewaren op een koele, droge plek, verwijderd van direct zonlicht en buiten het bereik van kinderen.

Houdbaarheid: één jaar

6. **OVERIGE INFORMATIE**

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Gladiator RTU Udder Max Barrier Gladiator Max Barrier Udderdine BARRIER Uddine BARRIER Udderdine RTU Uddine RTU Udderdine BR
Toelatingsnummer	EU-0020541-0002 1-2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,26
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	1,2

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Udder Star Spray Udder Spray Max Udderdine Spray Uddine Spray Udderdine SP Uddine SP
Toelatingsnummer	EU-0020541-0003 1-2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,29
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	2,99

META-SPC 3

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3**

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 3**

Identificatiecode	meta SPC 3

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-3

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,43	0,5

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 3**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Na het werken met dit product handen grondig wassen. oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3**

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 9. Gebruik # 1 — Handmatig dippen van speendesinfectiemiddelen na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie voor handmatig dippen van koeienspenen na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per behandeling — Gebruiksklare formulering 2 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen door middel van dippen, na het melken.

Vul de dompelbeker met de aangegeven hoeveelheid onverdund product direct uit de oorspronkelijke verpakking. Bij elke behandeling moet het volume van het product in de dompelbeker nauwkeurig worden afgemeten. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Beschermende chemisch bestendige handschoenen (handschoenmateriaal in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder) en oogbescherming dragen.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 10. Gebruik # 2 — Handmatig sprayen van speendesinfectiemiddelen na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie voor handmatig sprayen van koeienspenen na het melken
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: sprayen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per spraybehandeling — Gebruiksklare formulering 2 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen met een spray, na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per behandeling

Vul de sprayflacon met de aangegeven hoeveelheid onverdund product direct uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Beschermende chemisch bestendige handschoenen (handschoenmateriaal in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder), beschermende kleding, chemisch bestendige laarzen en oogbescherming dragen.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 11. Gebruik # 3 — Automatisch dippen, speendesinfectiemiddel na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie na het melken, voor automatisch dippen van koeienspenen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dipbehandeling — Gebruiksklare formulering 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen door middel van dipbehandeling, na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 10 ml per dip.

Gebruik het onverdunde product rechtstreeks uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 12. Gebruik # 4 — Speendesinfectiemiddelen voor automatisch sprayen na het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gist
Toepassingsgebied	Binnen Speendesinfectie na het melken, voor automatisch sprayen van koeienspenen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: sprayen Na het melken: min. 5 minuten contacttijd.
Dosering(en) en frequentie	15 ml per spraybehandeling — Gebruiksklare formulering 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE vat en 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product voor desinfectie van koeienspenen met een spray, na het melken.

Gebruik een hoeveelheid product die voldoende is om de gehele speen te bedekken, maximaal 15 ml per behandeling.

Gebruik het onverdunde product rechtstreeks uit de oorspronkelijke verpakking. Om blootstelling van de huid te verminderen is het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de aanbrengapparatuur aanbevolen.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING** [3] **VAN DE META-SPC 3**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

De producten moeten voor gebruik op een temperatuur hoger dan 20 °C worden gebracht.

Behandeling na het melken: De spenen moeten zo snel mogelijk na het melken zodanig worden behandeld dat de spenen geheel bedekt zijn. Laat de spenen aan de lucht drogen. De koeien moeten blijven staan totdat het product volledig gedroogd is (minstens 5 minuten).

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Wanneer een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, moet het gebruik van een ander biocide zonder jodium worden overwogen voor desinfectie voor het melken.

Buiten bereik van kinderen houden.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Eerste hulp: algemene informatie: kleding die met het product is verontreinigd onmiddellijk uittrekken

Na inademing: Voor frisse lucht zorgen, een arts raadplegen bij klachten.

Na contact met de huid: De huid grondig wassen. Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.

Na contact met de ogen: Open oog met stromend water spoelen gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Na inslikken: De mond uitspoelen en vervolgens water drinken. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

[3] De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 3.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Voorkom afspoeling naar de riolering en oppervlaktewater en voorkom verontreiniging van grondwater.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Tegen vorst beschermen. Bewaren op een koele, droge plek, verwijderd van direct zonlicht en buiten het bereik van kinderen.

Houdbaarheid: 2 jaar.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Udder Star Udder Star Max Udder S Max Udderdine Star Uddine Star Udderdine ST Uddine ST
Toelatingsnummer	EU-0020541-0004 1-3

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alcoholethoxylaat		Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	2,5