REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1794 AL COMISIEI

din 22 octombrie 2019

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Boumatic Iodine product family”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 21 august 2015, Boumatic Gascoigne Melotte a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide denumite „Brumatic Iodine product family” din tipul de produs 3, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, prezentând confirmarea în scris conform căreia autoritatea competentă din Țările de Jos a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-PG019260-52 în Registrul produselor biocide.

(2) „Boumatic Iodine product family” conține iod ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Având în vedere proprietățile intrinseci ale substanței active și criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei ([2]), Comisia va examina necesitatea de a revizui aprobarea iodului, inclusiv a polivinilpirolidonei iodate, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. În funcție de rezultatul respectivei revizuiri, Comisia va analiza dacă autorizațiile Uniunii pentru produsele care conțin substanța activă trebuie să fie revizuite în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3) La 10 aprilie 2018, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, raportul de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”).

(4) La 4 aprilie 2019, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([3]), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) pentru „Boumatic Iodine product family” și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Avizul a concluzionat că „Boumatic Iodine product family” este o familie de produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din acel regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul respectiv.

(5) La 20 iunie 2019, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este necesar să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „Boumatic Iodine product family”.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă Boumatic Gascoigne Melotte o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0020541-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Boumatic Iodine product family”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei din 4 septembrie 2017 de stabilire a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 301, 17.11.2017, p. 1).

([3]) *ECHA opinion of 27 February 2019 on the Union authorisation of „Boumatic Iodine product family” (ECHA/BPC/220/2019)* [Avizul ECHA din 27 februarie 2019 cu privire la autorizația Uniunii pentru „Boumatic Iodine product family” (ECHA/BPC/220/2019)].

Autorizația Uniunii este valabilă de la 18 noiembrie 2019 până la 31 octombrie 2029.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Boumatic Iodine product family

Tip de produs 3 – Igienă veterinară (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0020541-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0020541-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Nume	Boumatic Iodine product family

1.2. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

1.3. **Detinatorul autorizației**

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Boumatic Gascoigne Melotte
	Adresa	31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgia
Numărul curent	EU-0020541-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0020541-0000	
Data autorizației	18 noiembrie 2019	
Data de expirare a autorizației	31 octombrie 2029	

1.4. **Producătorul (producătorii) produselor biocide**

Denumirea producătorului	Christeyns n.v.
Adresa producătorului	Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgia
Adresa locurilor de producție	Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgia

1.5. **Producatorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Christeyns n.v.
Adresa producătorului	Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgia

Adresa locurilor de producție	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Chile

2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,5
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Forma (formele) de condiționare**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1**

1.1. **Identificator Meta-RCP 1**

Identificator	meta SPC 1

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,44	0,5
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1**

Fraze de pericol	Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Spălați-vă pe mâini bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. Evitați dispersarea în mediu.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1. Utilizare # 1 – Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin imersie pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție – Produsul este gata de utilizare de două ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere din HDPE, de 1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor, dezinfecție prin imersie, înainte sau după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție prin imersie.

Umpleți cana de imersie cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. La fiecare dezinfecție trebuie să se acorde atenție cantității de produs din cana de imersie. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul) și protecție pentru ochi.

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 2. Utilizare # 2 – Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin pulverizare pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact, pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare – Produsul este gata de utilizare de două ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea prin pulverizare a mameloanelor vacilor, înainte sau după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare.

Umpleți flaconul pulverizator cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul), îmbrăcăminte de protecție, cizme rezistente la agenți chimici și protecție pentru ochi.

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 3. Utilizare # 3 – Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin imersie pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact, pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție prin imersie – Produsul este gata de utilizare de trei ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor, dezinfecție prin imersie, înainte sau după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție prin imersie.

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 4. Utilizare # 4 – Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin pulverizare pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact, pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare – Produsul este gata de utilizare de trei ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea prin pulverizare a mameloanelor vacilor, înainte sau după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare.

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** [1] **ALE META-RCP-ULUI 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsele trebuie să aibă o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Pentru dezinfectia pre-mulgere: dezinfectati cu produs întregul mamelon, lăsați să acționeze 60 de secunde, apoi uscați bine mameloanele, folosind prosoape de unică folosință, pentru a evita contaminarea laptelui.

Pentru dezinfectia post-mulgere: Mameloanele ar trebui dezinfectate cât mai curând posibil după mulgere, în așa fel încât să fie acoperite în întregime. Lăsați mameloanele să se usuce la aer. Vacile ar trebui să stea în picioare până când produsul se usucă complet (cel puțin 5 minute).

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare pre- și post-mulgere, trebuie să se ia în considerare folosirea altui produs biocid care nu conține iod, pentru dezinfectarea fie înainte, fie după mulgere.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Măsuri de prim ajutor: informații generale: îndepărtați imediat îmbrăcămintea care a intrat în contact cu produsul

În caz de inhalare: Ieșiți la aer curat; consultați medicul în cazul în care persoana prezintă simptome.

În caz de contact cu pielea: Spălați bine pielea afectată. În general, produsul nu irită pielea.

[1] Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

În caz de contact cu ochii: Separați pleoapele și clătiți timp de câteva minute, cu apă din abundență. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

În caz de înghițire: Clătiți bine gura, apoi beți apă. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați asistență medicală.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Nu permiteți ca produsul să intre în sistemele de canalizare sau în cursurile de apă de suprafață sau de adâncime.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

După încheierea dezinfecției, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale. Evitați eliminarea la o stație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Feriți de îngheț. Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Perioada de valabilitate: 2 ani

6. **ALTE INFORMAȚII**

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Udder Dip Udder Dip Max Udder D Max Udderdine Dip Uddine Dip Udderdine DP Uddine DP Udderdine DS
Numărul curent	EU-0020541-0001 1-1

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	2,99

META-RCP 2

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2**

1.1. **Identificator Meta-RCP 2**

Identificator	meta SPC 2

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,26	0,38
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2**

Fraze de pericol	Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Spălați-vă pe mâini bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. Evitați dispersarea în mediu.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 5. Utilizare # 1 – Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin imersie, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri

Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere, dezinfectarea manuală prin imersie, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin imersie Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție – Produsul este gata de utilizare de două ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor prin imersie, după mulgere.

Umpleți cana de imersie cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. La fiecare dezinfecție trebuie să se acorde atenție cantității de produs din cana de imersie. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Purtați echipament de protecție a ochilor.

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 6. Utilizare # 2 – Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin pulverizare, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri

Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere, dezinfectarea manuală prin pulverizare, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin pulverizare Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare – Produsul este gata de utilizare de două ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor prin pulverizare, după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare.

Umpleți flaconul pulverizator cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul) și protecție pentru ochi.

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 7. Utilizare # 3 – Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin imersie, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri

Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere, dezinfecția automată prin imersie, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin imersie Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare mamelon dezinfectat prin imersie – Produsul este gata de utilizare. de trei ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor prin imersie, după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție prin imersie.

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 8. Utilizare # 4 – Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin pulverizare, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri

Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere, dezinfecția automată prin pulverizare a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfectare prin pulverizare Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare – Produsul este gata de utilizare de trei ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor prin pulverizare, după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 2

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([2]) **ALE META-RCP-ULUI 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsele trebuie să aibă o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Pentru dezinfectia post-mulgere: Mameloanele ar trebui dezinfectate cât mai curând posibil după mulgere, în așa fel încât să fie acoperite în întregime. Lăsați mameloanele să se usuce la aer. Vacile ar trebui să stea în picioare până când produsul se usucă complet (cel puțin 5 minute).

([2]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare pre- și post-mulgere, trebuie să se ia în considerare folosirea altui produs biocid care nu conține iod pentru dezinfectarea înainte de mulgere.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Măsuri de prim ajutor: informații generale: îndepărtați imediat îmbrăcămintea care a intrat în contact cu produsul

În caz de inhalare: Ieșiți la aer curat; consultați medicul în cazul în care persoana prezintă simptome.

În caz de contact cu pielea: Spălați bine pielea afectată. În general, produsul nu irită pielea.

În caz de contact cu ochii: Separați pleoapele și clătiți timp de câteva minute, cu apă din abundență. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

În caz de înghițire: Clătiți bine gura, apoi beți apă. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați asistență medicală.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Nu permiteți ca produsul să intre în sistemele de canalizare sau în cursurile de apă de suprafață sau de adâncime.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

După încheierea tratamentului, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale. Evitați eliminarea la o stație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Feriți de îngheț. Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Perioada de valabilitate: 1 an

6. **ALTE INFORMAȚII**

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Gladiator RTU Udder Max Barrier Gladiator Max Barrier Udderdine BARRIER Uddine BARRIER Udderdine RTU Uddine RTU Udderdine BR
Numărul curent	EU-0020541-0002 1-2

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,26
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	1,2

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Udder Star Spray Udder Spray Max Udderdine Spray Uddine Spray Udderdine SP Uddine SP
Numărul curent	EU-0020541-0003 1-2

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,29
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	2,99

META-RCP 3

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3**

1.1. **Identificator Meta-RCP 3**

Identificator	meta SPC 3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 – Igienă veterinară

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,43	0,5

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	1,0	2,99

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3**

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3**

Fraze de pericol	Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Spălați-vă pe mâini bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. Evitați dispersarea în mediu.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 9. Utilizare # 1 – Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală prin imersie, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere, dezinfecția manuală prin imersie, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin imersie Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție – Produsul este gata de utilizare de două ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor, prin imersie, după mulgere.

Umpleți cana de imersie cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. La fiecare dezinfecție trebuie să se acorde atenție cantității de produs din cana de imersie. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul) și protecție pentru ochi.

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 10. Utilizare # 2 – Dezinfectanți pentru dezinfecția manuală, prin pulverizare după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post- mulgere, dezinfecția manuală prin pulverizare, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin pulverizare Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare – Produsul este gata de utilizare de două ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor prin pulverizare, după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare

Umpleți flaconul pulverizator cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul), îmbrăcăminte de protecție, cizme rezistente la agenți chimici și protecție pentru ochi.

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 11. Utilizare # 3 – Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin imersie, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere a mameloanelor vacilor, dezinfecția automată prin imersie a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: Tratament baie Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfecție prin imersie – Produsul este gata de utilizare. de trei ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor cu tratament prin imersie, după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare tratament prin imersie.

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 12. Utilizare # 4 – Dezinfectanți pentru dezinfecția automată prin pulverizare, după mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea post-mulgere a mameloanelor vacilor, dezinfecție automată prin pulverizare a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfecție prin pulverizare Pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Ratele și frecvența de aplicare	15 ml pentru fiecare tratament cu spray – Produsul este gata de utilizare de trei ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor prin pulverizare, după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfecție prin pulverizare.

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 3

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([3]) **ALE META-RCP-ULUI 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsele trebuie să aibă o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Pentru dezinfectia post-mulgere: Mameloanele ar trebui dezinfectate cât mai curând posibil după mulgere, în așa fel încât să fie acoperite în întregime. Lăsați mameloanele să se usuce la aer. Vacile ar trebui să stea în picioare până când produsul se usucă complet (cel puțin 5 minute).

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare pre- și post-mulgere, trebuie să se ia în considerare folosirea altui produs biocid care nu conține iod pentru dezinfectarea înainte de mulgere.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Măsuri de prim ajutor: informații generale: îndepărtați imediat îmbrăcămintea care a intrat în contact cu produsul

În caz de inhalare: Ieșiți la aer curat; consultați medicul în cazul în care persoana prezintă simptome.

În caz de contact cu pielea: Spălați bine pielea afectată. În general, produsul nu irită pielea.

În caz de contact cu ochii: Separați pleoapele și clătiți timp de câteva minute, cu apă din abundență. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

În caz de înghițire: Clătiți bine gura, apoi beți apă. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați asistență medicală.

([3]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Nu permiteți ca produsul să intre în sistemele de canalizare sau în cursurile de apă de suprafață sau de adâncime.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

După încheierea tratamentului, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale. Evitați eliminarea la o stație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Feriți de îngheț. Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Perioada de valabilitate: 2 ani.

6. **ALTE INFORMAȚII**

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Udder Star Udder Star Max Udder S Max Udderdine Star Uddine Star Udderdine ST Uddine ST
Numărul curent	EU-0020541-0004 1-3

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoxilat de alcool gras		Substanta inactiva	69011-36-5	500-241-6	2,5