VERORDENING (EEG) Nr. 821/68 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 1968

betreffende de voor de toekenning van de restitutie bij uitvoer geldende definitie van gepelde granen en geparelde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), inzonderheid op artikel 16, lid 6,

Overwegende dat de restitutie bij uitvoer rekening moet houden met de kwaliteit van het verwerkte graanprodukt waarvoor deze restitutie geldt, ten einde te vermijden dat overheidsgelden bijdragen tot de uitvoer van produkten van mindere kwaliteit; dat het in verband hiermede noodzakelijk is een nauwkeurige, in elke Lid-Staat geldende, definitie vast te stellen voor de granen die in aanmerking komen voor de restitutie welke wordt toegekend voor „gepelde granen" en „geparelde granen";

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toekenning van de restitutie bij uitvoer zijn geparelde granen en gepelde granen die welke beantwoorden aan de in de bijlage opgenomen kenmerken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1968.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1968.

Voor de Commissie
De Voorzitter
Jean REY

BIJLAGE

DEFINITIES VOOR GEPELDE (GEPELDE OF GESLEPEN) EN GEPARELDE GRAANKORRELS

A. Onder het begrip „gepelde graankorrels" vallen gepelde of geslepen graankorrels:

1. **Onder gepelde graankorrels**

   worden verstaan korrels van naakte granen waarvan de vruchtwand (pericarp) voor een groot deel verwijderd is, of korrels van bedekte granen (zie de toelichtingen op nr. 10.03: graankorrels), ontdaan van de doppen die stevig aan het pericarp vastzitten (b.v. bij gerst) of, zoals bij haver, er zo vast om sluiten dat zij niet door dorsen enz. losgemaakt kunnen worden.

2. **Geslepen graankorrels**

   zijn graankorrels (bij gerst van doppen ontdane korrels), ontdaan van het grootste deel van de vruchtwand (pericarp) en de zaadhuid (testa).

---

(1) PB nr. 117 van 13. 6. 1967, blz. 2269/67.

B. Onder het begrip „geparelde graankorrels" vallen :

a) Graankorrels die beantwoorden aan de volgende definitie :
geparelde graankorrels, voornamelijk van gerst, zijn aan alle zijden geronde graankorrels van uniforme breedte, volledig ontdaan van doppen, vruchtwand (pericarp) en kiem (embryo), en grotendeels ontdaan van zaadhuid (testa) en aleuronlaag.

b) en die bovendien voldoen aan de volgende eisen :

1. De doppen moeten verwijderd en de korrels moeten geslepen zijn overeenkomstig definities.

2. Uniforme breedte van de korrels :

a) 75 % van de korrels moet binnen maximum 20 % dm vallen,

b) 94 %, tussen 3 % en 97 % cumulatief, moet binnen maximum 30 % dm vallen,

c) 100 % moet binnen maximum 50 % dm vallen.

De uniforme breedte wordt gecontroleerd door zeefanalyse met behulp van zeven met ronde gaten.

dm : De op de curve van de zeefanalyse af te lezen mediaanwaarde bij een zeefrest van 50 %.

Zeefanalyse

Te gebruiken apparatuur

— Stel zeven met ronde gaten (diameter van de zeven 200 mm, diameter van de gaatjes gaande van 4,0 tot 1,0 mm, aflopend met 0,25 mm).

— Zeefmachine — af te stellen op de resultaten verkregen met handzeven — met als hulpstukjes voor het zeven kubusvormige stukjes rubber met ribben van 20 mm ;

— Technische balans

Uitvoering

De graankorrels worden in het algemeen met zes zeven gezeefd, het stel zeven wordt afgesloten met een deksel en een bodem. De zeef met de grootste gaten wordt bovenaan geplaatst ; deze zeef en de bodem moeten na het zeven leeg zijn.

Ten minste twee gewogen hoeveelheden tussen 50 en 100 g wegende, worden gedurende vijf minuten met de hand gezeefd.

Als hulpstukjes voor het zeven dienen kubusvormige stukjes rubber. Bij het zeven wordt het stel zeven met beide handen vastgehouden en nagenoeg horizontaal over een afstand van ca. 70 mm heen en weer geschud à raison van 120 bewegingen per minuut. Eens per minuut wordt het schudden onderbroken door een drievoudige draaiende beweging. De zeefresten worden tot op 0,1 g nauwkeurig gewogen. Hun gewicht wordt opgetekend, uitgedrukt in gewichtspercenten van de afgewogen hoeveelheid, afgerond tot gehele getallen ; daarvan worden de gemiddelde waarden berekend.

De gemiddelden in % worden cumulatief bij elkaar geteld. Begonnen wordt met de waarde 0 % voor de zeefrest in de lege zeef met de grootste gaten. De cumulatieve percentagewaarden Σ (%) en de daarmede overeenkomende maaswijdten worden overgebracht op een op millimeterpapier getekend coördinatenstelsel, waarbij de Σ (%) waarden op de ordinaat en de in mm uitgedrukte maaswijdten op de abscis worden uitgezet.

De punten worden met rechte lijnen verbonden en op de aldus verkregen curve kan de mediaanwaarde dm voor Σ (%) = 50 in 1/100 mm maaswijdte worden afgelezen.