Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B**

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1876/2006,

18. detsember 2006,

teatavate söödalisandite ajutiste ja alaliste kasutuslubade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 360, 19.12.2006, lk 126)

Parandatud:

►**C1** Parandus, EÜT L 43, 15.2.2007, lk 42 (1876/2006)

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1876/2006,

18. detsember 2006,

teatavate söödalisandite ajutiste ja alaliste kasutuslubade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artiklit 3, artikli 9d lõiget 1 ja artikli 9e lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([2]) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamine.

(2) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on ette nähtud üleminekumeetmed direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt esitatud söödalisandite lubamise taotluste suhtes, mis on saadud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3) Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4) Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 vastavad esialgsed märkused taotluste kohta edastati komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Seepärast tuleb neid taotlusi jätkuvalt käsitleda vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artiklile 4.

(5) On esitatud andmed koos taotlusega saada luba mikroorganismi *Lactobacillus farciminis* preparaadi CNCM MA 67/4R kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite ja munakanade puhul. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) esitas oma arvamuse kõnealuse preparaadi kasutamise kohta 11. juulil 2006. Hindamine näitab, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 kehtestatud tingimused nimetatud loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks anda neljaks aastaks luba kasutada kõnealust mikroorganismipreparaati käesoleva määruse I lisas esitatud tingimustel.

(6) On esitatud andmed koos taotlusega saada luba *Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'e (DSM 9553) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja alfa-amülaasi, *Bacillus subtilis*'e (ATCC 2107) abil toodetud subtilisiini ning *Aspergillus aculeatus*'e (CBS 589.94) abil toodetud polügalakturonaasi ensüümpreparaadi kasutamiseks broilerkalkunite puhul. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) esitas 15. juunil 2006 arvamuse kõnealuse preparaadi kasutamise kohta, milles jõutakse järeldusele, et see ei kujuta ohtu tarbijale, kasutajale, loomade sihtkategooriale ega keskkonnale. Hindamine näitab, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 kehtestatud tingimused nimetatud loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks anda neljaks aastaks luba kasutada kõnealust ensüümpreparaati käesoleva määruse II lisa kohaselt.

(7) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2188/2002 ([3]) lubati esmakordselt ajutiselt kasutada *Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 74 252)

([1]) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).
([2]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).
([3]) EÜT L 333, 10.12.2002, lk 5.

▼B

abil toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati munakanade ja põrsaste puhul. On esitatud uued andmed, millega toetatakse taotlust saada selle ensüümpreparaadi kasutamiseks tähtajatu luba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Seega tuleks anda tähtajatu luba kasutada kõnealust ensüümpreparaati käesoleva määruse III lisa kohaselt.

(8) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1252/2002 ([1]) lubati esmakordselt ajutiselt kasutada naatriumbensoaadi, propioonhappe ja naatriumpropionaadi preparaati sigade ja lüpsilehmade puhul. Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust saada selle konservandipreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks anda tähtajatu luba kasutada kõnealust konservandipreparaati käesoleva määruse IV lisa kohaselt.

(9) Kõnealuste taotluse hindamine on näidanud, et on vaja teatavaid meetmeid, et kaitsta töötajaid käesoleva määruse lisades sätestatud söödalisanditega kokkupuutumise eest. Kõnealune kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) ([2]) kohaldamisega.

(10) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mikroorganismide rühma kuuluvat I lisas nimetatud preparaati lubatakse nelja aasta jooksul kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvat II lisas nimetatud preparaati lubatakse nelja aasta jooksul kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 3

Ensüümide rühma kuuluvat III lisas nimetatud preparaati lubatakse tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 4

Konservantide rühma kuuluvat IV lisas nimetatud preparaati lubatakse tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

([1]) EÜT L 183, 12.7.2002, lk 10.
([2]) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud eeskirjad	Loa kehtivusaja lõpp
					CFU/kg täissöödas			
Mikroorganismid								
12	*Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	*Lactobacillus farciminis*'e preparaat, milles on vähemalt 1×10^9 CFU/g lisandit	Broilerkanad Broilerkalkunid Munakanad	—	5×10^8	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	►C1 8.1.2011 ◄

II LISA

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud eeskirjad	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
59	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Subtilisiin EC 3.4.21.62 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Polügalakturonaas EC 3.2.1.15	*Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'e (DSM 9553) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja alfa-amülaasi, *Bacillus subtilis*'e (ATCC 2107) abil toodetud subtilisiini ning *Aspergillus aculeatus*'e (CBS 589.94) abil toodetud polügalakturonaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([1])/g endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U ([2])/g subtilisiin: 4 000 U ([3])/g alfa-amülaas: 400 U ([4])/g polügalakturonaas: 25 U ([5])/g	Broilerkalkunid	—	endo-1,4-beeta-ksülanaas: 100 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 50 U subtilisiin: 1 333 U alfa-amülaas: 133 U polügalakturonaas: 8,3 U	— — — — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik annus ühe kilogrammi täissööda kohta: — endo-1,4-beeta-ksülanaas: 100–300 U — endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 50–150 U — subtilisiin: 1 333–4 000 U — alfa-amülaas: 133–400 U — polügalakturonaas: 8,3–25 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, milles on rohkesti tärklis- ja muid polüsahhariide (peamiselt arabinoksülaane ja beeta-glükaane).	►C1 8.1.2011 ◄

([1]) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 5,3 ja temperatuuril 50 °C vabastab kaera/speltanisu ksülaanist ühe mikromooli taandavaid suhkruid (ksüloosiekvivalente) minutis.
([2]) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 5,0 ja temperatuuril 30 °C vabastab odra beeta-glükaanist ühe mikromooli taandavaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.
([3]) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 7,5 ja temperatuuril 40 °C vabastab kaseiini substraadist ühe mikromooli fenoolühendeid (türosiini ekvivalente) minutis.
([4]) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 6,5 ja temperatuuril 37 °C vabastab vees mittelahustuvast võrkstruktuuriga tärklisepolümeeri substraadist ühe mikromooli glükosiidsidemeid minutis.
([5]) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 5,0 ja temperatuuril 40 °C vabastab polü-D-galakturoonsubstraadist 1 mikromooli taandavat ainet (galakturoonhappeekvivalenti) minutis.

▼B

III LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud eeskirjad	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1602	Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 74 252) abil toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: vedelal kujul ja graanulitena: endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U ([1])/milliliitri või grammi kohta endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U ([2])/milliliitri või grammi kohta endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U ([3])/milliliitri või grammi kohta	Munakanad	—	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 640 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 440 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 080 U	— — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: — endo-1,4-beeta-glükanaas: 640–800 U — endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 440–1 800 U — endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 080–2 600 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, milles on rohkesti muid polüsahhariide peale tärklise (peamiselt arabinoksülaane ja beeta-glükaane), nt jõusööt, mis sisaldab üle 30 % nisu, tritikalet või otra.	Tähtajatu

▼B

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud eeskirjad	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
			Põrsad (võõrutatud)	—	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300 U	— — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: — endo-1,4-beeta-glükanaas: 400–1 600 U — endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–3 600 U — Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–5 200 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, milles on rohkesti muid polüsahhariide peale tärklise (peamiselt arabinoksülaane ja beeta-glükaane). 4. Kuni umbes 35 kg kaaluvatele võõrutatud põrsastele.	

(1) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 5,0 ja temperatuuril 40 °C vabastab karboksümetüültselluloosist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.
(2) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 5,0 ja temperatuuril 40 °C vabastab odra beeta-glükaanist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.
(3) Üks U on ensüümikogus, mis pH tasemel 5,0 ja temperatuuril 40 °C vabastab kaera/speltanisu ksülaanist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.

▼B

IV LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud eeskirjad	Loa kehtivusaja lõpp
					Milligrammi 1 kg teravilja kohta			
Säilitusained								
E 700	Naatriumbensoaat 140 g/kg Propioonhape 370 g/kg Naatriumpropionaat 110 g/kg	Lisandi koostis: naatriumbensoaat: 140 g/kg propioonhape: 370 g/kg naatriumpropionaat: 110 g/kg vesi: 380 g/kg	Sead	—	3 000	22 000	Teravilja säilitamiseks, mille niiskusesisaldus on üle 15 %.	Tähtajatu
		Toimeained: naatriumbensoaat $C_7H_5O_2Na$ propioonhape $C_3H_6O_2$ naatriumpropionaat $C_3H_5O_2Na$	Lüpsilehmad		3 000	22 000	Teravilja säilitamiseks, mille niiskusesisaldus on üle 15 %.	