Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1876/2006

(2006. gada 18. decembris)

par pagaidu un pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 360, 19.12.2006, lpp. 126)

Labota ar:

►**C1** Kļūdu labojums, OV L 43, 15.2.2007, lpp. 42 (1876/2006)

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1876/2006

(2006. gada 18. decembris)

par pagaidu un pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām ([1]) un jo īpaši tās 3. pantu, 9.d panta 1. punktu un 9.e panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([2]), un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļaujas dzīvnieku barības piedevu izmantošanai.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā ir paredzēti pārejas pasākumi attiecībā uz dzīvnieku barības piedevu izmantošanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3) Pieteikumus šīs regulas pielikumos minēto piedevu izmantošanas atļaujas piešķiršanai iesniedza pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(4) Atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam sākotnējās atsauksmes par šiem pieteikumiem Komisijai nosūtīja pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Tāpēc minētie pieteikumi jāizskata saskaņā ar 4. pantu Direktīvā 70/524/EEK.

(5) Iesniedza datus, pamatojot atļaujas pieteikumu no *Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R iegūta mikroorganismu preparāta izmantošanai gaļas cāļiem, gaļas tītariem un dējējvistām. Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestāde (EPNI) 2006. gada 11. jūlijā sniedza atzinumu par šī preparāta izmantošanu. Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 1. punktā paredzētie šādas atļaujas saņemšanas nosacījumi ir ievēroti. Tāpēc šo mikroorganismu preparātu, kas norādīts šīs regulas I pielikumā, jāatļauj izmantot četrus gadus.

(6) Iesniedza datus, pamatojot atļaujas pieteikumu no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtas endo-l,4-beta-ksilanāzes, no *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūtas endo-l,3(4)-beta-glikanāzes un alfa-amilāzes, no *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūta subtilizīna, no *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūtas poligalakturonāzes fermentu preparāta izmantošanai gaļas tītariem. EPNI 2006. gada 15. jūnijā sniedza atzinumu par šā preparāta izmantošanu, kurā izdarīts slēdziens, ka preparāts nerada risku patērētājiem, izmantotājiem, aptvertajai dzīvnieku kategorijai un videi. Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 1. punktā paredzētie šādas atļaujas saņemšanas nosacījumi ir ievēroti. Tāpēc šo fermentu preparātu, kas norādīts šīs regulas II pielikumā, jāatļauj izmantot četrus gadus.

(7) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2188/2002 ([3]) pirmo reizi no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūtas endo-1,4-beta-

([1]) OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).
([2]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).
([3]) OV L 333, 10.12.2002., 5. lpp.

▼B

glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu uz ierobežotu laiku atļāva izmantot dējējvistām un sivēniem. Iesniedza jaunus datus, pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā fermentu preparāta izmantošanai. Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tāpēc šo fermentu preparātu, kas norādīts šīs regulas III pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(8) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1252/2002 ([1]) pirmo reizi nātrija benzoāta, propionskābes un nātrija propionāta preparātu uz ierobežotu laiku atļāva izmantot cūkām un piena govīm. Iesniedza jaunus datus, pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā konservantu preparāta izmantošanai. Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tāpēc šo konservantu preparātu, kas norādīts šīs regulas IV pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(9) Minēto pieteikumu novērtējums liecina, ka ir vajadzīgas konkrētas procedūras, lai aizsargātu darbiniekus no pielikumos norādīto piedevu kaitīgās iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā ([2]).

(10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mikroorganismu grupas preparātu, kas norādīts I pielikumā, atļauts izmantot ierobežotu laiku četrus gadus kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Fermentu grupas preparātu, kas norādīts II pielikumā, atļauts izmantot ierobežotu laiku četrus gadus kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Fermentu grupas preparātu, kas norādīts III pielikumā, pastāvīgi bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

4. pants

Konservantu grupas preparātu, kas norādīts IV pielikumā, pastāvīgi bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

([1]) OV L 183, 12.7.2002., 10. lpp.
([2]) OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

I PIELIKUMS

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					CFU/kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
12	*Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	*Lactobacillus farciminis* preparāts, kura sastāvā ir vismaz 1×10^9 CFU/g piedevas	Gaļas cāļi Gaļas tītari Dējējvistas	—	5×10^8	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.	►C1 8.1.2011 ◄

II PIELIKUMS

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
59	Endo-1,4-beta-ksilanāze EK 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EK 3.2.1.6. Subtilizīns EK 3.4.21.62. Alfa-amilāze EK 3.2.1.1. Poligalakturonāze EC 3.2.1.15.	No *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-l,4-beta-ksilanāzes, no *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts endo-l,3(4)-beta-glikanāzes un alfa-amilāzes, no *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūts subtilizīna, no *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts poligalakturonāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U ([1])/g; endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U ([2])/g; subtilizīns: 4 000 U ([3])/g; alfa-amilāze: 400 U ([4])/g; poligalakturonāze: 25 U ([5])/g.	Gaļas tītari	—	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 100 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 50 U Subtilizīns: 1 333 U Alfa-amilāze: 133 U Poligalakturonāze: 8,3 U	— — — — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: — endo-1,4-beta-ksilanāze: 100–300 U; — endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 50–150 U; — subtilizīns: 1 333–4 000 U; — alfa-amilāze: 133–400 U; — poligalakturonāze: 8,3–25 U; 3. Izmantošanai barības maisījumos, kuros ir daudz cieti saturošu polisaharīdu un cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu).	►C1 8.1.2011 ◄.

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 5,3 un 50 °C temperatūrā vienā minūtē auzu pelavu ksilāna šķeļ 1 (micro)mol reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 5,0 un 30 °C temperatūrā vienā minūtē no miežu beta-glikāna šķeļ 1 (micro)mol reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).
([3]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 7,5 un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no kazeīna substrāta šķeļ 1 (micro)mol fenola savienojumu (tirozīna ekvivalentos).
([4]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 6,5 un 37 °C temperatūrā vienā minūtē no ūdenī nešķīstoša piesaistīta cietes polimēra substrāta šķeļ 1 (micro)mol glikozīdu savienojumu.
([5]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 5,0 un 40 °C temperatūrā no poli D-galakturona substrāta vienā minūtē šķeļ 1 (micro)mol reducējošo vielu (galakturonskābes ekvivalentos).

III PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais daudzums	Maksimālais daudzums	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1602	Endo-1,4-beta-glikanāze EK 3.2.1.4. Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EK 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-ksilanāze EK 3.2.1.8.	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts šķidruma un cietā veidā ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-glikanāze: 8 000 U ([1])/ml vai g; Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U ([2])/ml vai g; Endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U ([3])/ml vai g.	Dējējvistas	—	Endo-1,4-beta-glikanāze: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 440 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 080 U	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamās devas uz 1 kg kompleksās barības: — Endo-1,4-beta-glikanāze: 640–800 U; — Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 440–1 800 U; — Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 080–2 600 U. 3. Izmantošanai barības maisījumos, kuros ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), kuru sastāvā ir vairāk nekā 30 % kviešu, tritikāles vai miežu.	Neierobežots

▼B

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais daudzums	Maksimālais daudzums	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības			
			Sivēni (atšķirti)	—	Endo-1,4-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300 U	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamās devas uz 1 kg kompleksās barības: — Endo-1,4-beta-glikanāze: 400–1 600 U; — Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900–3 600 U; — Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300–5 200 U. 3. Izmantošanai barības maisījumos, kuros ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu). 4. Izmantošanai barībā atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg.	

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 5,0 un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no karboksimetilcelulozes šķeļ 0,1 (micro)mol glikozes.
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 5,0 un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no miežu beta-glikāna šķeļ 0,1 (micro)mol glikozes.
([3]) 1 U ir fermenta daudzums, kas pie pH 5,0 un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no auzu pelavu ksilāna šķeļ 0,1 (micro)mol glikozes.

▼B

IV PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					labības mg/kg			
Konservanti								
E 700	Nātrija benzoāts 140 g/kg Propionskābe 370 g/kg Nātrija propionāts 110 g/kg	Piedevas sastāvs: nātrija benzoāts: 140 g/kg; propionskābe: 370 g/kg; nātrija propionāts: 110 g/kg; ūdens: 380 g/kg.	Cūkas	—	3 000	22 000	Tādas labības saglabāšanai, kura satur vairāk nekā 15 % mitruma.	Neierobežots
		Aktīvās sastāvdaļas: nātrija benzoāts $C_7H_5O_2Na$; propionskābe $C_3H_6O_2$; nātrija propionāts $C_3H_5O_2Na$.	Piena govis		3 000	22 000	Tādas labības saglabāšanai, kura satur vairāk nekā 15 % mitruma.	