Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/2297

20.10.2026

AANBEVELING (EU) 2026/2297 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2026

betreffende de monitoring van nitraat en nitriet in diervoeders en de preventie van de aanwezigheid van nitraat en nitriet in bepaalde voedermiddelen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2020 een risicobeoordeling van nitraat en nitriet in diervoeders ([1]) uitgebracht.

(2) De EFSA heeft in verband met de aanwezigheid van nitraten in voedergewassen en ruwvoer en producten daarvan een mogelijk gezondheidsprobleem voor herkauwers vastgesteld. Het gezondheidsrisico van de blootstelling aan nitriet bij landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren kon niet worden beoordeeld omdat er geen referentiepunten en/of schattingen van de blootstelling beschikbaar waren.

(3) De EFSA heeft onder meer vastgesteld dat er behoefte is aan meer informatie over de aanwezigheid van nitraat en nitriet in voedergewassen en ruwvoer en daarvan afgeleide producten en van nitriet in producten en bijproducten van suikerbiet en suikerriet en van de productie van zetmeel en alcoholische dranken.

(4) Bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad ([2]) zijn maximumgehalten vastgesteld voor nitriet in voedermiddelen, met uitzondering van kuilvoer, producten en bijproducten van suikerbiet en suikerriet en van de productie van zetmeel en alcoholische dranken, en in volledige diervoeders.

(5) Landbouwers zouden moeten worden aangemoedigd om goede praktijken toe te passen om hoge nitraat- en nitrietgehalten in voedergewassen en ruwvoer en producten daarvan te voorkomen, en exploitanten van diervoederbedrijven zou moeten worden aanbevolen goede praktijken toe te passen om hoge nitrietgehalten in producten en bijproducten van suikerbiet en suikerriet en van de productie van zetmeel en alcoholische dranken te voorkomen. Dit kan worden bereikt door de in de bijlage bij deze aanbeveling uiteengezette beginselen toe te passen.

(6) Daarom moet de monitoring van nitraat en nitriet in bepaalde voedermiddelen worden aanbevolen en moeten beginselen worden vastgesteld voor het aanbevelen van de toepassing van goede praktijken om hoge nitraat- en nitrietgehalten in bepaalde voedermiddelen te voorkomen,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1. De lidstaten wordt aanbevolen om met actieve betrokkenheid van landbouwers en exploitanten van diervoederbedrijven de aanwezigheid te monitoren van nitraat en nitriet in voedergewassen en ruwvoer en daarvan afgeleide producten en van nitriet in producten en bijproducten van suikerbiet en suikerriet en van de productie van zetmeel en alcoholische dranken.

2. De lidstaten en exploitanten van diervoederbedrijven wordt aanbevolen de EFSA de gegevens te verstrekken die in één databank moeten worden opgenomen overeenkomstig de voorschriften van de richtsnoeren van de EFSA inzake standaardmonsterbeschrijving (Standard Sample Description — SSD) voor levensmiddelen en diervoeders en de aanvullende specifieke rapportagevereisten van de EFSA ([3]).

([1]) EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2020, "Risk assessment of nitrate and nitrite in feed", *EFSA Journal* 2020;18(11):6290, 110 blz., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6290.

([2]) Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj).

([3]) https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.

3. De lidstaten wordt aanbevolen om rekening te houden met de in de bijlage uiteengezette beginselen wanneer zij aan landbouwers en exploitanten van diervoederbedrijven aanbevelingen doen met betrekking tot de vermindering van de aanwezigheid van nitraat en nitriet in voedergewassen en ruwvoer en daarvan afgeleide producten en van nitriet in producten en bijproducten van suikerbiet en suikerriet en van de productie van zetmeel en alcoholische dranken.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2026.

Voor de Commissie
Olivér VÁRHELYI
Lid van de Commissie

BIJLAGE

Beginselen voor de preventie en vermindering van de aanwezigheid van nitraat en nitriet in diervoeders en voor de vermindering van de blootstelling van dieren aan nitraat en nitriet

1. Er zouden goede landbouwpraktijken moeten worden toegepast om ervoor te zorgen dat het nitraatgehalte in diervoeders zo laag is als redelijkerwijs haalbaar is door te zorgen voor goede groeiomstandigheden en bijzondere aandacht te besteden aan stikstofbemesting (geen overmatige of te late bemesting). Factoren waarvan bekend is dat zij accumulatie van nitraat in planten veroorzaken, zijn onder meer droogte, bewolkt of koud weer en het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

2. Het nitraatgehalte hangt ook af van het groeistadium (jongere planten bevatten gewoonlijk meer nitraat en het nitraatgehalte neemt af naarmate de planten ouder worden) en het deel van de plant (het grootste deel van het nitraat bevindt zich in het onderste deel van de stengel). Het oogsten van planten als zij bijna volgroeid zijn en het afsnijden ervan boven de basis van de stengel verlagen bijgevolg het risico op nitraatvergiftiging.

3. Voedergewassen en ruwvoer met een hoog nitraatgehalte worden bij voorkeur geoogst en vervoederd als kuilvoer, omdat het gistingsproces dat optreedt wanneer diervoeder wordt ingekuild het nitraatgehalte verlaagt, mits dit onder de juiste omstandigheden gebeurt.

4. Er zou voor moeten worden gezorgd dat drinkwater voor dieren en water voor de productie van diervoeder lage gehalten aan nitraat bevat (bv. minder dan 200 mg/l).

5. Het is passend om te screenen op de aanwezigheid van nitraat in diervoeder waarvan bekend is dat het hoge gehalten aan nitraat bevat, met name bij weers- en/of productieomstandigheden waarvan bekend is dat zij tot hogere nitraatgehalten leiden. Indien uit de screening blijkt dat een hoog nitraatgehalte mogelijk is, is het passend een kwantitatieve analyse te verrichten. In geval van zeer hoge nitraatgehalten (bv. meer dan 4 000 mg/kg voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %) zou moeten worden vermeden dat dat diervoeder aan drachtige dieren wordt vervoederd en zou het aandeel van dat diervoeder in het rantsoen voor andere dieren moeten worden beperkt.

6. Hoge nitrietgehalten in producten en bijproducten van suikerbiet en suikerriet en van de productie van zetmeel en alcoholische dranken zouden moeten worden voorkomen door bacteriële besmetting te vermijden of te verminderen. Diervoeder dat meer dan 200 mg/kg nitriet in de vorm van $NaNO_2$ bevat (voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %) zou niet mogen worden vervoederd aan dieren.