2026/2297

20.10.2026

RECOMANDAREA (UE) 2026/2297 A COMISIEI

din 16 octombrie 2026

privind monitorizarea nitraților și a nitriților în furaje și prevenirea prezenței nitraților și a nitriților în anumite materii prime furajere

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea") a adoptat în 2020 o evaluare a riscurilor prezentate de nitrați și nitriți în furaje ([1]).

(2) Autoritatea a identificat o posibilă problemă de sănătate pentru rumegătoare legată de prezența nitraților în nutreț și furaje grosiere, precum și în produsele derivate din acestea. Riscul pentru sănătate cauzat de expunerea la nitriți a animalelor de fermă și de companie nu a putut fi evaluat deoarece nu au fost disponibile puncte de referință și/sau estimări ale expunerii.

(3) Autoritatea a identificat necesitatea, printre altele, de a dispune de mai multe informații cu privire la prezența nitraților și a nitriților în nutreț și furaje grosiere și în produsele derivate din acestea, precum și cu privire la prezența nitriților în produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr și trestie de zahăr și din producția de amidon și de băuturi alcoolice.

(4) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([2]) stabilește nivelurile maxime de nitriți în materiile prime furajere, cu excepția furajelor însilozate, a produselor și subproduselor din sfeclă de zahăr și trestie de zahăr și a celor rezultate din producția de amidon și de băuturi alcoolice, precum și în furajele complete.

(5) Fermierii ar trebui încurajați să aplice bune practici pentru a preveni nivelurile ridicate de nitrați și nitriți în nutreț și furaje grosiere și în produsele derivate din acestea, iar operatorilor din sectorul hranei pentru animale ar trebui să li se recomande să aplice bune practici pentru a preveni nivelurile ridicate de nitriți în produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr și trestie de zahăr și din producția de amidon și de băuturi alcoolice. Acest lucru ar putea fi realizat prin aplicarea principiilor prevăzute în anexa la prezenta recomandare.

(6) Prin urmare, este adecvat să se recomande monitorizarea nitraților și a nitriților în anumite materii prime furajere și să se prevadă principii pentru recomandarea aplicării bunelor practici în vederea prevenirii nivelurilor ridicate de nitrați și nitriți în anumite materii prime furajere,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

(1) Se recomandă statelor membre să monitorizeze, cu participarea activă a fermierilor și a altor operatori din sectorul hranei pentru animale, prezența nitraților și a nitriților în nutreț și furaje grosiere și în produsele derivate din acestea, precum și prezența nitriților în produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr și trestie de zahăr și din producția de amidon și de băuturi alcoolice.

(2) Statelor membre și operatorilor din sectorul hranei pentru animale li se recomandă să furnizeze autorității datele care trebuie să fie compilate într-o singură bază de date în conformitate cu cerințele Orientărilor autorității privind descrierea standard a probelor (*Standard Sample Description* – SSD) pentru alimente și hrană pentru animale și cu cerințele specifice suplimentare de raportare ale autorității ([3]).

([1]) Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM), 2020. *Scientific Opinion on the risk assessment of nitrate and nitrite in feed* (Aviz științific privind evaluarea riscurilor prezentate de nitrați și nitriți în furaje). *EFSA Journal* 2020;18(11):6290, p. 110, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6290.

([2]) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj).

([3]) https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.

(3) Se recomandă statelor membre să ia în considerare principiile prezentate în anexă atunci când recomandă fermierilor și altor operatori din sectorul hranei pentru animale măsuri de reducere a prezenței nitraților și a nitriților în nutreț și furaje grosiere și în produsele derivate din acestea, precum și a prezenței nitriților în produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr și trestie de zahăr și din producția de amidon și de băuturi alcoolice.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2026.

Pentru Comisie
Olivér VÁRHELYI
Membru al Comisiei

ANEXĂ

Principii pentru prevenirea și reducerea nitraților și nitriților în furaje și reducerea expunerii animalelor la nitrați și nitriți

1. Ar trebui să se aplice bune practici agricole pentru a se asigura că nivelul de nitrați din furaje este cât mai scăzut posibil prin asigurarea unor condiții bune de cultivare și ar trebui să se acorde o atenție deosebită fertilizării cu azot (fără aplicare excesivă și tardivă). Printre factorii despre care se știe că provoacă acumularea de nitrați în plante se numără seceta, vremea înnorată sau rece și aplicarea anumitor produse de protecție a plantelor.

2. Nivelul de nitrați depinde, de asemenea, de stadiul de maturitate (plantele mai tinere conțin, de obicei, niveluri mai ridicate de nitrați, iar nivelul de nitrați scade pe măsură ce plantele ajung la maturitate) și de partea plantei (cea mai mare parte a nitraților se află în partea inferioară a tulpinii). Prin urmare, recoltarea aproape de maturitate și creșterea înălțimii de tăiere pentru a evita în mod selectiv partea inferioară a tulpinii reduc riscul de toxicitate prezentat de nitrați.

3. Nutrețul și furajele grosiere cu conținut ridicat de nitrați sunt, de preferință, recoltate și oferite ca hrană sub formă de furaje însilozate, deoarece procesul de fermentare atunci când furajele sunt însilozate reduce nivelurile de nitrați dacă se efectuează în condiții bune.

4. Ar trebui să se asigure faptul că apa de băut pentru animale sau apa utilizată pentru producerea furajelor conține niveluri scăzute de nitrați (de exemplu, sub 200 mg/l).

5. Este adecvat să se efectueze teste pentru a detecta prezența nitraților în furajele despre care se știe că prezintă niveluri ridicate de nitrați și, în special, în cazul unor condiții meteorologice și/sau de producție despre care se știe că duc la niveluri de nitrați mai mari decât de obicei. În cazul în care testarea indică posibilitatea unui nivel ridicat de nitrați, este adecvat să se realizeze o analiză cantitativă. În cazul unor niveluri foarte ridicate de nitrați (de exemplu, > 4 000 mg/kg, în raport cu un furaj cu un conținut de umiditate de 12 %), ar trebui să se evite hrănirea animalelor gestante cu furajul respectiv și să se limiteze proporția lui în rația altor animale.

6. Nivelurile ridicate de nitriți în produsele și subprodusele obținute din sfecla de zahăr și trestia de zahăr și din producția de amidon și de băuturi alcoolice ar trebui prevenite prin evitarea sau reducerea infecțiilor bacteriene. Materiile prime furajere care conțin mai mult de 200 mg/kg de nitrit sub formă de $NaNO_2$ (în raport cu un furaj cu un conținut de umiditate de 12 %) nu ar trebui să fie folosite în hrana animalelor.