OTSUSED

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1728,

17. november 2020,

millega kinnitatakse Horvaatias kasutatavad searümpade liigitusmeetodid

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 7880 all)

(Ainult horvaadikeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, ([1]) eriti selle artikli 20 punkti p,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B.IV alapunktiga 1 on ette nähtud, et searümpade klassifitseerimiseks hinnatakse tailihasisaldust vastavalt komisjoni kinnitatud liigitusmeetoditele; kinnitada võib üksnes statistiliselt tõestatud hindamismeetodeid, mis põhinevad searümba ühe või mitme anatoomilise osa füüsilisel mõõtmisel. Liigitusmeetodite kinnitamisel tuleks lähtuda hinnangu vastavusest statistilise vea lubatud maksimaalsele kõrvalekaldele. Kõnealune lubatud kõrvalekalle on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 ([2]) V lisa A osas.

(2) Horvaatia on taotlenud komisjonilt luba viie meetodi (Hennessy Grading Probe 2 (HGP2), Hennessy Grading Probe 7 (HGP7), OptiGrade-MCP, OptiScan-TP ja käsitsimeetod ZP) kasutamiseks. Sel eesmärgil esitas Horvaatia delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 11 lõikega 3 ettenähtud protokolli abil proovidissekteerimise üksikasjaliku kirjelduse, märkides põhimõtted, millel need meetodid põhinevad, selle proovidissekteerimise tulemused ning tailihasisalduse osakaalu hindamiseks kasutatavad võrrandid.

(3) Kõnealuse taotluse läbivaatamisel on selgunud, et asjaomaste liigitusmeetodite kinnitamise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks lubada Horvaatias kõnealuseid liigitusmeetodeid ja valemeid kasutada.

(4) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Horvaatias lubatakse searümpade liigitamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B.IV alapunktile 1 kasutada järgmisi meetodeid:

a) seade Hennessy Grading Probe 2 (HGP2) ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa I osas;

b) seade Hennessy Grading Probe 7 (HGP7) ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa II osas;

c) seade OptiGrade-MCP ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa III osas;

([1]) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

([2]) Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 4.7.2017, lk 74).

d) seade OptiScan-TP ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa IV osas;

e) nihkmõõdiku kasutamisega käsitsimeetod ZP ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa V osas.

2. Lõike 1 punktis e osutatud nihkmõõdiku kasutamisega käsitsimeetodit ZP ja sellega seotud hindamismeetodeid lubatakse kasutada üksnes tapamajades, kus tapetakse aastas keskmiselt kuni 500 siga nädalas.

Artikkel 2

Kinnitatud seadmete või liigitusmeetodite muutmine on lubatud üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt lubatud komisjoni rakendusotsusega.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Horvaatia Vabariigile.

Brüssel, 17. november 2020

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Janusz WOJCIECHOWSKI

LISA

SEARÜMPADE LIIGITUSMEETODID HORVAATIAS

I OSA

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1. Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2).

2. Seade on varustatud sondiga, mille diameeter on 5,95 millimeetrit (sondi tipus asuva tera juures 6,3 mm), milles on fotodiood (Siemens LED, tüüp LYU 260-EO) ja fotodetektor (tüüp 58 MR), ning mille mõõteulatus on 0–120 millimeetrit.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$LMP_{HGP\ 2} = 68{,}54165 - (0{,}7727577 \times F) + (0{,}008924575 \times M)$$

kus:

$LMP_{HGP\ 2}$ = rümba tailihasisalduse hinnanguline osakaal;

F = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna 7 cm kaugusel poolitusjoonest väliskülje ja 4 cm kaugusel poolitusjoonest sisekülje tagant teise ja kolmanda roide vahelt;

M = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui F.

4. Valem kehtib 60–120 kilogrammi (tapasooja rümba kaal) kaaluvate rümpade puhul.

II OSA

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1. Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7).

2. Seade on varustatud sondiga, mille diameeter on 5,95 millimeetrit (sondi tipus asuva tera juures 6,3 mm), milles on fotodiood (Siemens LED, tüüp LYU 260-EO) ja fotodetektor (tüüp 58 MR), ning mille mõõteulatus on 0–120 millimeetrit.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$LMP_{HGP\ 7} = 66{,}92177 - (0{,}7505144 \times F) + (0{,}03170816 \times M)$$

kus:

$LMP_{HGP\ 7}$ = rümba tailihasisalduse hinnanguline osakaal;

F = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna 7 cm kaugusel poolitusjoonest väliskülje ja 4 cm kaugusel poolitusjoonest sisekülje tagant teise ja kolmanda roide vahelt;

M = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui F.

4. Valem kehtib 60–120 kilogrammi (tapasooja rümba kaal) kaaluvate rümpade puhul.

III OSA

OptiGrade-MCP

1. Käesoleva osaga ette nähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet OptiGrade-MCP.

2. Seade on varustatud optilise sondiga, mille diameeter on 6 millimeetrit ning milles on üks infrapuna-fotodiood (Siemens) ja fototransistor (Siemens). Seadme mõõteulatus on 0–110 millimeetrit.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$LMP_{MCP} = 66{,}863 - (0{,}6809437 \times F) + (0{,}02633554 \times M)$$

kus:

LMP_{MCP} = rümba tailihasisalduse hinnanguline osakaal;

F = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna 7 cm kaugusel poolitusjoonest väliskülgel ja 4 cm kaugusel poolitusjoonest siseküljel tagant teise ja kolmanda roide vahelt;

M = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui F.

4. Valem kehtib 60–120 kilogrammi (tapasooja rümba kaal) kaaluvate rümpade puhul.

IV OSA

OptiScan-TP

1. Käesoleva osaga ette nähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet OptiScan TP.

2. Seade OptiScan TP on varustatud digitaalse skaneerimisseadmega, mis teeb valgustatud pildi kahest rümbal asuvast mõõtepunktist. Pildid on rasvkoe ja lihase paksuse arvutamise aluseks. Mõõtmiste tulemused teisendatakse seadme OptiScan TP abil hinnanguliseks tailihasisalduseks. Pildid salvestatakse ning neid võib hiljem kontrollida. Integreeritud Bluetooth®-liidese abil saab andmeid kergesti üle kanda.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$LMP_{TP} = 66{,}52167 - (0{,}5215984 \times F) + (0{,}01604653 \times M)$$

kus:

LMP_{TP} = rümba tailihasisalduse hinnanguline osakaal;

F = keskset tuharalihast (*Musculus glutaeus medius*) katva nähtava peki (sealhulgas kamar) vähim paksus millimeetrites mõõdetuna poolitatud rümba keskjoonel;

M = lihase paksus, mõõdetuna lühimat ühendusjoont pidi keskse tuharalihase (*Musculus glutaeus medius*) eesmise (koljupoolse) otsa ja selgrookanali ülemise (selgmise) seina vahel kõige õhemas kohas.

4. Valem kehtib 60–120 kilogrammi (tapasooja rümba kaal) kaaluvate rümpade puhul.

V OSA

Käsitsimeetod (ZP)

1. Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse käsitsimeetodit ZP, mille puhul mõõdetakse nihkmõõdikuga.

2. Selle meetodi puhul kasutatakse nihkmõõdikut ja hindamise aluseks on prognoosivalem. Meetod põhineb peki ja lihase paksuse käsitsi mõõtmisel poolitatud rümba keskjoonel.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$LMP_{ZP} = 66{,}18242 - (0{,}5312573 \times F) + (0{,}02048905 \times M)$$

kus:

LMP_{ZP} = rümba tailihasisalduse hinnanguline osakaal;

F = keskset tuharalihast (*Musculus glutaeus medius*) katva nähtava peki (sealhulgas kamar) vähim paksus millimeetrites mõõdetuna poolitatud rümba keskjoonel;

M = lihase paksus, mõõdetuna lühimat ühendusjoont pidi keskse tuharalihase (*Musculus glutaeus medius*) eesmise (koljupoolse) otsa ja selgrookanali ülemise (selgmise) seina vahel kõige õhemas kohas.

4. Valem kehtib 60–120 kilogrammi (tapasooja rümba kaal) kaaluvate rümpade puhul.