376R1423

'Αριθ. N 166/20 'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 25.6.76

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1423/76 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 21ης 'Ιουνίου 1976

περί τῶν ποιοτικῶν τύπων ὀρύζης καί θραυσμάτων ὀρύζης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

'Εχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1418/76 τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης 'Ιουνίου 1976 περί κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς τῆς ὀρύζης(1), καί ἰδίως τό ἄρθρο 4 παράγραφος 5 καί τό ἄρθρο 15 παράγραφος 3,

τήν πρόταση τῆς 'Επιτροπῆς,

'Εκτιμώντας:

ὅτι ἡ ἐνδεικτική τιμή τῆς ἀποφλοιωμένης ὀρύζης, οἱ τιμές παρεμβάσεως τῆς ἀναποφλοίωτης ὀρύζης καί ἡ τιμή κατωφλίου τῶν θραυσμάτων ὀρύζης πρέπει νά ἀνταποκρίνονται σέ καθορισμένους ποιοτικούς τύπους·

ὅτι πρέπει οἱ ποιοτικοί τύποι γιά τούς ὁποίους ἔχουν καθορισθεῖ οἱ τιμές αὐτές νά ἀνταποκρίνονται, κατά τό δυνατό, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀποφλοιωμένη καί τήν ἀναποφλοίωτη ὄρυζα, στή μέση ποιότητα τῆς ὀρύζης σέ στρογγυλούς κόκκους, ἡ ὁποία ἔχει συγκομισθεῖ ἐντός τῆς Κοινότητος, ὅσον ἀφορᾶ δέ τά θραύσματα, στή μέση ποιότητα τῶν θραυσμάτων πού προέρχονται συνήθως ἀπό ἐγχώρια ὄρυζα τῆς κοινοτικῆς βιομηχανίας·

ὅτι γιά αὐτόν τό σκοπό πρέπει νά τηρηθοῦν γιά τούς ποιοτικούς τύπους ὀρύζης οἱ κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίνονται στήν πλέον ἀντιπροσωπευτική ποικιλία, ἡ ὁποία παράγεται ἐντός τῆς Κοινότητος καί νά ληφθεῖ ὑπόψη σάν ποιοτικός τύπος τῶν θραυσμάτων ἡ ποιότητα πού συναντᾶται συχνότερα στό ἐνδοκοινοτικό ἐμπόριο αὐτοῦ τοῦ προϊόντος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1

'Ο ποιοτικός τύπος ἀποφλοιωμένης ὀρύζης γιά τόν ὁποῖο ἔχει καθορισθεῖ ἡ ἐνδεικτική τιμή προσδιορίζεται ὡς ἑξῆς:

α) ὄρυζα, ἀπαλλαγμένη ὀσμῆς, ὑγιής, ἀνόθευτη καί σύμφωνη μέ τά συναλλακτικά ἤθη ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ στή μέση ποιότητα κοινῆς ὀρύζης μέ στρογγυλούς κόκκους, πού συνεκομίσθη ἐντός τῆς Κοινότητος ὑπό κανονικές συνθῆκες, τύπου ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ στήν ποικιλία «Balilla»·

β) περιεκτικότης σέ ὑγρασία: 15%·

γ) συνολικό ποσοστό κόκκων ὀρύζης, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ἀμέμπτου ποιότητος: 7% κατά βάρος, ἐκ τοῦ ὁποίου:

— κόκκοι μετά φλοιοῦ: 1%,

— θραύσματα: 3%,

— κόκκοι πράσινοι ἤ παρουσιάζοντες φυσικές δυσμορφίες: 3%·

δ) ὅριο ἀνοχῆς σέ προσμίξεις, πού ἀποτελοῦνται ἀπό:

— ὀρυκτές ἤ φυτικές μή θρώσιμες οὐσίες, ὑπό τόν ὅρο ὅτι δέν εἶναι τοξικές: 0,01%,

— ξένοι κόκκοι ἤ τεμάχια ξένων κόκκων, θρωσίμων: 0,10%·

ε) ἀπόδοση κατά τήν ἐπεξεργασία σέ λευκανθείσα ὄρυζα, σέ ὁλόκληρους κόκκους (μέ ὅριο ἀνοχῆς 5% σέ κόκκους κομμένους στό ἄκρο): 77,50% κατά βάρος, τοῦ ὁποίου ἕνα ποσοστό κατά βάρος κόκκων λευκανθείσης ὀρύζης πού δέν εἶναι ἀμέμπτου ποιότητος:

— κόκκοι ἀλευρώδεις: 3%,

— κόκκοι μέ ἐρυθρές ραβδώσεις: 3%,

— κόκκοι διάστικτοι: 1%,

— κόκκοι κηλιδωμένοι: 0,50%,

— κόκκοι κίτρινοι: 0,05%,

— κόκκοι χρώματος ἠλέκτρου: 0,125%.

'Αρθρο 2

'Ο ποιοτικός τύπος ἀναποφλοίωτης ὀρύζης γιά τόν ὁποῖο ἔχουν καθορισθεῖ οἱ τιμές παρεμβάσεως προσδιορίζεται ὡς ἑξῆς:

α) ὄρυζα ἀπαλλαγμένη ὀσμῆς, ὑγιής, ἀνόθευτη καί σύμφωνη μέ τά συναλλακτικά ἤθη, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ στή μέση ποιότητα κοινῆς ὀρύζης σέ στρογγυλούς κόκκους, πού συνεκομίσθη ἐντός τῆς Κοινότητος ὑπό κανονικές συνθῆκες, τύπου ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ στήν ποικιλία «Balilla»·

β) περιεκτικότης σέ ὑγρασία: 14,50%·

γ) ἀπόδοση κατά τήν ἐπεξεργασία σέ λευκανθείσα ὄρυζα, σέ ὁλόκληρους κόκκους (μέ ὅριο ἀνοχῆς 5% σέ κόκκους κομμένους στό ἄκρο): 63% κατά βάρος,

(1) ΕΕ ἀριθ. N 166 τῆς 26.6.1976, σ. 1.

τοῦ ὁποίου ἕνα ποσοστό κατά βάρος κόκκων λευκανθείσης ὀρύζης πού δέν εἶναι ἀμέμπτου ποιότητος:

— κόκκοι ἀλευρώδεις: 3%,
— κόκκοι μέ ἐρυθρές ραβδώσεις: 3%,
— κόκκοι διάστικτοι: 1%,
— κόκκοι κηλιδωμένοι: 0,50%,
— κόκκοι κίτρινοι: 0,05%,
— κόκκοι μέ χρῶμα ἠλέκτρου: 0,125%.

Ἄρθρο 3

Ὁ ποιοτικός τύπος θραυσμάτων γιά τόν ὁποῖο ἔχει καθορισθεῖ ἡ τιμή κατωφλίου προσδιορίζεται ὡς ἑξῆς:

α) θραῦσμα, ἀπαλλαγμένο ὀσμῆς, ὑγιές, ἀνόθευτο καί σύμφωνο μέ τά συναλλακτικά ἤθη, πού ἀντιστοιχεῖ στή μέση ποιότητα θραύσματος πού προέρχεται ἀπό τή μεταποίηση τῆς ἀποφλοιωμένης ὀρύζης σέ λευκανθείσα ὄρυζα στήν κοινοτική βιομηχανία, τύπου ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ στήν ποικιλία «Messagrana»·

β) περιεκτικότης σέ ὑγρασία: 15%·

γ) ὅριο ἀνοχῆς σέ προσμίξεις πού ἀποτελοῦνται ἀπό:

— ὀρυκτές ἤ φυτικές μή θρώσιμες οὐσίες, ὑπό τόν ὅρο ὅτι δέν εἶναι τοξικές: 0,01%,

— ξένα θραύσματα ἤ τεμάχια ξένων θραυσμάτων, θρώσιμα: 0,10%.

Ἄρθρο 4

Γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ παρόντος κανονισμοῦ, οἱ κόκκοι καί τά θραύσματα τά ὁποῖα δέν εἶναι ἀμέμπτου ποιότητος καθορίζονται στό παράρτημα.

Ἄρθρο 5

1. Ὁ κανονισμός ἀριθ. 362/67/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 25ης Ἰουλίου 1967 περί τῶν ποιοτικῶν τύπων ὀρύζης καί θραυσμάτων ὀρύζης[1], ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1555/71[2] καταργεῖται.

2. Οἱ παραπομπές στόν καταργηθέντα κανονισμό, δυνάμει τῆς παραγράφου 1, θεωροῦνται ὅτι γίνονται στόν παρόντα κανονισμό.

Ἄρθρο 6

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν 1η Ἰουλίου 1976.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος Μέλος.

Ἔγινε στό Λουξεμβοῦργο, στίς 21 Ἰουνίου 1976.

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

J. HAMILIUS

---

(1) ΕΕ ἀριθ. 174 τῆς 31.7.1967, σ. 27.
(2) ΕΕ ἀριθ. Ν 164 τῆς 22.7.1971, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή τῶν κόκκων καί τῶν θραυσμάτων πού δέν εἶναι ἀμέμπτου ποιότητος

Α. 'Ολόκληροι κόκκοι:

Κόκκοι ἀπό τούς ὁποίους, ἀνεξάρτητα ἀπό τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά σέ κάθε στάδιο βιομηχανικῆς ἐπεξεργασίας, ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁλόκληρο τό ἄκρο.

Β. Κόκκοι κομμένοι στό ἄκρο:

Κόκκοι ἀπό τούς ὁποίους ἔχει ἀφαιρεθεῖ μόνο ἕνα μέρος τοῦ ἄκρου.

Γ. Θραύσματα κόκκων ὀρύζης:

Κόκκοι ἀπό τούς ὁποίους μέρος τοῦ μεγέθους ὁλόκληρου κόκκου, μεγαλύτερο ἀπό τό ἄκρο, ἔχει ἀφαιρεθεῖ· τά θραύσματα περιλαμβάνουν:

— μεγάλα θραύσματα (τεμάχια κόκκων τῶν ὁποίων τό μῆκος εἶναι ἴσο ἤ ἀνώτερο τοῦ ἡμίσεος τοῦ μήκους τοῦ κόκκου, τά ὁποῖα ὅμως δέν ἀποτελοῦν ὁλόκληρο κόκκο)·

— μεσαῖα θραύσματα (τεμάχια κόκκων τῶν ὁποίων τό μῆκος εἶναι ἴσο ἤ ἀνώτερο τοῦ τετάρτου τοῦ μήκους τοῦ κόκκου, τά ὁποῖα ὅμως δέν φθάνουν τό ἐλάχιστο μέγεθος τῶν «μεγάλων θραυσμάτων»)·

— λεπτά θραύσματα (τεμάχια κόκκων τά ὁποῖα δέν φθάνουν τό τέταρτο τοῦ κόκκου ἀλλά δύνανται νά διέλθουν διά μέσου ἑνός κοσκίνου τοῦ ὁποίου οἱ ὀπές ἔχουν διάμετρο 1,4 mm)·

— τεμάχια θραυσθέντος κόκκου (μικρά τεμάχια ἤ μόρια ἑνός κόκκου τά ὁποῖα πρέπει νά δύνανται νά διέρχονται διά μέσου ἑνός κοσκίνου, τοῦ ὁποίου οἱ ὀπές ἔχουν διάμετρο 1,4 mm)· ταυτίζονται μέ τά τεμάχια κόκκων πού ἔχουν σχισμή (τεμάχια κόκκου τά ὁποῖα ἔχουν προέλθει ἀπό τήν ἐπιμήκη σχισμή τοῦ κόκκου).

Δ. Πράσινοι κόκκοι:

Κόκκοι μέ ἀτελή ὡρίμανση.

Ε. Κόκκοι παρουσιάζοντες φυσικές παραμορφώσεις:

Θεωροῦνται ὡς φυσικές παραμορφώσεις οἱ παραμορφώσεις κληρονομικῆς ἤ μή προελεύσεως σέ σχέση μέ τά τυπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τῆς ποικιλίας.

ΣΤ. Κόκκοι ἀλευρώδεις:

Σπόροι τῶν ὁποίων τουλάχιστον τά τρία τέταρτα τῆς ἐπιφανείας παρουσιάζουν μιά ὄψη ἀδιαφανή καί ἀλευρώδη.

Ζ. Κόκκοι μέ ἐρυθρές ραβδώσεις:

Κόκκοι οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν, σέ διαφόρους ἐντάσεις καί τόνους, ραβδώσεις ἐρυθροῦ χρώματος, κατά τήν ἐπιμήκη κατεύθυνση, οἱ ὁποῖες ὀφείλονται σέ ὑπολείμματα τοῦ περικαρπίου.

Η. Κόκκοι διάστικτοι:

Κόκκοι οἱ ὁποῖοι φέρουν ἕναν μικρό, καλά ὁριοθετημένο, κύκλο βαθέος χρώματος καί σχήματος περισσότερο ἤ λιγότερο κανονικοῦ. 'Επί πλέον, θεωροῦνται ὡς διάστικτοι κόκκοι οἱ κόκκοι οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν ἐλαφρές μαῦρες ραβδώσεις μόνο στήν ἐπιφάνεια καί ὄχι σέ βάθος. Οἱ ραβδώσεις καί τά στίγματα δέν πρέπει νά παρουσιάζουν κίτρινο ἤ σκοτεινό κύκλο.

Θ. Κόκκοι κηλιδωμένοι:

Κόκκοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ σέ περιορισμένο μέρος τῆς ἐπιφανείας τους φανερή ἀλλοίωση τοῦ φυσικοῦ τους χρώματος. Οἱ κηλίδες δύνανται νά εἶναι διαφόρων χρωμάτων (ὑπομέλανες, ὑπέρυθρες, καστανές κλπ.). Ἐπί πλέον θεωροῦνται ὡς κηλίδες οἱ βαθιές μελανές ραβδώσεις. Ἄν οἱ κηλίδες παρουσιάζουν ἔνταση τοῦ χρώματος (μέλανος, ροδόχρου, καστανοῦ-ὑπερύθρου) ὥστε νά εἶναι ἀμέσως ὁρατή καί μέγεθος ἴσο ἤ ἀνώτερο τοῦ ἡμίσεος τῶν κόκκων, αὐτοί πρέπει νά θεωροῦνται ὡς κίτρινοι κόκκοι.

I. Κίτρινοι κόκκοι:

Κόκκοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ, κατ' ἄλλο τρόπο ἐκτός τῆς ξηράνσεως, ὁλική ἤ μερική ἀλλαγή τοῦ φυσικοῦ τους χρώματος καί ἔχουν πάρει διάφορες ἀποχρώσεις ἀπό τό κίτρινο-λεμονί ἕως τό κίτρινο-πορτοκαλί.

IA. Κόκκοι χρώματος ἠλέκτρου:

Κόκκοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ, κατ' ἄλλο τρόπο ἐκτός τῆς ξηράνσεως, ὁμοιόμορφη ἀλλαγή τοῦ χρώματός τους, ἐλαφρά καί γενική. Ἡ ἀλλαγή αὐτή μεταβάλλει τό χρῶμα τῶν κόκκων σέ χρῶμα ἀνοικτό κίτρινο τοῦ ἠλέκτρου.