Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1799

28.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2026/1799

(2026. gada 24. jūlijs),

ar ko apstiprina Nīderlandē izmantojamās cūku liemeņu klasificēšanas metodes un atceļ Īstenošanas lēmumu 2011/303/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2026) 5120)

(Autentisks ir tikai teksts nīderlandiešu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 ([1]), un jo īpaši tās 20. panta pirmās daļas p) un t) punktu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) Nr. 1308/2013 10. pants noteic, ka cūku liemeņu klasificēšanā piemēro minētās regulas IV pielikuma B daļā doto Savienības skalu. Minētās regulas IV pielikuma B daļas IV iedaļas 1. punkts noteic, ka cūku liemeņu klasificēšanā muskuļaudu saturs jānovērtē pēc Komisijas apstiprinātām klasificēšanas metodēm, ka apstiprināt drīkst tikai statistiski pierādītas novērtēšanas metodes, kuru pamatā ir vienas vai vairāku cūkas liemeņa anatomisko daļu fiziska izmērīšana, un ka klasificēšanas metožu apstiprināšanas priekšnoteikums ir atbilstība maksimālajai pielaidei, kāda noteikta novērtējuma statistiskajai kļūdai. Minētā pielaide ir noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 ([2]) V pielikuma A daļas 1. punkta otrajā daļā.

(2) Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/303/ES ([3]) apstiprina trīs Nīderlandē izmantojamas cūku liemeņu klasificēšanas metodes.

(3) Nīderlande ir lūgusi Komisiju atsaukt metožu "Hennessy Grading Probe (HGP 7)" un "CSB Image-Meater (CSB)" apstiprinājumu.

(4) Nīderlande ir Komisiju arī lūgusi apstiprināt šādas jaunas metodes: "Autofom IV", "CSB Image-Meater 2.0" un "Fat-O-Meater II (FOM II)". Tālab Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 11. panta 3. punktā minētajā protokolā Nīderlande ir detalizēti aprakstījusi sadalīšanas izmēģinājumu, norādot principus, uz kuriem balstās minētā jaunā metode, sadalīšanas izmēģinājuma rezultātus un vienādojumu, ko izmanto, lai novērtētu muskuļaudu procentuālo saturu.

(5) Vēl Nīderlande ir Komisiju lūgusi apstiprināt atjauninātu formulu metodei "Capteur Gras Maigre (CGM)", kas cūku liemeņu klasificēšanai šīs valsts teritorijā jau ir apstiprinātas ar Īstenošanas lēmumu 2011/303/ES.

(6) Minētos lūgumus izskatot, tika konstatēts, ka jauno klasificēšanas metožu apstiprināšanas un jau apstiprināto metožu vienādojumu atjaunināšanas nosacījumi un minimālās prasības, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 V pielikuma A daļā, ir izpildītas visiem lūgumiem. Tāpēc minētās klasificēšanas metodes un jaunās formulas būtu jāapstiprina izmantošanai Nīderlandē.

([1]) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 171, 4.7.2017., 74. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/303/ES (2011. gada 20. maijs), ar ko nosaka metodes cūku liemeņu klasificēšanai Nīderlandē (OV L 136, 24.5.2011., 95. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/303/oj).

(7) Klasificēšanas metožu vai šo metožu aparātu izmaiņas nebūtu pieļaujamas, ja vien tās nav skaidri apstiprinātas ar Komisijas īstenošanas lēmumu.

(8) Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Īstenošanas lēmums 2011/303/ES būtu jāatceļ.

(9) Lai tirgus dalībniekiem dotu pietiekami daudz laika pielāgoties ar jaunu ierīču un jaunu vienādojumu ieviešanu saistītajām tehniskajām prasībām, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2027. gada 1. janvāra.

(10) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Cūku liemeņu muskuļaudu satura novērtēšanai Nīderlandē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas IV iedaļas 1. punktu apstiprina šādas klasificēšanas metodes:

a) aparāts "AutoFom IV" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma I daļā;

b) aparāts "CSB Image-Meater 2.0" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma II daļā;

c) aparāts "Fat-O-Meat'er II (FOM II)" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma III daļā;

d) "Capteur Gras Maigre (CGM)" aparāts un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma IV daļā.

2. pants

Iepriekš 1. pantā minēto apstiprināto klasificēšanas metožu vai šo metožu aparātu izmaiņas apstiprina ar Komisijas īstenošanas lēmumu.

3. pants

Īstenošanas lēmumu 2011/303/ES atceļ.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

To piemēro no 2027. gada 1. janvāra.

Briselē, 2026. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Christophe HANSEN

PIELIKUMS

CŪKU LIEMEŅU KLASIFICĒŠANAS METODES NĪDERLANDĒ

I DAĻA

“AutoFOM IV”

1. Šīs daļas noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot aparātu “AutoFOM IV”.

2. Aparāts sastāv no 25 platjoslas ultraskaņas devējiem (“Frontmatec A/S”), darbības attālums starp devējiem ir 16,5 mm. Ultraskaņas dati aptver muguras taukaudu slāņa biezuma, muskuļaudu slāņa biezuma un ar tiem saistītu parametru mērījumus. Mērījumu rezultātus ar datora palīdzību pārvērš muskuļaudu procentuālā satura aplēsē.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$Y = 64{,}48671 - 0{,}37519 \times R2P4 - 0{,}34035 \times R2P10 + 0{,}03625 \times R3P9,$$

kur:

Y = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

R2P4 = muguras tauku biezums (neskaitot ādu) milimetros P2 pozīcijā,

R2P10 = muguras tauku minimālais biezums (neskaitot ādu) milimetros visā liemenī (šis punkts nosaka MFT1 pozīciju),

R3P9 = muguras muskuļaudu slāņa biezums pozīcijā MFT1.

MFT apzīmē pozīciju, kurā taukaudu slānis (bez ādas) ir visplānākais. MFT1 ir visplānākais taukaudu slānis visā liemenī, bet MFT2 – visplānākais taukaudu slānis muguras daļā vistuvāk bloka apakšdaļai. P2 atrodas 70 milimetru attālumā no mugurkaula (MFT2).

Šo formulu piemēro liemeņiem, kas sver 60–140 kg (silta liemeņa svars).

II DAĻA

“CSB Image Meater 2.0”

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasifikācijai izmanto metodi “CSB Image-Meater 2.0”.

2. “CSB Image-Meater 2.0” aparāts (“CSB-System SE”) sastāv no taisna vadības stieņa, melnbaltas šaurleņķa kameras, 4 LED gaismekļiem rombveida formā un datora attēlu analīzei. Visus “Image-Meater” mainīgos mēra uz šķiņķa gabala cirtuma līnijas (vidējā gūžas muskuļa tuvumā). Mērījumu rezultātus ar datora palīdzību pārvērš muskuļaudu procentuālā satura aplēsē.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$Y = 66{,}56517 - 0{,}18436 \times ZPF + 0{,}04177 \times ZPM - 0{,}14654 \times MF - 0{,}17818 \times V4F,$$

kur:

Y = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

ZPF = mazākais taukaudu biezums (ar ādu) milimetros virs vidējā gūžas muskuļa,

ZPM = jostas muskuļa biezums milimetros, ko mēra visīsākajā attālumā no vidējā gūžas muskuļa priekšējās (kraniālās) daļas līdz mugurkaula augšējai (dorsālajai) malai,

MF = vidējais taukaudu slāņa biezums (mm) virs vidējā gūžas muskuļa,

V4F = vidējais taukaudu slāņa biezums (mm) virs ceturtā skriemeļa.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kas sver 60–140 kg (silta liemeņa svars).

III DAĻA

"Fat-O-Meat'er II (FOM II)"

1. Šīs daļas noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot aparātu "Fat-O-Meat'er II (FOM II)".

2. FOM II aparāts ("Frontmatec A/S") sastāv no optiskā sensora elementa, dziļuma mērīšanas ierīces un datu ieguves un analīzes bloka, kā arī displeja.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$Y = 68{,}94293 - 0{,}80855 \times X_1 + 0{,}02912 \times X_2,$$

kur:

Y = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = muguras taukaudu biezums (ar ādu) milimetros, ko mēra perpendikulāri 7 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas ārpusē un 4 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas iekšpusē starp otro un trešo ribu no beigām,

X_2 = muskuļaudu biezums milimetros, ko mēra perpendikulāri 7 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas ārpusē un 4 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas iekšpusē starp otro un trešo ribu no beigām.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kas sver 60–140 kg (silta liemeņa svars).

IV DAĻA

"Capteur Gras Maigre (CGM)"

1. Šīs daļas noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot metodi "Capteur Gras Maigre (CGM)".

2. CGM aparāts ("Fives Syleps") ir aprīkots ar 8 milimetru zondi, kas sastāv no optiskā sensora elementa, dziļuma mērīšanas ierīces un datu ieguves un analīzes bloka. Mērījumu rezultātus ar datora palīdzību pārvērš muskuļaudu satura aplēsē.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$Y = 69{,}14504 - 0{,}77025 \times X_1 + 0{,}00922 \times X_2$$

kur:

Y = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = muguras taukaudu biezums (ar ādu) milimetros, ko mēra perpendikulāri 6 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas ārpusē un 2,5 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas iekšpusē starp trešo un ceturto ribu no beigām,

X_2 = muskuļaudu biezums milimetros, ko mēra perpendikulāri 6 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas ārpusē un 2,5 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas iekšpusē starp trešo un ceturto ribu no beigām.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kas sver 60–140 kg (silta liemeņa svars).