Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 418/2001,

1. märts 2001,

uute söödalisandite ja lisandite uute kasutusviiside lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 62, 2.3.2001, lk 3)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1519/2007, 19. detsember 2007	L 335	15	20.12.2007
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2008, 6. oktoober 2008	L 266	3	7.10.2008

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 418/2001,

1. märts 2001,

uute söödalisandite ja lisandite uute kasutusviiside lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ, ([1]) viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2697/2000, ([2]) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiviga 70/524/EMÜ nähakse ette, et uusi söödalisandeid ja söödalisandite uusi kasutusviise võib lubada pärast direktiivi artikli 4 kohaselt esitatud taotluse läbivaatamist.

(2) Nimetatud direktiivi artikli 9e lõikega 1 nähakse ette, et uusi söödalisandeid või söödalisandite uusi kasutusviise võib ajutiselt lubada, kui direktiivi 70/524/EMÜ artikli 3a punktide b-e tingimused on täidetud ja kui olemasolevate tulemuste põhjal võib eeldada, et loomasöödas kasutamise korral mõjub söödalisand ühel artikli 2 punktis a osutatud viisil. Nimetatud ajutisi lubasid antakse direktiivi C lisa II osas osutatud lisandite puhul kuni neljaks aastaks.

(3) Esitatud toimikute hindamine näitab, et I ja II lisas kirjeldatud uued ensüümpreparaadid ja mikro-organismide preparaadid ning nende uued kasutusviisid vastavad eespool nimetatud tingimustele ja neid võib lubada ajutiselt kasutada nelja aasta jooksul.

(4) Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 2 alapunktiga aaa nähakse ette, et koktsidiostaatikumide lubamiseks on vajalik määrata nende ringlusse laskmise eest vastutav isik.

(5) Direktiivi 70/524/EMÜ artikliga 9b nähakse ette, et selliste ainete kasutamise load antakse kümneks aastaks alates lõpliku lubamise jõustumise kuupäevast, kui kõik direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused on täidetud.

(6) Esitatud toimiku hindamine näitab, et III lisas kirjeldatud koktsidiostaatikum vastab kõikidele artiklis 3a sätestatud tingimustele, kui seda kasutatakse nimetatud lisas kirjeldatud loomakategooriate puhul ja seal sätestatud tingimustel.

(7) Toimikute hindamine näitab, et töötajate kaitsmiseks söödalisanditega kokkupuutumise eest võib olla vaja võtta teatavaid meetmeid. Nimetatud kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) ([3]) ja selle alusel vastuvõetud direktiivide kohaldamisega.

(8) Söötade teaduskomitee on andnud soodsa hinnangu selliste ensüümpreparaatide, mikro-organismide preparaatide ja koktsidiostaatikumi kahjutuse kohta ja avaldanud arvamust, et nimetatud lisades kirjeldatud tingimustel kasutamise korral mõjub koktsidiostaatikum loomakasvatustoodangule soodsalt.

([1]) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
([2]) EÜT L 319, 16.12.2000, lk 1.
([3]) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

▼B

(9) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mikro-organismide rühma kuuluvaid käesoleva määruse I lisas loetletud valmistisi lubatakse kasutada loomasöötades söödalisanditena nimetatud lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvaid käesoleva määruse II lisas loetletud valmistisi lubatakse kasutada loomasöötades söödalisanditena nimetatud lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 3

Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvaid käesoleva määruse III lisas loetletud lisandeid lubatakse kasutada loomasöötades söödalisanditena nimetatud lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamise päevale järgneval päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2001.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

I LISA

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					CFUd ühe kg täissööda kohta	CFUd ühe kg täissööda kohta		
20	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749) *Bacillus subtilis* DSM 5750 (suhtes 1/1)	*Bacillus licheniformis*'e ja *Bacillus subtilis*'e segu, mis sisaldab vähemalt $3,2 \times 10^9$ CFU/g söödalisandit ($1,6 \times 10^9$ CFU/g iga bakterit)	Vasikad	Kuus kuud	$1,28 \times 10^9$	$1,6 \times 10^9$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.	28.2.2005
21	*Enterococcus faecium* DSM 3530	Enterococcus faecium'i valmistis, mis sisaldab vähemalt $2,5 \times 10^9$ CFU/g	Vasikad	Kuus kuud	1×10^9	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.	28.2.2005

II LISA

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta		
23	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (CNCM MA 6-10W) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 70 000 IFP (1)/g Vedelal kujul: 7 000 IFP/ml	Broilerkalkunid	–	700 IFP	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 400 IFP 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	28.2.2005
			Munakanad	–	840 IFP	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 840 IFP 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	28.2.2005

▼B

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta		
27	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6	*Trichoderma reesei*'st (CBS 529.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis ja *Trichoderma reesei*'st (CBS 526.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 200 000 BXU ([2])/g 200 000 BU ([3])/g Vedelal kujul: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Põrsad	2 kuud	7 500 BXU 7 500 BU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 7 500-15 000 BXU 7 500-15 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	28.2.2005
28	3-fütaas EÜ 3.1.3.8	*Trichoderma reesei*'st (CBS 528.94) toodetud 3-fütaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 5 000 PPU ([4])/g Vedelal kujul: 1 000 PPU/g	Broilerkanad	–	500 PPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–750 PPU 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab vähemalt 0,22 % fütiiniga seotud fosforit	28.2.2005

▼B

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta		
30	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6 Endo-1,3(4) beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8	*Penicillium funiculosum*'ist (IMI SD 101) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrilisel kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 000 U ([5])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 400 U/g ([6])/g Vedelal kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U/ml Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 350 U/ml	Broiler-kalkunid	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	28.2.2005
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	28.2.2005

▼B

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta		
							3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra või 30 % nisu	
			Nuumsead	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra või 60 % nisu	28.2.2005
59	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6 Subtilisiin	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	28.2.2005

▼B

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Sisalduse ülemmäär Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Muud tingimused	Loa tähtaeg
	EÜ 3.4.21.62 Alfa-amülaas EÜ 3.2.1.1 Polügalakturonaas EÜ 3.2.1.15	'isest (DSM 9553) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja alfa-amülaasi, *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini ja *Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud polügalakturonaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U (7)/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U (8)/g Subtilisiin: 4 000 U (9)/g Alfa-amülaas: 400 U (10)/g Polügalakturonaas: 25 U (11)/g			Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U Subtilisiin: 4 000 U Alfa-amülaas: 400 U Polügalakturonaas: 25 U	– – – –	2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U subtilisiin: 4 000 U alfa-amülaas: 400 U polügalakturonaas: 25 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % maisi	

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta		
60	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U ([7])/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 50 U ([8])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 5 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500 – 2 500 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 5–25 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % otra ja 40 % nisu	28.2.2005

Number (või EÜ number)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta	Aktiivsusühikut ühe kg täissööda kohta		
61	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6	*Trichoderma reesei*'ist (CBS 526.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrilisel kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 17 000 BXU ([2])/g Endo-1,3(4)-beeta-ksülanaas: 11 000 BU/ ([3])/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 22 000 U/ml Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 15 000 U/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 000 BU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra ja 55 % nisu	28.2.2005

([1]) Üks EFP on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
([2]) Üks BXU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,06 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kasepuu ksülaanist minutis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures.
([3]) Üks BU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,06 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra glükaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
([4]) Üks PPU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati naatriumfütaadist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 37 °C juures.
([5]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 5,55 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
([6]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 4,00 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) kasepuu ksülaanist minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 50 °C juures.
([7]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera/speltanisu ksülaanist minutis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures.
([8]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
([9]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli fenoole (türosiini ekvivalendid) kaseiini substraadist minutis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 40 °C juures.
([10]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli glükoosiidsidemeid vees mittelahustavast võrkstruktuuriga tärklisepolümeeri substraadist minutis pH taseme 6,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
([11]) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli pidurdusaineid (galakturoonhappe ekvivalendid) polü-D-galakturooni substraadist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.

Söödalisandi registreerimisnumber	Söödalisandi ringlusesse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber	Lisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp	Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta				
Koktsidiostaatikumid ja muud raviained										
E 771	Janssen Pharmaceutica nv	diklasuriil: 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) diklasuriil: 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix)	*Söödalisandi koostis:* diklasuriil: 0,5 g/100 g sojajahu: 99,25 g/100 g polüvidoon K 30: 0,2 g/100 g naatriumhüdroksiid: 0,0538 g/100 g diklasuriil: 0,2 g/100 g sojajahu: 39,7 g/100 g polüvidoon K 30: 0,08 g/100 g naatriumhüdroksiid: 0,0215 g/100 g nisu peenkliid: 60 g/100 g *Toimeaine:* diklasuriil: $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klorofenüül[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahüdro-3,5-diokso-1,2,4-triasiin-2-üül) fenüül]atsetonitriil, CASi number: 101831-37-2 *Tooteomased lisandid:* lagunemissaadus (R064318): ≤ 0,2 % muud tooteomased lisandid (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % igaühte Kokku lisandeid: ≤ 1,5 %	Nuumkalkunid	12 nädalat	1	1	—	28.2.2011	1 500 diklasuriili märja neeru kilogrammi kohta 1 000 µg diklasuriili märja neeru kilogrammi kohta 500 µg diklasuriili märja lihaskoe kilogrammi kohta 500 µg diklasuriili märja rasvkoe kilogrammi kohta