Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 418/2001/EK RENDELETE

(2001. március 1.)

új takarmány-adalékanyagok és takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 62., 2001.3.2., 3. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 1519/2007/EK rendelete (2007. december 19.)	L 335	15	2007.12.20.
►M2	A Bizottság 976/2008/EK rendelete (2008. október 6.)	L 266	3	2008.10.7.

▼B

A BIZOTTSÁG 418/2001/EK RENDELETE

(2001. március 1.)

új takarmány-adalékanyagok és takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2697/2000/EK bizottsági rendelettel ([1]) módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 70/524/EGK irányelv szerint új adalékanyagok vagy adalékanyagok új alkalmazásai egy, az irányelv 4. cikkének megfelelően benyújtott kérelem elbírálása nyomán engedélyezhetők.

(2) Az irányelv 9e. cikkének (1) bekezdése, a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkének b)–e) pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén, lehetőséget nyújt új adalékanyagok vagy adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezésére, feltéve, ha a rendelkezésre álló eredmények alapján ésszerűen feltételezhető, hogy takarmányozásra alkalmazva a 2. cikk a) pontjában felsorolt hatások valamelyikét kifejti. Ilyen ideiglenes engedély az irányelv C. mellékletének II. részében említett adalékanyagokra négy évig terjedő időtartamra adható.

(3) A benyújtott dokumentációk értékelése arra utal, hogy az I. és II. mellékletben felsorolt új mikroorganizmus- és enzimkészítmények, illetve a mikroorganizmus- és enzimkészítmények új alkalmazásai megfelelnek a fenti feltételeknek és ezért ideiglenesen, négyéves időszakra engedélyezhetők.

(4) A 70/524/EGK irányelv 2. cikkének aaa) pontja előírja, hogy a kokcidiosztatikumok engedélyezése a forgalomba hozatalukért felelős személyhez kötődjön.

(5) A 70/524/EGK irányelv 9b. cikke szerint ezen anyagokra a végleges engedély hatálybalépésének időpontjától számított tíz évre kell kiadni az engedélyt, ha a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében megállapított valamennyi feltétel teljesül.

(6) A benyújtott dokumentáció értékelése arra utal, hogy a III. mellékletben található kokcidiosztatikum megfelel a 3a. cikk valamennyi követelményének, amennyiben az említett mellékletben megjelölt állatkategóriára, s az ott előírt feltételekkel alkalmazzák.

(7) A dokumentációk értékelése szerint bizonyos intézkedések szükségessége merülhet fel az adalékanyagok hatásainak kitett munkavállalók védelmének biztosítására. Ezt a védelmet viszont a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv ([3]) és az annak alapján kiadott irányelvek alkalmazásával kell biztosítani.

(8) A takarmányozási tudományos bizottság kedvező véleményt adott az enzim- és mikroorganizmus-készítmények, valamint a kokci-

([1]) HL L 319., 2000.12.16., 1. o.
([2]) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.
([3]) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

▼B

diosztatikum ártalmatlanságáról, továbbá utóbbinak az állattenyésztésre gyakorolt kedvező hatásáról, az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében felsorolt, a „Mikroorganizmusok” csoportjába tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként való alkalmazása az említett mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezett.

2. cikk

Az e rendelet II. mellékletében felsorolt, az „Enzimek” csoportjába tartozó készítmények takarmány-adalékanyagként való alkalmazása az említett mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezett.

3. cikk

Az e rendelet III. mellékletében felsorolt, a „Kokcidiosztatikumok és más gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó adalékanyag takarmány-adalékanyagként való alkalmazása az említett mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezett.

4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					CFU/kg a teljes értékű takarmányban	CFU/kg a teljes értékű takarmányban		
20.	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750 (1/1 arányban)	*Bacillus licheniformis* és *Bacillus subtilis* keveréke az adalékanyagból legalább $3{,}2 \times 10^9$ CFU/g tartalommal ($1{,}6 \times 10^9$ UFC/g minden baktériumból)	Borjú	6 hónap	$1{,}28 \times 10^9$	$1{,}6 \times 10^9$	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2005.2.28.
21.	*Enterococcus faecium* DSM 3530	*Enterococcus faecium* készítmény legalább $2{,}5 \times 10^9$ CFU/g tartalommal	Borjú	6 hónap	1×10^9	1×10^9	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	2005.2.28.

II. MELLÉKLET

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
23.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8.	A *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6–10W) által termelt endo-1,4-béta-xilanázból készült készítmény legalább: szilárd alakban: 70 000 IFP (1)/g folyékony alakban: 7 000 IFP/ml aktivitással	Hízópulyka	–	700 IFP	–	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: 1 400 IFP. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag, pl. 40 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.
			Tojótyúk	–	840 IFP	–	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: 840 IFP. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag, pl. 40 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.

▼B

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
27.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6.	*Trichoderma reesei* (CBS 529.94) által termelt endo-1,4-béta-xilanázból és *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázból készült készítmény legalább: szilárd alakban: 200 000 BXU ([2])/g 200 000 BU ([3])/g folyékony alakban: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g aktivitással	Malac	2 hónap	7 500 BXU 7 500 BU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: 7 500–15 000 BXU, 7 500–15 000 BU. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. 50 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.
28.	3-Fitáz EC 3.1.3.8.	*Trichoderma reesei* (CBS 528.94) által termelt 3-fitázból készült készítmény legalább szilárd alakban: 5 000 PPU ([4])/g folyékony alakban: 1 000 PPU/g aktivitással	Brojlercsirke	–	500 PPU	–	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: 500–750 PPU. 3. 0,22 % feletti fitinhez kötött foszfortartalommal rendelkező összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.

▼B

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
30.	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6. Endo-1,-béta-xilanáz EC 3.2.1.8.	*Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból készült készítmény legalább: por alakban: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 2 000 U ([5])/g Endo-1,4-béta-xilanáz: 1 400 U/g ([6])/g folyékony alakban: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 500 U/ml Endo-1,4-béta-xilanáz: 350 U/ml aktivitással	Hízópulyka	–	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U Endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U, endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. 50 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.
			Tojótyúk	–	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U Endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U, endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U.	2005.2.28.

▼B

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
							3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. 60 % feletti árpa- vagy 30 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	
			Hízósertés	–	Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U Endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U, endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. 50 % feletti árpa- vagy 60 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.

▼B

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
59.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6. Szubtilizin EC 3.4.21.62. Alfa-amiláz EC 3.2.1.1. Poligalakturonáz EC 3.2.1.15.	*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanázból, Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázból és alfa-amilázból, *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) által termelt szubtilizinből és *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) által termelt poligalakturonázból készült készítmény legalább: Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U ([7])/g Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 150 U ([8])/g Szubtilizin: 4 000 U ([9])/g Alfa-amiláz: 400 U ([10])/g Poligalakturonáz: 25 U ([11])/g aktivitással	Brojlercsirke	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 150 U Szubtilizin: 4 000 U Alfa-amiláz: 400 U Poligalakturonáz: 25 U	– – – – –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U, endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 150 U, szubtilizin: 4 000 U, alfa-amiláz: 400 U, poligalakturonáz: 25 U. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. 40 % feletti kukorica tartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.

▼B

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
60.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6.	*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanázból és *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázból készült készítmény legalább: Endo-1,4-béta-xilanáz: 5 000U ([7])/g Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 50 U ([8])/g aktivitással	Brojlercsirke	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 500 U Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 5 U	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: endo-1,4-béta-xilanáz: 500–2 500 U, endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 5–25 U. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. 20 % árpa- és 40 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra,.	2005.2.28.

Szám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Maximális kor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban	aktivitási egységek száma/kg a teljes értékű takarmányban		
61.	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6.	*Trichoderma reesei* (CBS 526.94) által termelt endo-1,4-béta-xilanázból készült készítmény legalább: por alakban: Endo-1,(4)-béta-xilanáz: 17 000 BXU ([2])/g Endo-1,3(4)-béta-xilanáz: 11 000 BU ([3])/g folyékony alakban: Endo-1,4-béta-xilanáz: 22 000 U/ml Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 15 000 U/ml aktivitással	Brojlercsirke	–	Endo-1,4-béta-xilanáz: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 11 000 BU	– –	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Teljes értékű takarmány-kilogrammonként ajánlott adag: endo-1,4-béta-xilanáz: 17 000 BXU, endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 11 000 BU. 3. Nem keményítő alapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. 40 % árpa- vagy 55 % feletti búzatartalmú összetett takarmányokban való alkalmazásra.	2005.2.28.

([1]) 1 IFP az az enzimmennyiség, ami 4,8 pH-érték mellett 50 °C-on a zab-xilánból percenként 1 mikromol (xilóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([2]) 1 BXU az az enzimmennyiség, ami 5,3 pH-érték mellett 50 °C-on a nyír-xilánból percenként 0,06 mikromol (xilóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([3]) 1 BU az az enzimmennyiség, ami 4,8 pH-érték mellett 50 °C-on az árpa glükánból percenként 0,06 mikromol (glükóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([4]) 1 PPU az az enzimmennyiség, ami 5,0 pH-érték mellett 37 °C-on a nátrium-fitátból percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel.
([5]) 1 U az az enzimmennyiség, ami 5,0 pH-érték mellett 50 °C-on az árpa béta-glükánból percenként 5,55 mikromol (maltóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([6]) 1 U az az enzimmennyiség, ami 5,5 pH-érték mellett 50 °C-on a nyírfa-xilánból percenként 4,00 mikromol (maltóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([7]) 1 U az az enzimmennyiség, ami 5,3 pH-érték mellett 50 °C-on a pelyvás zab-xilánból percenként 1 mikromol (xilóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
([8]) 1 U az az enzimmennyiség, ami 5,0 pH-érték mellett 30 °C-on az árpa béta-glükánból percenként 1 mikromol (glükóz ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.

▼B

([9]) 1 U az az enzimmennyiség, ami 7,5 pH-érték mellett 40 °C-on kazein szubsztrátból percenként 1 mikromol (tirozin ekvivalens) fenolvegyületet szabadít fel.
([10]) 1 U az az enzimmennyiség, ami 6,5 pH-érték mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű keményítő polimer szubsztrátból percenként 1 mikromol glikozidkötést szabadít fel.
([11]) 1 1 U az az enzimmennyiség, ami 5,0 pH-érték mellett 40 °C-on poli-D-galakturon szubsztrátból percenként 1 mikromol (galakturonsav ekvivalens) redukálóanyagot szabadít fel.

III. MELLÉKLET

Az adalékanyag nyilvántartási száma	Az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személy neve és nyilvántartási száma	Adalékanyag (kereskedelmi név)	Összetétel, kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta	Maximális maradékanyag-határérték (MRL) az adott állati eredetű élelmiszerben
						hatóanyag (mg)/teljes értékű takarmány (kg)				
Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok										
E 771	Janssen Pharmaceutica nv	Diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix)	*Az adalékanyag összetétele:* Diklazuril: 0,5 g/100 g Szójadara: 99,25 g/100 g Polividon K 30: 0,2 g/100 g Nátrium-hidroxid: 0,0538 g/100 g Diklazuril: 0,2 g/100 g Szójadara: 39,7 g/100 g Polividon K 30: 0,08 g/100 g Nátrium-hidroxid: 0,0215 g/100 g Búzaderce: 60 g/100 g *Hatóanyag:* Diklazuril $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klorofenil [2,6-dikloro-4-(2,3,4, 5-tetrahidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenil]acetonitril CAS-szám: 101831-37-2 *Rokon szennyeződések:* Bomlástermék (R064318): ≤ 0,2 % Egyéb szennyeződések (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % egyenként Összes szennyeződés: ≤ 1,5 %	Hízópulyka	12 hét	1	1	—	2011.2.28.	1 500 µg diklazuril/kg nedves máj 1 000 µg diklazuril/kg nedves vese 500 µg diklazuril/kg nedves izom 500 µg diklazuril/kg nedves bőr/zsír